HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

MATHEMATISCH-NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT II INSTITUT FÜR MATHEMATIK

Prof. Phd. Andreas Griewank, Vertretung: Dr. Jürgen Geiser Dr. Hans-Dietrich Niepage, Dipl.-Math. Holger Heitsch Dipl.-Math. Lutz Lehmann



Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Mathematik, Unter den Linden 6, D-10099 Berlin

Übungsaufgaben zur Vorlesung Mathematik für Informatiker I

Serie 3. (Abgabe: bis 17.11.06)

Aufgabe 1: 4 Punkte

Es sei eine Folge von Personalnummern (Aktenzugriffen) gegeben:

und die Registraturgröße sei etwa 100. Betrachte die Hashfunktion $h(k)=k \mod 103$, um für jede Personalnummer einen Index von 0 bis 102 zu erzeugen. Berechne die Indizes und, falls irgendwann Kollisionen auftreten (d.h. h(k)=h(k'), wobei $k\neq k'$), löse diese durch das quadratische Sondieren.

Aufgabe 2:

Betrachte die Gruppe $\mathcal{P}_4 = \text{Iso}(\mathcal{M})$ aller Permutationen auf $\mathcal{M} = \{1, 2, 3, 4\}$.

- a) Wieviel Elemente hat \mathcal{P}_4 und wieviele die Menge $\operatorname{Endo}(\mathcal{M})$ aller Abbildungen von \mathcal{M} in sich.
- **b)** Bestimme die Verknüpfung der als Tupel (2,3,4,1) und (3,1,2,4) gegebenen Permutationen in beiden **2 Punkte** möglichen Reihenfolgen.
- c) Bestimme die inversen Elemente zu den beiden oben angegebenen Permutationen. 2 Punkte
- d) Bestimme die durch die Permutation (3,4,1,2) aufgespannte Untergruppe von \mathcal{P}_4 2 Punkte

Aufgabe 3:

Sei \mathcal{M} eine multiplikative (d.h. nicht notwendig kommutative) Gruppe

- a) Welche Eigenschaften (injektiv, surjektiv, bijektiv, homomorph) hat die Abbildung $\varphi(a) = a^{-1}$? 2 Punkte
- **b)** Unter welcher Voraussetzung ist die Abbildung $\varphi : \mathcal{M} \to \mathcal{M}$ mit $\varphi(a) = a * a$ ein Gruppenhomomorphismus?

Aufgabe 4:

Seien \mathcal{M}, \mathcal{N} additive Gruppen und $\varphi: \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ ein Gruppenhomomorphismus mit dem Kern $\mathcal{U} = \ker(\varphi) = \varphi^{-1}(\{0\})$. Zeige, dass für die Äquivalenzrelation 3 **Punkte**

$$x \sim y \iff x - y \in \mathcal{U}$$

für jedes beliebiges $x \in \mathcal{M}$ dessen Äquivalenzklasse durch das Urbild $[x] = \varphi^{-1}(\{\varphi(x)\})$ gegeben ist.

Aufgabe 5: Zeige, dass die Abbildung $\varphi: \mathbb{Z} \mapsto \mathbb{Z}^{2 \times 2}$ mit

4 Punkte

$$\varphi(a) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ a & 0 \end{bmatrix}$$

ein injektiver Homomorphismus der additiven Gruppen, aber kein Ringhomomorphismus ist.

phone: 030/2093-5820 fax: 030/2093-5848