

**HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN**

**Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II**

**Institut für Mathematik**

**Preprint Nr. 2004-17**



Marko Roczen und Helmut Wolter

unter Mitarbeit von

Wilfred Pohl, Dorin Popescu, Radu Laza

Lineare Algebra individuell

Aufgabensammlung

Roczen, Marko und Wolter, Helmut  
unter Mitarbeit von  
Pohl, Wilfred; Popescu, Dorin; Laza, Radu:  
Lineare Algebra individuell, Aufgabensammlung  
Institut für Mathematik  
an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät II  
der Humboldt-Universität zu Berlin, 2004, 305 S.  
(Preprint; 2004-17)

ISSN 1439-9679

Anforderungen an: Humboldt-Universität zu Berlin  
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II  
Institut für Mathematik  
D-10099 Berlin  
Germany

# Vorwort

Diese Aufgabensammlung ist der fachliche Teil des Schlussberichts für das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt 01NM075D zur interaktiven Mathematik- und Informatik-Grundausbildung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Der zur Veröffentlichung bestimmte allgemeine Teil des Berichts kann auf den Internet-Seiten des Projekts unter <http://www.math.hu-berlin.de/~in2math/results.html> eingesehen werden; dort finden sich auch Verweise auf Ergebnisse zur Analysis-Grundausbildung. Als Preprint am Institut für Mathematik der Humboldt-Universität zu Berlin erschienen, steht das vorliegende Material gleichzeitig im PDF-Format unter

<http://www.math.hu-berlin.de/~in2math/aufg/laAufg.pdf>

zur Verfügung; es beinhaltet eine Sammlung von 525 Aufgaben zur linearen Algebra. Einschließlich der über die Online-Fassung zugänglichen Links (als Varianten gekennzeichnet) ergeben sich durch Modifikation von Anfangswerten ca. 4700 Einzelaufgaben.

Die Druckfassung kann nur einen Teil der Vorteile erbringen, die durch die Hypertext-Funktionalität der elektronischen Fassung geboten werden. Angesichts bestehender Nachfrage können sich jedoch beide Versionen nützlich erweisen: für Studierende als Hilfe bei der Lösung ausgewählter Übungsaufgaben, für Lehrende zur Vorbereitung von Aufgabenserien und Klausuren. Die ausführliche systematische Gliederung und ein umfangreiches Sachverzeichnis können dabei als Orientierung zur Gestaltung von Vorlesungen, Übungen und Prüfungen dienen.

Gliederung und Schwerpunkte entsprechen dem gleichnamigen Internetprojekt **LINEARE ALGEBRA INDIVIDUELL**, in dem Resultate aus dem Projekt verwertet werden.

Die Aufgaben des vorliegenden Materials (Teil II) sind mit Links zur systematischen Gliederung (Teil I) versehen. Eine Zuordnung ist sicher nicht in allen Fällen eindeutig möglich – sie ist hier so gewählt, dass spätestens mit den zitierten Schwerpunkten der für die Lösung erforderliche Stoff als bekannt vorausgesetzt werden kann.

Links zu Textstellen der Online-Fassung sind **blau** markiert; Hyperlinks (**rot** gekennzeichnet) verweisen auf weitere Dateien oder Web-Inhalte. Die Nummerierung der Aufgaben folgt der systematischen Gliederung (beispielsweise sind die Aufgaben zum Abschnitt 1.3 mit 1/3/... bezeichnet).

Die Humboldt-Universität hat dem Projekt perfekte Arbeitsbedingungen geboten. Wir danken überdies Frau Margit Todorov und Herrn Torsten Wetzels für ihre Sorgfalt bei der sprachlichen bzw. inhaltlichen Durchsicht der Aufgaben.

Berlin, im Juli 2004

# Teil I: Systematische Gliederung

## Kapitel 0

### Grundlagen aus der Mengenlehre und der Logik

**Stoffeinheiten** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen

#### Schwerpunkte

- Mengentheoretische Grundbegriffe (Elementbeziehung, Gleichheit von Mengen, Inklusion)
- Erste Mengenoperationen (Durchschnitt, Vereinigung, Differenzmenge, Komplementärmenge)
- Natürliche Zahlen
- Potenzmenge einer Menge
- Kartesisches Produkt endlich vieler Mengen
- Durchschnitt und Vereinigung von Mengenfamilien

**Stoffeinheiten** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

#### Schwerpunkte

- Gebrauch von: nicht, und, oder, wenn-so, genau dann – wenn
- Die Quantoren  $\exists$ ,  $\forall$  und ihre Verneinung
- Beweisprinzipien (Modus ponens, Kettenschluss, Kontraposition, indirekter Beweis, vollständige Induktion)

**Stoffeinheiten** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen

#### Schwerpunkte

- Ordnungsrelation, geordnete Menge (kleinstes, größtes, minimales, maximales Element)
- Begriff der Abbildung (Bild, Urbild, Quelle, Ziel)
- Injektive, surjektive und bijektive Abbildungen
- Produkt von Abbildungen, Eigenschaften, Inverse einer Bijektion
- Begriff der Äquivalenzrelation (Partition, Klasseneinteilung)

- Invarianten einer Äquivalenzrelation, kanonische Abbildung, (vollständiges) Invariantensystem, System von Normalformen
- Gleichmächtige Mengen, Eigenschaften der Gleichmächtigkeit von Mengen

**Stoffeinheiten** 0/4/1 - 0/4/16 [Das Auswahlaxiom](#)

### Schwerpunkte

- Kartesisches Produkt einer Familie von Mengen, Auswahlaxiom
- Induktive Ordnungen und zornsches Lemma (für die Anwendungen genügt das Resultat)
- zornsches Lemma, erste Anwendungen

**Stoffeinheiten** 0/5/1 - 0/5/16 [Kardinalzahlen](#)

### Schwerpunkte

- Ordinalzahlen (für die Anwendungen genügt der intuitive Begriff)
- Kardinalzahl einer Menge, Rechnen mit Kardinalzahlen (für die Anwendungen genügt der intuitive Begriff)
- Einfachste Operationen mit Kardinalzahlen (Summe, Produkt), Vergleich von Kardinalzahlen

## Kapitel 1

# Erste algebraische Strukturen

## 1.1 Gruppen

**Stoffeinheiten** 1/1/1 Monoide

### Schwerpunkte

- Monoid (Begriff, erste Beispiele)
- Produkt- und Summen-Notation in Monoiden

**Stoffeinheiten** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

### Schwerpunkte

- Gruppe (Begriff und elementare Eigenschaften)
- Erste Beispiele für Gruppen

**Stoffeinheiten** 1/1/6 - 1/1/12 Untergruppen, Homomorphismen

### Schwerpunkte

- Untergruppen (Untergruppenkriterium, Erzeugendensysteme)
- Gruppensomorphismen (Begriff, Eigenschaften)

**Stoffeinheiten** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

**Schwerpunkte**

- Die Gruppe  $S_n$  (Rechnen mit Permutationen)
- Zyklen und Transpositionen
- Vorzeichen (Signum) einer Permutation
- Zerlegung von Permutationen in Zyklen bzw. Transpositionen

**Stoffeinheiten** 1/1/19 - 1/1/22 Nebenklassen einer Untergruppe

**Schwerpunkte**

- Linke und rechte Nebenklassen einer Untergruppe
- Satz von Lagrange, Index einer Untergruppe

**Stoffeinheiten** 1/1/23 Bild und Kern eines Gruppenhomomorphismus

**Schwerpunkte**

- Kern eines Gruppenhomomorphismus
- Bild und Kern als Untergruppen

**Stoffeinheiten** 1/1/24 - 1/1/28 Faktorgruppen, das Homomorphieprinzip

**Schwerpunkte**

- Faktorgruppe und kanonischer Homomorphismus
- Jeder Normalteiler ist Kern eines Gruppenhomomorphismus
- Der Homomorphiesatz
- Klassifikation der zyklischen Gruppen

## 1.2 Ringe und Körper

**Stoffeinheiten** 1/2/1 - 1/2/2 Ringoperationen

**Schwerpunkte**

- Ringoperationen (elementare Eigenschaften, allgemeines Distributivgesetz, binomischer Satz)
- Erste Beispiele für Ringe

**Stoffeinheiten** 1/2/3 Unterringe, Ringhomomorphismen

**Schwerpunkte**

- Unterringe eines Ringes
- Ringhomomorphismen und Isomorphismen
- Elementare Eigenschaften von Ringhomomorphismen

**Stoffeinheiten** 1/2/4 - 1/2/5 Integritätsbereiche und Körper

**Schwerpunkte**

- Nullteilerfreie Ringe (Integritätsbereiche)
- Kürzungsregel in Integritätsbereichen
- Körper und Unterkörper, Beispiele

**Stoffeinheiten** 1/2/6 Rationale Zahlen, Quotientenkörper

**Schwerpunkte**

- Konstruktion der rationalen Zahlen
- Verallgemeinerung der Konstruktion rationaler Zahlen (Konstruktion von Quotientenkörpern beliebiger Integritätsbereiche)

**Stoffeinheiten** 1/2/7 - 1/2/8 Der Körper der komplexen Zahlen

**Schwerpunkte**

- Komplexe Zahlen (Realteil, Imaginärteil, Konjugation)
- Rechnen mit komplexen Zahlen
- Fundamentalsatz der Algebra (ohne Beweis)

**Stoffeinheiten** 1/2/9 - 1/2/11 Polynome in einer Unbestimmten

**Schwerpunkte**

- Der Polynomring in einer Unbestimmten (Definition)
- Prinzip des Koeffizientenvergleichs
- Grad eines Polynoms, Eigenschaften der Gradfunktion
- Ein Polynomring über einem Integritätsbereich ist wieder ein Integritätsbereich

**Stoffeinheiten** 1/2/12 - 1/2/15 Algebren

**Schwerpunkte**

- Begriff der Algebra über einem Ring, Strukturhomomorphismus
- Homomorphismen und Isomorphismen von Algebren
- Universaleigenschaft und Eindeutigkeit der Polynomalgebra

**Stoffeinheiten** 1/2/16 - 1/2/18 Polynome in mehreren Unbestimmten

**Schwerpunkte**

- Definition der Polynomalgebra  $R^{[n]}$  in  $n$  Unbestimmten (Monome, Terme, vollständiger Grad)
- Universalität von  $R^{[n]}$
- Adjunktion von Elementen

**Stoffeinheiten** 1/2/19 - 1/2/25 Der Begriff der Teilbarkeit

**Schwerpunkte**

- Teilbarkeit einem kommutativen Integritätsbereich
- Assoziiertheit als Äquivalenzrelation
- Gruppe der Einheiten und irreduzible Elemente

- Größter gemeinsamer Teiler und kleinstes gemeinsames Vielfaches

**Stoffeinheiten** 1/2/26 - 1/2/28 Teilbarkeitslehre im Ring der ganzen Zahlen

**Schwerpunkte**

- Der euklidische Algorithmus
- Lemma von Euklid, Primzahlen
- Hauptsatz der Arithmetik

**Stoffeinheiten** 1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für Ringe

**Schwerpunkte**

- Ideale, durch Teilmengen eines Ringes erzeugte Ideale, Hauptideale
- Konstruktion von Faktoringen
- Homomorphiesatz für Ringe

**Stoffeinheiten** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik

**Schwerpunkte**

- Die endlichen Körper  $\mathbb{F}_p$  ( $p$  Primzahl)
- Der Primkörper eines Körpers

## 1.3 Matrizen

**Stoffeinheiten** 1/3/1 - 1/3/2 Der Begriff der Matrix

**Schwerpunkte**

- Definition der Matrix, Typ einer Matrix, Zeilenindex und Spaltenindex
- Zeilen und Spalten einer Matrix, transponierte Matrix

**Stoffeinheiten** 1/3/3 Erste Matrizenoperationen

**Schwerpunkte**

- Rechnen mit Matrizen über kommutativen Ringen (Addition und Multiplikation mit Elementen des Grundringes)
- Ausführen der Matrizenoperationen an einfachen Beispielen

**Stoffeinheiten** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

**Schwerpunkte**

- Definition des Matrizenprodukts und einige Rechenregeln
- Kroneckersymbol und Einheitsmatrix
- Spezielle quadratische Matrizen (obere und untere Dreiecksmatrizen, schiefssymmetrische Matrizen, Blockdiagonalmatrizen)

# Kapitel 2

## Algebraische Gleichungen

### 2.1 Aufgabenstellung

**Stoffeinheiten** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des Gleichungssystems

**Schwerpunkte**

- Begriff der Lösungsmenge eines polynomialen Gleichungssystems, einfachste Eigenschaften und Beispiele

**Stoffeinheiten** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

**Schwerpunkte**

- Äquivalenz linearer Gleichungssysteme
- Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

### 2.2 Der gaußsche Algorithmus

**Stoffeinheiten** 2/2/1 - 2/2/6 Transformation in eine Stufenform

**Schwerpunkte**

- Elementare Umformungen linearer Gleichungssysteme
- Division mit Rest für lineare Polynome
- Gaußscher Algorithmus zur Überführung eines Systems in Stufengestalt; praktische Ausführung

**Stoffeinheiten** 2/2/7 - 2/2/13 Beschreibung eines linearen Gleichungssystems durch Matrizen und reduzierte Form

**Schwerpunkte**

- Beschreibung der Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems
- Zeilenäquivalente Umformungen von Matrizen
- Reduzierte Form eines linearen Gleichungssystems, Existenz und Eindeutigkeit, praktische Bestimmung

### 2.3 Matrizenrechnung

**Stoffeinheiten** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

**Schwerpunkte**

- Rang einer Matrix, Rangbestimmung unter Verwendung elementarer Zeilenoperationen
- Der Satz von Kronecker-Capelli und Anwendung auf Systeme mit quadratischer Koeffizientenmatrix

**Stoffeinheiten** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

**Schwerpunkte**

- Definition und Charakterisierung invertierbarer Matrizen
- Die Gruppeneigenschaft von  $GL(n; K)$
- Praktische Bestimmung der Inversen einer quadratischen Matrix mit dem Gaußschen Algorithmus

**Stoffeinheiten** 2/3/10 Beispiel: Hill - Ciphern

**Schwerpunkte**

- Durch eine reguläre Matrix über  $\mathbb{F}_{29}$  gegebene Kryptosysteme (Hill-Ciphern)

**Stoffeinheiten** 2/3/11 - 2/3/15 Hauptsatz der Matrizenrechnung

**Schwerpunkte**

- Erzeugung der allgemeinen linearen Gruppe durch Elementarmatrizen
- Der Rang einer Matrix stimmt mit dem ihrer Transponierten überein

**Stoffeinheiten** 2/3/16 - 2/3/18 LR-Zerlegung und Gauß - Bruhat - Zerlegung

**Schwerpunkte**

- Die Untergruppen der Permutationsmatrizen, der oberen und der unteren Dreiecksmatrizen in  $GL(n; K)$
- LR-Zerlegung und Gauß-Bruhat-Zerlegung einer regulären Matrix; praktische Ausführung der Zerlegung

## 2.4 Teilbarkeitslehre im Polynomring einer Unbestimmten

**Stoffeinheiten** 2/4/1 - 2/4/4 Der euklidische Algorithmus

**Schwerpunkte**

- Leitmonome, Division mit Rest
- Euklidischer Algorithmus (Kettendivision) für Polynome einer Unbestimmten

**Stoffeinheiten** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

**Schwerpunkte**

- Nullstellen von Polynomen in einer Unbestimmten (Ausklammern von Linearfaktoren, Multiplizität einer Nullstelle)
- Identitätssatz für Polynome

- Irreduzible Faktoren reeller bzw. komplexer Polynome
- Beispiele irreduzibler Polynome
- Existenz und Eindeutigkeit der Faktorzerlegung in  $K[X]$

**Stoffeinheiten** 2/4/15 - 2/4/21 Endliche algebraische Körpererweiterungen

### Schwerpunkte

- Zerfällungskörper eines Polynoms
- \*Im Polynomring  $K[X]$  einer Unbestimmten über dem Körper  $K$  ist jedes Ideal Hauptideal
- \*Faktorringer nach irreduziblen Polynomen aus  $K[X]$  sind Körper
- \*Satz von Kronecker, Existenz und Eindeutigkeit des Zerfällungskörpers eines Polynoms
- Die formale Ableitung eines Polynoms und mehrfache Nullstellen in Erweiterungskörpern

## 2.5 Allgemeine polynomiale Gleichungssysteme

**Stoffeinheiten** 2/5/1 - 2/5/7 Monomiale Ideale

### Schwerpunkte

- Nullstellenmenge eines Ideals
- Monomiale Ideale und das dicksonsche Lemma

**Stoffeinheiten** 2/5/8 - 2/5/16 Monomordnungen und Division mit Rest

### Schwerpunkte

- Begriff der Monomordnung, Charakterisierung und Beispiele
- Leitmonome und Leitkoeffizienten bezüglich einer Monomordnung
- Division mit Rest für Polynome in mehreren Unbestimmten

**Stoffeinheiten** 2/5/17 - 2/5/27 Gröbnerbasen

### Schwerpunkte

- Leitideal eines Ideals bezüglich einer gegebenen Monomordnung
- Begriff der Gröbnerbasis, Beispiele
- Der hilbertsche Basissatz
- Charakterisierung von Gröbnerbasen und Church-Rosser Eigenschaft der Reste; konstruktive Überprüfung der Idealmitgliedschaft
- Das Buchberger-Kriterium und der Buchberger-Algorithmus; Beispiele

**Stoffeinheiten** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

### Schwerpunkte

- Existenz und Eindeutigkeit reduzierter Gröbnerbasen, Beispiele

**Stoffeinheiten** 2/5/32 - 2/5/36 Ausblick auf die Eliminationstheorie

**Schwerpunkte**

- Eliminationsideale eines Ideals
- Gröbnerbasen von Eliminationsidealen

## 2.6 Symbolisches Rechnen

**Stoffeinheiten** 2/6/1 Erste Schritte mit dem Computer

**Schwerpunkte**

- Machen Sie sich mit den Internet-Seiten einiger Computeralgebrasysteme vertraut

**Stoffeinheiten** 2/6/2 - 2/6/4 Das Computeralgebrasystem SINGULAR

**Schwerpunkte**

- Rechnen mit dem Computeralgebra-System SINGULAR

**Stoffeinheiten** 2/6/5 - 2/6/7 Das Multipurpose-System MuPAD

**Schwerpunkte**

- Rechnen mit dem Multipurpose-System MuPAD

# Kapitel 3

## Vektorräume

### 3.1 Der Begriff des Vektorraumes

**Stoffeinheiten** 3/1/1 - 3/1/5 Elementare Eigenschaften von Vektorräumen

**Schwerpunkte**

- Vektorraum, Begriff und elementare Eigenschaften; Beispiele
- Produkt von Vektorräumen; der Standardraum  $K^n$

**Stoffeinheiten** 3/1/6 - 3/1/11 Homomorphismen von Vektorräumen

**Schwerpunkte**

- Homomorphismen, elementare Eigenschaften

- Homomorphismen und Isomorphismen der Standardräume
- Invarianz der Dimension

**Stoffeinheiten** 3/1/12 - 3/1/23 Untervektorräume

### Schwerpunkte

- Unterräume von Vektorräumen, Unterraumkriterium
- Summe und Durchschnitt von Unterräumen
- Bild und Kern eines Homomorphismus, erste Eigenschaften
- Die lineare Hülle einer Menge von Vektoren

**Stoffeinheiten** 3/1/24 - 3/1/28 Beispiel: Lineare Codes

### Schwerpunkte

- Der Hamming-Abstand auf einem Standardvektorraum
- Fehlerkorrigierende Codes

## 3.2 Direkte Summen und Homomorphie

**Stoffeinheiten** 3/2/1 - 3/2/5 Innere direkte Summe

### Schwerpunkte

- Innere direkte Summe von Unterräumen
- Projektionen auf direkte Summanden

**Stoffeinheiten** 3/2/6 - 3/2/11 Lineare Fortsetzung

### Schwerpunkte

- Lineare Fortsetzung auf direkte Summen
- Direkte Summe von Homomorphismen
- Äußere direkte Summe von Vektorräumen

**Stoffeinheiten** 3/2/12 - 3/2/16 Der Homomorphiesatz für Vektorräume

### Schwerpunkte

- Faktorraum und kanonischer Homomorphismus
- Homomorphiesatz für Vektorräume
- Erster und zweiter Isomorphiesatz

**Stoffeinheiten** 3/2/17 - 3/2/24 Exakte Folgen

### Schwerpunkte

- Exakte Folgen von Vektorräumen, Beschreibung einiger Eigenschaften von Homomorphismen durch exakte Folgen
- Die zu einem Homomorphismus gehörige exakte Folge

- Beziehung zwischen Faktorraum und Komplementärraum
- Existenz von Komplementärräumen
- Beschreibung von Homomorphismen durch Bild, Kern und Kokern

### 3.3 Lineare Unabhängigkeit, Basen und Koordinatensysteme

**Stoffeinheiten** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare Unabhängigkeit

**Schwerpunkte**

- Lineare Unabhängigkeit einer Familie von Vektoren
- Beispiele linear unabhängiger Familien
- Abhängigkeit von Linearkombinationen, Koeffizientenvergleich

**Stoffeinheiten** 3/3/5 - 3/3/16 Basen von Vektorräumen

**Schwerpunkte**

- Basen eines Vektorraumes
- Zu Basen gehörige direkte Zerlegungen und Basen direkter Summen
- Basen und lineare Fortsetzung
- Koordinaten und Koordinatensysteme
- Charakterisierung von Basen
- Existenz von Basen, Basisergänzungssatz
- Klassifikation der Vektorräume

**Stoffeinheiten** 3/3/17 - 3/3/21 Dimension

**Schwerpunkte**

- Begriff der Dimension eines Vektorraumes; Beispiele
- Rang und Defekt linearer Abbildungen, Rangsatz

**Stoffeinheiten** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

**Schwerpunkte**

- Dimension der Summe und der direkten Summe von Unterräumen
- Rang einer linearen Abbildung endlichdimensionaler Standardräume sowie der zugehörigen Matrix
- Auswahl einer maximalen linear unabhängigen Teilmenge aus einer endlichen Menge von Vektoren im Standardraum  $K^n$
- Ergänzung einer linear unabhängigen Teilmenge einer Menge von Vektoren im Standardraum  $K^n$  zu einer Basis bzw. noch allgemeiner:
- Für eine gegebene Basis  $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$  im Standardraum  $K^n$  und eine Menge  $\{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_r\}$  linear unabhängiger Vektoren sind  $r$  der Vektoren  $\mathbf{v}_i$  durch die Vektoren  $\mathbf{w}_j$  so zu ersetzen, dass wiederum eine Basis entsteht (Austauschverfahren).

**Stoffeinheiten** 3/3/27 Beispiel: Fibonaccizahlen

**Schwerpunkte**

- Der Vektorraum der Fibonaccifolgen
- Auffinden einer Basis des Raumes der Fibonaccifolgen, Formel für die Folgenglieder

**Stoffeinheiten** 3/3/28 Beispiel: Magische Matrizen

**Schwerpunkte**

- Der Vektorraum der magischen  $3 \times 3$ -Matrizen
- Bestimmung einer Basis des Raumes der magischen  $3 \times 3$ -Matrizen

**Stoffeinheiten** 3/3/29 Beispiel: Entschlüsselung von Hill - Ciphern

**Schwerpunkte**

- Auffinden einer invertierbaren Matrix über  $\mathbb{F}_{29}$ , mit der ein Text nach dem Verfahren der Hill-Ciphern verschlüsselt wurde

### 3.4 Basiswechsel

**Stoffeinheiten** 3/4/1 - 3/4/8 Die Matrix einer linearen Abbildung

**Schwerpunkte**

- Matrix einer linearen Abbildung bezüglich gegebener Basen; Koordinaten der Bildvektoren
- Übergangsmatrix zwischen Basen eines Vektorraumes; Bestimmung der Übergangsmatrix für Basen des Standardraumes  $K^n$
- Funktorialität der zugeordneten Matrix
- Die lineare Abbildung zu einer gegebenen Matrix

**Stoffeinheiten** 3/4/9 - 3/4/12 Variation der Basen

**Schwerpunkte**

- Umrechnung der Matrix einer linearen Abbildung  $\varphi : K^n \rightarrow K^m$  bezüglich gegebener Paare von Basen (Basiswechsel)
- Bestimmung von Basen für  $\text{im}(\varphi)$  und  $\text{ker}(\varphi)$  zu einer durch ihre Matrix gegebenen linearen Abbildung  $\varphi : K^n \rightarrow K^m$
- Bestimmung von Basen für  $K^n$  und  $K^m$ , für die eine gegebene lineare Abbildung  $\varphi : K^n \rightarrow K^m$  eine Matrix  $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  besitzt
- Begriff der Ähnlichkeit quadratischer Matrizen

### 3.5 Dualität

**Stoffeinheiten** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

**Schwerpunkte**

- Definition des dualen Vektorraumes und der kanonischen Paarung
- Bestimmung dualer Basen zu gegebenen Basen des Standardraumes
- Bestimmung eines Gleichungssystems, dessen Lösungsmenge ein gegebener Unterraum des Standardraumes ist

**Stoffeinheiten** 3/5/12 - 3/5/17 Duale Abbildungen und Kofunktorialität

### Schwerpunkte

- Die duale einer linearen Abbildung, Kofunktorialität und die zugehörige Matrix
- Kanonischer Homomorphismus eines Vektorraumes in seinen bidualen
- Kanonische Isomorphie von  $V$  und  $V^*$  im Fall  $\dim(V) < \infty$

## Kapitel 4

# Multilineare Abbildungen

### 4.1 Einführung

**Stoffeinheiten** 4/1/1 - 4/1/2 Der Vektorraum der  $p$ -linearen Abbildungen

### Schwerpunkte

- Der Begriff der  $p$ -linearen Abbildung
- Beispiele  $p$ -linearer Abbildungen

**Stoffeinheiten** 4/1/3 - 4/1/5 Symmetrische, schiefsymmetrische und alternierende multilineare Abbildungen

### Schwerpunkte

- Der Begriff der symmetrischen, schiefsymmetrischen bzw. alternierenden  $p$ -linearen Abbildung

### 4.2 Determinanten

**Stoffeinheiten** 4/2/1 - 4/2/9 Der Hauptsatz der Determinantentheorie

### Schwerpunkte

- Begriff der Determinantenfunktion
- Existenz und Eindeutigkeit der Determinantenfunktion zu einer gegebenen Basis
- Determinante einer Matrix

- Erste Eigenschaften der Determinante, leibnizsche Formel
- Determinantenfunktionen und Basiswechsel

**Stoffeinheiten** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

### Schwerpunkte

- Der Multiplikationssatz für Determinanten
- Determinante einer Blockmatrix
- Formel für die inverse Matrix
- Laplacescher Entwicklungssatz
- Cramersche Regel

**Stoffeinheiten** 4/2/19 - 4/2/20 Rangbestimmung mit Unterdeterminanten

### Schwerpunkte

- Rangbestimmung für Matrizen mittels Unterdeterminanten

**Stoffeinheiten** 4/2/21 - 4/2/25 Die Determinante eines Endomorphismus

### Schwerpunkte

- Invarianz der Determinante gegenüber Ähnlichkeitstransformationen und Determinante eines Endomorphismus
- Orientierungserhaltende Endomorphismen reeller Standardräume; gleichorientierte Basen

**Stoffeinheiten** 4/2/26 - 4/2/28 Determinanten über kommutativen Ringen

### Schwerpunkte

- Identitätssatz für Polynome mehrerer Unbestimmter über einem unendlichen Körper
- Übertragung einiger Determinanteneigenschaften auf Matrizen über einem kommutativen Ring

## 4.3 Bilinearformen und quadratische Formen

**Stoffeinheiten** 4/3/1 - 4/3/4 Die Matrix einer Bilinearform

### Schwerpunkte

- Duale Paarungen
- Matrix einer Bilinearform, elementare Eigenschaften und Basiswechsel

**Stoffeinheiten** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische Formen

### Schwerpunkte

- Symmetrische Bilinearformen und quadratische Formen, symmetrischer gaußscher Algorithmus

- Äquivalenz quadratischer Formen, Klassifikation über den reellen und komplexen Zahlen
- Determinantenkriterium für positive Definitheit

**Stoffeinheiten** 4/3/17 - 4/3/20 Alternierende Bilinearformen

**Schwerpunkte**

- Symplektische Basen und Klassifikation alternierender Formen

## 4.4 Tensorprodukte

**Stoffeinheiten** 4/4/1 - 4/4/8 Das klassifizierende Objekt bilinearer Abbildungen

**Schwerpunkte**

- Tensorprodukt von Vektorräumen, Universaleigenschaft und Existenz
- Elementare Rechenregeln für Tensoren, Auffinden einer Basis des Tensorprodukts, einige Isomorphismen
- Bifunktorialität des Tensorprodukts

**Stoffeinheiten** 4/4/9 - 4/4/10 Skalarerweiterung

**Schwerpunkte**

- Wechsel des Grundkörpers durch das Tensorprodukt mit einem Erweiterungskörper

**Stoffeinheiten** 4/4/11 - 4/4/12 Kroneckerprodukt von Matrizen

**Schwerpunkte**

- Das Tensorprodukt (Kroneckerprodukt) von Matrizen und seine Eigenschaften

## 4.5 Tensoralgebra

**Stoffeinheiten** 4/5/1 - 4/5/5 Mehrfache Tensorprodukte

**Schwerpunkte**

- $p$ -lineare Abbildungen und  $p$ -fache Tensorprodukte
- Die Tensorpotenzen eines Vektorraumes, Funktorialität
- Die Tensoralgebra eines Vektorraumes; Universalität und funktorielle Eigenschaften

**Stoffeinheiten** 4/5/6 - 4/5/8 Symmetrische und äußere Potenzen

**Schwerpunkte**

- Symmetrische und äußere Potenzen von Vektorräumen
- Funktorialität der symmetrischen und äußeren Potenzen
- Anwendung: Determinante eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten** 4/5/9 - 4/5/18 Symmetrische Algebra und äußere Algebra

**Schwerpunkte**

- Konstruktion der symmetrischen und der äußeren Algebra; funktorielle Eigenschaften
- Charakterisierung der symmetrischen Algebra
- Dimensionen der symmetrischen und der äußeren Potenzen
- Äußere Potenz einer Matrix; Eigenschaften

**Stoffeinheiten** 4/5/19 - 4/5/23 Klassische Tensorrechnung

**Schwerpunkte**

- Gemischte Tensoren  $(p, q)$ -ter Stufe auf einem endlichdimensionalen Vektorraum
- Tensorprodukt, Koordinatentransformation und Dualität für gemischte Tensoren

## Kapitel 5

# Endomorphismen von Vektorräumen

### 5.1 Eigenwerte und charakteristisches Polynom

**Stoffeinheiten** 5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren

**Schwerpunkte**

- Eigenwerte und Eigenvektoren eines Endomorphismus
- Eigenräume eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

**Schwerpunkte**

- Charakteristische Gleichung und charakteristisches Polynom; Bestimmung von Eigenwerten und Eigenräumen
- Charakteristische Polynome direkter Summen von Endomorphismen
- Begleitmatrix eines normierten Polynoms

### 5.2 Diagonalisierbarkeit und Trigonalisierung

**Stoffeinheiten** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

**Schwerpunkte**

- Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus bzw. einer Matrix
- Lineare Unabhängigkeit von Eigenvektoren zu verschiedenen Eigenwerten eines Endomorphismus
- Algebraische und geometrische Multiplizität von Eigenwerten
- Diagonalisierbarkeit – Kriterien und Auffinden einer Diagonalform in der Ähnlichkeitsklasse einer diagonalisierbaren Matrix; Spektralzerlegung eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten** 5/2/8 - 5/2/12 Halbeinfache Endomorphismen

**Schwerpunkte**

- Halbeinfache Matrizen und halbeinfache Endomorphismen
- Simultane Diagonalisierbarkeit
- Invariante Unterräume

**Stoffeinheiten** 5/2/13 - 5/2/17 Trigonalisierung

**Schwerpunkte**

- Fahnen eines Vektorraumes
- Invariante Fahnen und trigonalisierbare Endomorphismen
- Charakterisierung trigonalisierbarer Endomorphismen bzw. Matrizen
- Trigonalisierung einer Matrix, Existenz und rechnerische Ausführung

## 5.3 Nilpotente Endomorphismen

**Stoffeinheiten** 5/3/1 - 5/3/7 Charakterisierung nilpotenter Endomorphismen

**Schwerpunkte**

- Charakterisierung nilpotenter Endomorphismen und (entsprechend) nilpotenter Matrizen
- Klassifikation der nilpotenten Endomorphismen
- Zyklische Unterräume und zyklische Vektoren

**Stoffeinheiten** 5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix

**Schwerpunkte**

- Partitionen und Ähnlichkeitsklassen nilpotenter Matrizen
- Rechnerische Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix

## 5.4 Die jordanische Normalform

**Stoffeinheiten** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

**Schwerpunkte**

- Höhere Eigenräume eines Endomorphismus und Hauptraumzerlegung
- Der Satz von Cayley-Hamilton und das Minimalpolynom eines Endomorphismus
- Existenz und Eindeutigkeit der jordanischen Normalform eines Endomorphismus, dessen charakteristisches Polynom in Linearfaktoren zerfällt
- Rechnerische Bestimmung der jordanischen Normalform einer Matrix

**Stoffeinheiten** 5/4/14 - 5/4/24 Elementarteiler

### Schwerpunkte

- Präsentationsmatrix eines Endomorphismus
- Determinantenteiler und Elementarteiler eines Endomorphismus
- Teilbarkeitseigenschaften der Elementarteiler; jordanische Normalform und Elementarteiler bestimmen sich gegenseitig
- Smithsche Normalform (rechnerische Bestimmung der Elementarteiler)

**Stoffeinheiten** 5/4/25 - 5/4/28 Ähnlichkeit über dem Grundkörper

### Schwerpunkte

- Charakterisierung der Ähnlichkeit von Matrizen durch Übereinstimmung ihrer jordanischen Normalformen nach Skalarerweiterung bzw. durch Äquivalenz der charakteristischen Matrizen

## 5.5 Normalformen über dem Grundkörper

**Stoffeinheiten** 5/5/1 - 5/5/4 Primärzerlegung eines Endomorphismus

### Schwerpunkte

- Primärzerlegung eines Endomorphismus
- Eindeutigkeit der Jordanzerlegung eines Endomorphismus bzw. der Jordanzerlegung einer Matrix

**Stoffeinheiten** 5/5/5 - 5/5/7 Jordanzerlegung über den reellen Zahlen

### Schwerpunkte

- Existenz der Jordanzerlegung eines Endomorphismus über den reellen (und den komplexen) Zahlen

**Stoffeinheiten** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

### Schwerpunkte

- Elementarteiler der Begleitmatrix eines normierten Polynoms
- Natürliche Form einer Matrix und ihre rechnerische Bestimmung
- Primäre Elementarteiler und rationale Normalform
- Klassische Normalform einer Matrix für beliebige Grundkörper

# Kapitel 6

## Geometrie

### 6.1 Affine Räume

**Stoffeinheiten** 6/1/1 - 6/1/4 Definition des affinen Raumes

**Schwerpunkte**

- Der Begriff des affinen Raumes
- Beispiele affiner Räume

**Stoffeinheiten** 6/1/5 - 6/1/9 Affine Abbildungen

**Schwerpunkte**

- Affine Abbildungen und die zugehörigen linearen Abbildungen der Translationsräume
- Erste Eigenschaften affiner Abbildungen
- Die affine Gruppe

**Stoffeinheiten** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

**Schwerpunkte**

- Der Begriff des affinen Unterraumes
- Affine Unterräume des Standardraumes als Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme
- Lagebeziehungen von Unterräumen
- Durchschnitt affiner Unterräume und Verbindungsraum einer Menge von Punkten
- Dimension des Verbindungsraumes zweier affiner Unterräume

**Stoffeinheiten** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

**Schwerpunkte**

- Affin unabhängige Familien von Punkten
- Existenz affiner Basen
- Affine Fortsetzung und affine Koordinatensysteme; Bestimmung affiner Koordinaten
- Affine Koordinatentransformation in  $K[X_1, \dots, X_n]$

**Stoffeinheiten** 6/1/28 - 6/1/30 Affine Quadriken

**Schwerpunkte**

- Affine Hauptachsenpolynome reeller und komplexer Quadriken

- Auffinden des Hauptachsenpolynoms einer affinen Quadrik durch quadratische Ergänzung

**Stoffeinheiten** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

**Schwerpunkte**

- Die Fixpunktmenngen affiner Abbildungen eines affinen Raumes in sich
- Parallelprojektion eines Unterraumes auf einen anderen

## 6.2 Euklidische und unitäre Räume

**Stoffeinheiten** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

**Schwerpunkte**

- Sesquilinearformen und hermitesche Formen; positive Definitheit
- Begriff des unitären Vektorraumes; elementare Eigenschaften der Norm
- Winkel zwischen Vektoren eines euklidischen Vektorraumes

**Stoffeinheiten** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

**Schwerpunkte**

- Orthogonalisierungsverfahren nach E. Schmidt
- Orthogonales Komplement eines Unterraumes
- Koordinaten bezüglich Orthonormalbasen (parsevalsche Gleichung und besselsche Ungleichung)

**Stoffeinheiten** 6/2/15 - 6/2/16 Euklidische affine Räume

**Schwerpunkte**

- Begriff des euklidischen affinen Raumes
- Durch die Norm des Translationsraumes definierte Metrik eines affinen euklidischen Raumes
- Orthonormale Koordinatensysteme in euklidischen affinen Räumen

**Stoffeinheiten** 6/2/17 - 6/2/22 Abstand von Unterräumen

**Schwerpunkte**

- Orthogonale Projektion auf einen affinen Unterraum
- Abstand zweier affiner Unterräume
- Die hessesche Normalform und ihre Verallgemeinerung

**Stoffeinheiten** 6/2/23 - 6/2/26 Ausgleichsrechnung

**Schwerpunkte**

- Lösungen inkonsistenter linearer Gleichungssysteme im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate

- Zu einem linearen Gleichungssystem gehöriges normales System
- Approximation von Funktionen durch ausgleichende Polynome

**Stoffeinheiten** 6/2/27 - 6/2/32 Volumen

**Schwerpunkte**

- Determinantenfunktion und Volumen, Gramsche Determinante
- Orientierter Winkel zwischen zwei Vektoren in der orientierten euklidischen Ebene

**Stoffeinheiten** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt

**Schwerpunkte**

- Elementare Eigenschaften des Vektorprodukts in einem orientierten dreidimensionalen euklidischen Raum
- Koordinaten des Vektorprodukts und Konstruktion von Basen
- Formeln für das Vektorprodukt und Anwendungen (Jacobi-Identität, Abstand von Geraden, plückersche Geradengleichung)

## 6.3 Spektralzerlegung normaler Operatoren

**Stoffeinheiten** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

**Schwerpunkte**

- Der Adjungierte eines Endomorphismus unitärer Vektorräume
- Elementare Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus
- Spektralsatz für selbstadjungierte Endomorphismen und praktische Ausführung der Spektralzerlegung
- Unitäre Automorphismen

**Stoffeinheiten** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

**Schwerpunkte**

- Cartan-Zerlegung eines Endomorphismus
- Der Spektralsatz für normale Operatoren (komplexer Fall) und Anwendung auf die Klassifikation normaler Operatoren euklidischer Räume

**Stoffeinheiten** 6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen

**Schwerpunkte**

- Typen orthogonaler Endomorphismen euklidischer Vektorräume
- Klassifikation orthogonaler Endomorphismen in den Dimensionen 2, 3

**Stoffeinheiten** 6/3/16 - 6/3/17 Affine Isometrien

**Schwerpunkte**

- Isometrien euklidischer affiner Räume

- Klassifikation der Isometrien euklidischer affiner Räume in den Dimensionen 2 und 3

**Stoffeinheiten** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Schwerpunkte**

- Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken
- Rechnerische Bestimmung der metrischen Typen von Quadriken und Veranschaulichung in den Dimensionen 2 und 3

**Stoffeinheiten** 6/3/21 - 6/3/26 Polare Zerlegung eines Automorphismus

**Schwerpunkte**

- Positive und semipositive Endomorphismen unitärer Vektorräume
- Die Wurzel aus einem semipositiven Endomorphismus
- Polare Zerlegung eines Automorphismus und rechnerische Bestimmung der polaren Zerlegung einer regulären Matrix

## 6.4 Lineare dynamische Systeme

**Stoffeinheiten** 6/4/1 - 6/4/7 Begriff des dynamischen Systems

**Schwerpunkte**

- Begriff des dynamischen Systems, Beispiele
- Existenz- und Eindeutigkeitssatz für Lösungen linearer Differenzialgleichungssysteme erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten

**Stoffeinheiten** 6/4/8 - 6/4/13 Norm eines Endomorphismus

**Schwerpunkte**

- Norm eines Endomorphismus bzw. einer Matrix
- Grenzwert einer Folge von Endomorphismen
- Vollständigkeit von  $\text{End}_{\mathbb{K}}(\mathbb{K}^n)$
- Rechnen mit konvergenten Reihen von Endomorphismen

**Stoffeinheiten** 6/4/14 - 6/4/15 Das Exponential

**Schwerpunkte**

- Exponential eines Endomorphismus bzw. einer Matrix
- Bestimmung des Exponentials für nilpotente und für diagonalisierbare Matrizen

**Stoffeinheiten** 6/4/16 - 6/4/21 Homogene lineare Differenzialgleichungssysteme

**Schwerpunkte**

- Lösungen homogener linearer Differenzialgleichungssysteme (komplexer und reeller Fall)

- Produktzerlegung eines linearen dynamischen Systems mittels Jordanzerlegung der zugehörigen Matrix

**Stoffeinheiten** 6/4/22 - 6/4/24 Lineare Differentialgleichungen höherer Ordnung

**Schwerpunkte**

- Lineare Differentialgleichungen  $n$ -ter Ordnung; Zurückführung auf Systeme erster Ordnung (Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen, Bestimmung einer Basis des Lösungsraumes)

# Teil II: Die Aufgaben

## Aufgaben zum Kapitel 0

### Aufgabe 0/1/010

Mengenoperationen (1)

**Index:** Differenz von Mengen, Durchschnitt zweier Mengen, Vereinigung zweier Mengen

**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen

$A, B, C$  seien Mengen. Beweisen Sie:

- (1)  $(A \cap B) \cup C = (A \cup B) \cap (B \cup C)$ ,
- (2)  $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ ,
- (3)  $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus C) \cap (A \setminus B)$ ,
- (4) Ist  $A \cup B = A \cup C$  und  $A \cap B = A \cap C$ , so gilt  $B = C$ .

### Aufgabe 0/1/020

Mengenoperationen (2), Komplementärmenge

**Index:** Differenz von Mengen, Durchschnitt zweier Mengen, Vereinigung zweier Mengen, Komplement von Mengen

**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen

Es sei  $M$  eine Menge. Für  $X \subseteq M$  bezeichne  $C_M(X)$  das Komplement von  $X$  in  $M$ . Zeigen Sie, dass für beliebige Teilmengen  $X, Y, Z \subseteq M$  gilt:

- (1)  $C_M(X \cup Y) = C_M(X) \cap C_M(Y)$ ,
- (2)  $C_M(X \cap Y) = C_M(X) \cup C_M(Y)$ ,
- (3)  $C_M(X) \setminus Y = C_M(X \cup Y)$ ,
- (4)  $X \setminus (Y \cup Z) = X \cap C_M(Y \cup Z) = (X \setminus Y) \cap (X \setminus Z)$   
 $= X \cap C_M(Y) \cap C_M(Z)$ .

### Aufgabe 0/1/030

Mengenoperationen (3)

**Index:** Komplement von Mengen, Durchschnitt eines Mengensystems, Vereinigung eines Mengensystems

**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen

Es sei  $M$  eine Menge. Für  $X \subseteq M$  bezeichne  $C_M(X)$  das Komplement von  $X$  in  $M$ . Weiter sei  $S = \{X_i \mid i \in I\}$  ein System von Mengen mit  $X_i \subseteq M$ . Zeigen Sie:

- (1)  $C_M\left(\bigcup_{i \in I} X_i\right) = \bigcap_{i \in I} C_M(X_i)$ ,

$$(2) \quad C_M\left(\bigcap_{i \in I} X_i\right) = \bigcup_{i \in I} C_M(X_i).$$

**Aufgabe** 0/1/040

Durchschnitt eines Mengensystems

**Index:** Komplement von Mengen, Durchschnitt eines Mengensystems, Vereinigung eines Mengensystems, leere Menge**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen

Es sei  $M = \{X_i \mid i \in I\}$  ein System von Mengen mit der Eigenschaft  $\bigcap_{i \in I} X_i = \emptyset$ . Beweisen oder widerlegen Sie durch Angabe eines Gegenbeispiels: Es gibt Mengen  $X_i, X_j \in M$ , so dass  $X_i \cap X_j = \emptyset$ .

**Aufgabe** 0/1/050

Mengenoperationen, kartesisches Produkt

**Index:** kartesisches Produkt, Durchschnitt zweier Mengen, Vereinigung zweier Mengen**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 MengenZeigen Sie, dass für Mengen  $A, B, C, D$  stets gilt:

- (1)  $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ ,
- (2)  $(A \cup B) \times C = (A \times C) \cup (B \times C)$ ,
- (3)  $(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$ ,
- (4)  $(A \times B) \cup (C \times D) \subseteq (A \cup C) \times (B \cup D)$ , (!)
- (5)  $A \times B = \emptyset \iff A = \emptyset$  oder  $B = \emptyset$ .

**Aufgabe** 0/1/060

Potenzmengen

**Index:** Potenzmenge**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen

Bestimmen Sie die folgenden Potenzmengen:

- (1)  $\text{Pot}(\{\emptyset\})$ ,  $\text{Pot}(\text{Pot}(\{\emptyset\}))$ ,  $\text{Pot}(\text{Pot}(\text{Pot}(\emptyset)))$ ,
- (2) die Potenzmenge der Menge  $\text{Pot}(\{2, 3\})$ .

**Aufgabe** 0/1/070

Potenzmengen und Mengenoperationen

**Index:** Potenzmenge, Durchschnitt zweier Mengen, Vereinigung zweier Mengen, Teilmengenbeziehung**Stoffeinheiten:** 0/1/1 - 0/1/15 Mengen $A$  und  $B$  seien Mengen. Zeigen Sie:

- (1)  $\text{Pot}(A) \cap \text{Pot}(B) = \text{Pot}(A \cap B)$ .
- (2) Wenn  $A \subseteq B$ , so  $\text{Pot}(A) \subseteq \text{Pot}(B)$ .

(3)  $\text{Pot}(A) \cup \text{Pot}(B) \subseteq \text{Pot}(A \cup B)$  (wann gilt Gleichheit?)

**Aufgabe** 0/2/010

(S: Varianten)

Wahrheitswerte (1)

**Index:** Wahrheitswert, klassische Aussagenverbindungen

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A, B, C, D, E, J, K, L$ , seien Aussagen. Entscheiden Sie, welchen Wahrheitswert die Aussagenverbindung

$$\Phi : (\neg J \wedge K) \vee (((A \wedge B) \Rightarrow C) \Rightarrow D) \wedge (E \vee L)$$

hat, wenn die Wahrheitswerte der Grundaussagen durch die folgende Tabelle gegeben sind.

A	B	C	D	E	J	K	L
W	F	F	F	F	F	F	W

**Ergebnis.**  $\Phi$  hat den Wahrheitswert F.

**Aufgabe** 0/2/011

(S: Varianten)

Wahrheitswerte (2)

**Index:** Wahrheitswert, klassische Aussagenverbindungen

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A, B, C$  und  $D$  seien Aussagen. Bestimmen Sie den Wahrheitswert der Aussagenverbindung

$$\Phi := (D \Rightarrow A) \wedge (\neg C \vee B),$$

wenn die Wahrheitswerte der Grundaussagen  $A, B, \dots$  durch die folgende Tabelle gegeben sind.

A	B	C	D
W	W	W	W

**Ergebnis.** Wir setzen  $\varphi := D \Rightarrow A$ ,  $\psi := \neg C \vee B$  und erhalten leicht die Wahrheitswerte für  $\varphi$ ,  $\psi$  und  $\Phi$ , die in der nachfolgenden Tafel angegeben sind.

$\varphi$	$\psi$	$\Phi$
W	W	W

**Aufgabe** 0/2/012

(S: Varianten)

Wahrheitswerte (3)

**Index:** Wahrheitswert, klassische Aussagenverbindungen

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A, B, C, D, U, V, H$  seien Aussagen. Bestimmen Sie den Wahrheitswert der Aussagenverbindung

$$\Phi := (A \Rightarrow D) \wedge (\neg B \vee V),$$

wenn die Wahrheitswerte der Grundaussagen  $A, B, \dots$  durch die folgende Tabelle gegeben sind.

A	B	C	D	E	U	V	H
F	W	W	W	W	F	F	W

**Ergebnis.** Selbstverständlich hängt das Ergebnis nur von denjenigen Aussagen ab, die in der Aussagenverbindung  $\Phi$  auftreten. Wir setzen  $\varphi := A \Rightarrow D$ ,  $\psi := \neg B \vee V$  und erkennen leicht die Wahrheitswerte für  $\varphi$ ,  $\psi$  und  $\Phi$ , die in der nachfolgenden Tafel angegeben sind.

$\varphi$	$\psi$	$\Phi$
W	F	F

**Aufgabe** 0/2/013

(S: Varianten)

Wahrheitswerte (4)

**Index:** Wahrheitswert, klassische Aussagenverbindungen

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A, B, C, D, E, U, V, H$  seien Aussagen. Bestimmen Sie den Wahrheitswert der Aussagenverbindung

$$\Phi := ((U \Rightarrow A) \wedge (\neg E \vee C)) \vee ((D \Rightarrow B) \wedge (V \Rightarrow \neg H)),$$

wenn die Wahrheitswerte der Grundaussagen  $A, B, \dots$  durch die folgende Tabelle gegeben sind.

A	B	C	D	E	U	V	H
W	W	W	F	F	W	W	W

**Ergebnis.** Wir setzen  $\alpha_1 = U \Rightarrow A$ ,  $\alpha_2 = \neg E \vee C$ ,  $\alpha_3 = D \Rightarrow B$ ,  $\alpha_4 = V \Rightarrow \neg H$ ,  $\alpha_5 = (U \Rightarrow A) \wedge (\neg E \vee C)$ ,  $\alpha_6 = (D \Rightarrow B) \wedge (V \Rightarrow \neg H)$ . Nun ist zu sehen, dass die Wahrheitswerte für die Aussagen  $\alpha_i$  und damit auch für  $\Phi$  durch die folgende Tafel gegeben sind.

$\alpha_1$	$\alpha_2$	$\alpha_3$	$\alpha_4$	$\alpha_5$	$\alpha_6$	$\Phi$
W	W	W	F	W	F	W

**Aufgabe** 0/2/014

(S: Varianten)

Wahrheitswerte (5)

**Index:** Wahrheitswert, klassische Aussagenverbindungen

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A, B, C$  und  $D$  seien Aussagen. Bestimmen Sie den Wahrheitswert der Aussagenverbindung

$$\Phi := (C \vee A) \wedge (\neg B \Rightarrow D)$$

für alle möglichen Wahrheitswerte der Grundaussagen  $A, B, C$  und  $D$ .

**Ergebnis.** Wir setzen  $\varphi := C \vee A$ ,  $\psi := \neg B \Rightarrow D$  und erhalten leicht die Wahrheitswerte für  $\varphi$ ,  $\psi$  und  $\Phi$ , die in der nachfolgenden Tafel angegeben sind.

A	B	C	D	$\varphi$	$\psi$	$\Phi$
W	W	W	W	W	W	W
W	W	W	F	W	W	W
W	W	F	W	W	W	W
W	F	W	W	W	W	W
F	W	W	W	W	W	W
F	F	W	W	W	W	W
F	W	F	W	F	W	F
F	W	W	F	W	W	W
W	F	F	W	W	W	W
W	F	W	F	W	F	F
W	W	F	F	W	W	W
F	F	F	W	F	W	F
F	F	W	F	W	F	F
F	W	F	F	F	W	F
W	F	F	F	W	F	F
F	F	F	F	F	F	F

**Aufgabe 0/2/015**

(S: Varianten)

Wahrheitswerte (6)

**Index:** Wahrheitswert, klassische Aussagenverbindungen, Wahrheitswerttabelle**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe $A$ ,  $B$ ,  $C$  und  $D$  seien Aussagen. Wir setzen

$$\Phi := (B \wedge A) \Rightarrow (\neg C \vee D), \quad \varphi := B \wedge A, \quad \psi := \neg C \vee D.$$

Bestimmen Sie zu allen möglichen Wahrheitswerten der Grundaussagen  $A$ ,  $B$ ,  $C$  und  $D$  den Wahrheitswert für  $\Phi$ , indem Sie die folgende Tabelle ergänzen.

A	B	C	D	$\varphi$	$\psi$	$\Phi$
W	W	W	W	W	W	W
W	W	W	F			
W	W	F	W	W	W	W
W	F	W	W			
F	W	W	W			
F	F	W	W			
F	W	F	W	F	W	W
F	W	W	F			
W	F	F	W			
W	F	W	F			
W	W	F	F			
F	F	F	W	F	W	W
F	F	W	F			
F	W	F	F			
W	F	F	F	F	W	W
F	F	F	F	F	W	W

**Ergebnis.** Die vervollständigte Tabelle sieht so aus:

A	B	C	D	$\varphi$	$\psi$	$\Phi$
W	W	W	W	W	W	W
W	W	W	F	W	F	F
W	W	F	W	W	W	W
W	F	W	W	F	W	W
F	W	W	W	F	W	W
F	F	W	W	F	W	W
F	W	F	W	F	W	W
F	W	W	F	F	F	W
W	F	F	W	F	W	W
W	F	W	F	F	F	W
W	W	F	F	W	W	W
F	F	F	W	F	W	W
F	F	W	F	F	F	W
F	W	F	F	F	W	W
W	F	F	F	F	W	W
F	F	F	F	F	W	W

### Aufgabe 0/2/020

Äquivalenz von Aussagen (1)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Wahrheitswerttabelle, Äquivalenz von Aussagen

**Stoffeinheiten:** [0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe](#)

Untersuchen Sie mit Hilfe von Wahrheitswerttabellen, ob folgende Aussagen äquivalent sind:

- (1)  $A \Leftrightarrow B$ ;  $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$ ,
- (2)  $A \Rightarrow B$ ;  $B \Rightarrow A$ ,
- (3)  $A \Rightarrow B$ ;  $\neg B \Rightarrow \neg A$ .

### Aufgabe 0/2/030

Äquivalenz von Aussagen (2)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Wahrheitswerttabelle, Abtrennungsregel, Kettenchluss, Kontraposition, indirekter Beweis, Beweisprinzipien

**Stoffeinheiten:** [0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe](#)

Zeigen Sie, dass die folgenden Aussagen gültig sind:

- (1)  $(A \wedge (A \Rightarrow B)) \Rightarrow B$  (Abtrennungsregel),
- (2)  $((A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$  (Kettenregel),
- (3)  $(A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow \neg A)$  (Kontraposition),
- (4)  $(\neg A \Rightarrow (B \wedge \neg B)) \Rightarrow A$  (eine Form des indirekten Beweises).

**Aufgabe 0/2/040**

Aussagenverbindungen (1)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Wahrheitstabelle, Implikation**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A, B, C$  seien Aussagenvariablen. Stellen Sie Wahrheitstabellen für folgende Ausdrücke auf:

- (1)  $(A \Rightarrow B) \Rightarrow ((A \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow B \wedge C))$ ,
- (2)  $((A \Rightarrow B) \Rightarrow (B \Rightarrow C)) \Rightarrow (B \Rightarrow C)$ ,
- (3)  $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow C)$ ,
- (4)  $(A \vee B) \Rightarrow (B \Rightarrow C)$ .

**Aufgabe 0/2/050**

Aussagenverbindungen (2)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Implikation**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

$A_1, \dots, A_n$  seien Ausdrücke und  $B$  sei ein gültiger Ausdruck.

- (1) Zeigen Sie, dass  $A_1 \Rightarrow (A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow (A_n \Rightarrow B) \dots)$  und  $\neg B \Rightarrow (A_1 \Rightarrow (A_2 \Rightarrow \dots \Rightarrow (A_{n-1} \Rightarrow A_n) \dots))$  gültig sind.
- (2) Für welche  $n$  ist  $\underbrace{(\dots(((A \Rightarrow A) \Rightarrow A) \Rightarrow A) \dots)}_{n \text{ Pfeile}} \Rightarrow A$  gültig?

**Aufgabe 0/2/060**

Aussagenverbindungen (3)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Äquivalenz von Aussagen**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Ersetzen Sie den Ausdruck  $(A \Leftrightarrow B) \Rightarrow ((A \Rightarrow B) \vee (B \Rightarrow A))$  äquivalent durch einen, in dem höchstens noch  $\neg$  und  $\wedge$  als logische Zeichen vorkommen.

**Aufgabe 0/2/070**

Aussagenverbindungen (4)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Negation**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Bilden Sie die Negation der folgenden Ausdrücke, so dass  $\neg$  höchstens noch vor den Aussagenvariablen  $A, B, C, D, E$  vorkommt!

- (1)  $A \vee (B \wedge C)$ ,
- (2)  $A \vee (B \Rightarrow ((C \Rightarrow D) \vee E))$ ,
- (3)  $\neg A \Leftrightarrow (B \vee C)$ ,
- (4)  $(A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$ ,
- (5)  $(A \Rightarrow \neg B) \vee (\neg A \Rightarrow B)$ ,
- (6)  $(A \wedge B) \Leftrightarrow ((A \wedge C) \Rightarrow (B \wedge C))$ .

**Aufgabe 0/2/080**

## Aussagenverbindungen (5)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Wahrheitstabelle, indirekter Beweis**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Untersuchen Sie mit Hilfe von Wahrheitstabellen, ob die folgenden Aussagen gültig sind:

- (1)  $(\neg A \Rightarrow B) \wedge (\neg A \Rightarrow \neg B) \Rightarrow A$  (eine Form des indirekten Beweises),
- (2)  $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg(A \Rightarrow B)$ ,
- (3)  $(A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C) \Rightarrow (A \Rightarrow (B \vee C))$ .

**Aufgabe** 0/2/090

## Aussagenverbindungen (6)

**Index:** klassische Aussagenverbindungen, Äquivalenz von Aussagen, Negation**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Überprüfen Sie die Gültigkeit der angegebenen Äquivalenzen, wobei  $\varphi, \psi, \chi$  beliebige Ausdrücke sind.

## (1) Assoziativität

$$\varphi \wedge (\psi \wedge \chi) \iff (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi,$$

$$\varphi \vee (\psi \vee \chi) \iff (\varphi \vee \psi) \vee \chi.$$

## (2) Idempotenz

$$\varphi \wedge \varphi \iff \varphi,$$

$$\varphi \vee \varphi \iff \varphi.$$

## (3) Kommutativität

$$\varphi \wedge \psi \iff \psi \wedge \varphi,$$

$$\varphi \vee \psi \iff \psi \vee \varphi,$$

$$\varphi \leftrightarrow \psi \iff \psi \leftrightarrow \varphi.$$

## (4) Definierbarkeit

$$\varphi \wedge \psi \iff \neg(\neg\varphi \vee \neg\psi),$$

$$\varphi \vee \psi \iff \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi),$$

$$\varphi \Rightarrow \psi \iff \neg\varphi \vee \psi,$$

$$\varphi \leftrightarrow \psi \iff (\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\psi \Rightarrow \varphi).$$

## (5) Distributivität

$$\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \iff (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi),$$

$$\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \iff (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi),$$

$$\varphi \Rightarrow (\psi \wedge \chi) \iff (\varphi \Rightarrow \psi) \wedge (\varphi \Rightarrow \chi),$$

$$\varphi \Rightarrow (\psi \vee \chi) \iff (\varphi \Rightarrow \psi) \vee (\varphi \Rightarrow \chi).$$

## (6) Negation

$$\neg(\neg\varphi) \iff \varphi,$$

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \iff \neg\varphi \vee \neg\psi,$$

$$\neg(\varphi \vee \psi) \iff \neg\varphi \wedge \neg\psi,$$

$$\neg(\varphi \Rightarrow \psi) \iff \varphi \wedge \neg\psi,$$

$$\neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \iff (\varphi \wedge \neg\psi) \vee (\neg\varphi \wedge \psi).$$

**Aufgabe** 0/2/100

## Binomialkoeffizienten

**Index:** vollständige Induktion, Induktionsaxiom, Induktionsschritt, Induktionsbehauptung, Anfangsschritt, Induktionsvoraussetzung

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Für natürliche Zahlen  $k \leq n$  setzen wir  $\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}$ , wobei  $n! := 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$  ist. Die Zahl  $\binom{n}{k}$  heißt *Binomialkoeffizient*.

Zeigen Sie:

- (1) Für  $k < n$  gilt:  $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$  und  $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ .
- (2) Es ist stets  $\binom{2n}{n} \geq 2^n$ .
- (3) Der Binomialkoeffizient  $\binom{n}{k}$  ist die Anzahl der Möglichkeiten, aus einer  $n$ -elementigen Menge eine  $k$ -elementige Teilmenge auszuwählen.

**Aufgabe** 0/2/110

Potenzmenge, Anzahl der Elemente

**Index:** vollständige Induktion, Induktionsaxiom, Induktionsschritt, Induktionsbehauptung, Anfangsschritt, Induktionsvoraussetzung, Potenzmenge

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Es sei  $n$  eine natürliche Zahl und  $M$  eine  $n$ -elementige Menge.

Zeigen sie, dass  $\text{Pot}(M)$  genau  $2^n$  Elemente enthält.

**Aufgabe** 0/2/120

Vollständige Induktion (1)

**Index:** vollständige Induktion, Induktionsaxiom, Induktionsschritt, Induktionsbehauptung, Anfangsschritt, Induktionsvoraussetzung

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Beweisen Sie durch vollständige Induktion, dass für natürliche Zahlen  $n \geq 1$  die folgenden Beziehungen erfüllt sind:

- (a)  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ,
- (b)  $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

**Aufgabe** 0/2/130

Vollständige Induktion (2)

**Index:** vollständige Induktion, Induktionsaxiom, Induktionsschritt, Induktionsbehauptung, Anfangsschritt, Induktionsvoraussetzung

**Stoffeinheiten:** 0/2/1 - 0/2/7 Logische Grundbegriffe

Beweisen Sie durch vollständige Induktion, dass für  $n \in \mathbb{N}$  die folgenden Beziehungen erfüllt sind:

- (1) Wenn  $n \geq 1$  so ist  $4^n + 15n - 1$  durch 9 teilbar.
- (2) Für  $n > 3$  ist  $2^n + 1 > n^2$ .

**Aufgabe 0/3/010**

Potenzmenge und charakteristische Funktion

**Index:** bijektive Abbildung, Abbildung**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und AbbildungenFür jede Menge  $M$  ist durch

$$\text{Char}_M(x) := \begin{cases} 1, & \text{falls } x \in M, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

die *charakteristische Abbildung von  $M$*  definiert.Zeigen Sie, dass  $X \mapsto \text{Char}_X$  mit  $X \subseteq M$  eine Bijektion zwischen  $\text{Pot}(M)$  und  $\text{Abb}(M, 2)$  ist.**Aufgabe 0/3/020**

Relationen, Beispiele (1)

**Index:** Relation, Eigenschaften von Relationen**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und AbbildungenGeben Sie in der Menge  $M = \{1, 2, 3, 4\}$  Relationen  $R_1, R_2, R_3$  und  $R_4$  an, für die gilt:

- (1)  $R_1$  ist reflexiv, transitiv und nicht symmetrisch.
- (2)  $R_2$  ist reflexiv, symmetrisch und nicht transitiv.
- (3)  $R_3$  ist transitiv, symmetrisch und nicht reflexiv.
- (4)  $R_4$  ist transitiv, symmetrisch und reflexiv.

**Aufgabe 0/3/030**

Relationen, Beispiele (2)

**Index:** Relation, Eigenschaften von Relationen**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und AbbildungenGeben Sie jeweils eine nichtleere Menge  $A$  und eine Relation  $R \subseteq A \times A$  mit den folgenden Eigenschaften an:

- (1)  $R$  ist reflexiv, symmetrisch und nicht transitiv,
- (2)  $R$  symmetrisch, nicht reflexiv und nicht transitiv,
- (3)  $R$  ist reflexiv, transitiv und nicht symmetrisch,
- (4)  $R$  ist irreflexiv, antisymmetrisch und transitiv,
- (5)  $R$  ist reflexiv, transitiv und nicht antisymmetrisch.

**Aufgabe 0/3/040**Differenzgleichheit auf  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ **Index:** Differenzgleichheit, Äquivalenzrelation, Relation**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen

Man beweise folgende Behauptungen:

- (1) Die in  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  definierte Relation  $(m, n) \sim (k, l) \iff m + l = n + k$  ist eine Äquivalenzrelation.

- (2) Ist  $(m, n) +_p (k, l) := (m + k, n + l)$   
 und  $(m, n) \cdot_p (k, l) := (m \cdot k + n \cdot l, m \cdot l + n \cdot k)$ ,  
 dann sind  $+_p, \cdot_p$  assoziativ und kommutativ und es gilt das Distributivgesetz.

**Aufgabe 0/3/050**

Operationen rationaler Zahlen

**Index:** Quotientengleichheit, Äquivalenzrelation, Relation, Repräsentantenunabhängigkeit**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen

Beweisen Sie folgende Behauptungen:

- (1) Die in  $\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$  definierte Relation  $(a, b) \sim (c, d) \iff a \cdot d = b \cdot c$  ist eine Äquivalenzrelation.
- (2) Die Vorschriften  $(a, b) +_q (c, d) := (a \cdot d + b \cdot c, b \cdot d)$  und  $(a, b) \cdot_q (c, d) := (a \cdot c, b \cdot d)$  sind auf den Klassen der obigen Relation wohldefiniert, d.h. die Klasse der rechten Seite ist jeweils unabhängig von der Wahl der Repräsentanten der auf der linken Seite auftretenden Paare.

**Aufgabe 0/3/060**

Lexikographische Ordnung

**Index:** Ordnung, lexikographische Ordnung**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und AbbildungenGeben sie die lexikographische Ordnung auf  $M^3$  an, wenn  $M$  die Teilmenge  $M = \{2, 3, 5\}$  der natürlichen Zahlen (mit der üblichen Ordnung) bezeichnet.**Aufgabe 0/3/070**

Abbildungen, Wertetafeln

**Index:** Abbildung, Wertetafel einer Abbildung**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und AbbildungenGeben Sie alle Abbildungen  $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1, 2\}$  durch ihre Wertetafeln an. Welche dieser Abbildungen sind injektiv, surjektiv bzw. bijektiv?**Aufgabe 0/3/080**

Eigenschaften von Abbildungen (1)

**Index:** Abbildung, Eigenschaften von Abbildungen, Komposition von Abbildungen, injektive Abbildung, surjektive Abbildung, Produkt von Abbildungen**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen $f$  und  $g$  seien Abbildungen, für die  $f \circ g$  definiert ist. Beweisen Sie:

- (1) Ist  $f \circ g$  surjektiv, so ist auch  $f$  surjektiv.
- (2) Ist  $f \circ g$  injektiv, so ist auch  $g$  injektiv.
- (3) Gilt unter (1) bzw. (2) die Behauptung auch für die jeweils andere Abbildung  $g$  bzw.  $f$ ?

**Aufgabe 0/3/090**

Eigenschaften von Abbildungen (2)

**Index:** Abbildung, Eigenschaften von Abbildungen, Komposition von Abbildungen, injektive Abbildung, bijektive Abbildung, Produkt von Abbildungen, Umkehrabbildung**Stoffeinheiten:** [0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen](#)

Beweisen Sie die folgenden Behauptungen:

- (1) Ist  $f : A \rightarrow B$  bijektiv, dann ist auch  $f^{-1} : B \rightarrow A$  bijektiv, und für jedes  $a \in A$  bzw.  $b \in B$  gilt:  $f^{-1}(f(a)) = a$  und  $f(f^{-1}(b)) = b$  (d.h.,  $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$  und  $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ ).
- (2) Sind  $f : A \rightarrow B$  und  $g : B \rightarrow C$  injektiv (bzw. bijektiv), dann ist auch  $g \circ f : A \rightarrow C$  injektiv (bzw. bijektiv).
- (3) Für  $f_i : M_i \rightarrow M_{i+1}$  mit  $i = 1, 2, 3$  ist  $f_3 \circ (f_2 \circ f_1) = (f_3 \circ f_2) \circ f_1$  (d.h., das Produkt von Abbildungen ist assoziativ).

**Aufgabe 0/3/100**

Eigenschaften von Abbildungen (3)

**Index:** gleichmächtige Mengen, surjektive Abbildung**Stoffeinheiten:** [0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen](#)Beweisen Sie: Sind  $M$  und  $N$  Mengen und existiert eine surjektive Abbildung  $M \rightarrow N$ , so ist  $N \preceq M$ .

Gilt die Umkehrung? Vorsicht!

**Aufgabe 0/3/110**

Natürliche Zahlen

**Index:** natürliche Ordnung, Addition ganzer Zahlen**Stoffeinheiten:** [0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen](#)Addition und natürliche Ordnung der Menge  $\mathbb{N}$ :Wir erinnern zunächst an die Definitionen.  $0 := \emptyset \in \mathbb{N}$ , und für  $n \in \mathbb{N}$  wird  $n+1$  durch  $n+1 := n \cup \{n\}$  definiert; so erhalten wir nach den peanoschen Axiomen die gesamte Menge  $\mathbb{N}$ . Weiter wird vereinbart:

- (i)  $n+k := n$  für  $k=0$  sowie  $n+(k+1) := (n+k)+1$  für beliebige  $k \in \mathbb{N}$  (*Addition auf  $\mathbb{N}$* ).
- (ii)  $n < m$  falls  $n \in m$  (*natürliche Ordnung auf  $\mathbb{N}$* ).

Entsprechend (ii) gilt  $m = \{x \mid x < m\}$  („Gleichheit von Mengen“).Beweisen Sie für beliebige  $m, n, k \in \mathbb{N}$ :

- (1)  $m < n \Rightarrow (m+1 < n \vee m+1 = n)$ ,
- (2)  $m < n \Rightarrow m+1 < n+1$ ,
- (3)  $m < n \Rightarrow m+k < n+k$  (Hinweis: vollständige Induktion).

**Aufgabe 0/3/120**

Mengenpotenzen (1)

**Index:** Abbildung, Definitionsbereich einer Abbildung, Bild einer Abbildung**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und AbbildungenFür die Mengen  $M, N$  bezeichne  $M^N$  die Menge aller Abbildungen von  $N$  in  $M$ .

- (1) Bestimmen Sie die Mengen  $\emptyset^M$  und  $M^\emptyset$ .
- (2) Wieviele Elemente enthält  $M^N$ , wenn  $M$  und  $N$  endlich sind?

**Aufgabe 0/3/130**

Mengenpotenzen (2)

**Index:** Abbildung, Definitionsbereich einer Abbildung, Bild einer Abbildung**Stoffeinheiten:** 0/3/1 - 0/3/37 Relationen und Abbildungen

$X, Y, Z$  seien Mengen.  $X^Y$  sei die Menge aller Abbildungen von  $Y$  in  $X$  und  $X \approx Y$  soll bedeuten, dass zwischen  $X$  und  $Y$  eine Bijektion existiert. Beweisen Sie:

- (1) Wenn  $X \cap Y = \emptyset$ , so ist  $X^{Y \cup Z} \approx X^Y \times X^Z$ .
- (2)  $(X \times Y)^Z \approx X^Z \times Y^Z$ ,
- (3)  $X^{Y \times Z} \approx (X^Y)^Z$ .

**Aufgabe 0/4/010**

Abbildungen, kartesisches Produkt

**Index:** kartesisches Produkt, Auswahlaxiom**Stoffeinheiten:** 0/4/1 - 0/4/16 Das Auswahlaxiom

$(f_i)_{i \in I}$  sei eine Menge von Abbildungen  $f_i : M_i \rightarrow N_i$ . Beweisen Sie, dass das kartesische Produkt

$$\prod_{i \in I} f_i : \prod_{i \in I} M_i \rightarrow \prod_{i \in I} N_i, \quad (x_i)_{i \in I} \mapsto (f_i(x_i))_{i \in I}$$

dieser Abbildungen surjektiv ist, falls alle Abbildungen  $f_i$  surjektiv sind.

Gilt die Umkehrung?

**Aufgabe 0/4/020**

Zornsches Lemma, Beispiel\*

**Index:** zornsches Lemma, lineare Ordnung**Stoffeinheiten:** 0/4/1 - 0/4/16 Das Auswahlaxiom

Beweisen Sie: Jede Ordnung  $R$  einer Menge  $M$  lässt sich zu einer linearen Ordnung erweitern.

**Aufgabe 0/4/030**

Eine induktiv geordnete Menge

**Index:** induktiv geordnete Menge**Stoffeinheiten:** 0/4/1 - 0/4/16 Das Auswahlaxiom

Es sei  $M$  eine Menge und  $\mathcal{M}$  die Menge aller Paare  $(W, R)$ , wobei  $W \subseteq M$  und  $R$  eine Wohlordnung von  $W$  ist. In  $\mathcal{M}$  sei eine Relation  $\leq$ , wie folgt definiert:

$(W_1, R_1) \leq (W_2, R_2) \iff W_1 \subseteq W_2$  und  $R_1$  ist die Einschränkung von  $R_2$  auf  $W_1$ , und jedes Element in  $W_1$  ist bezüglich  $R_2$  kleiner als jedes Element aus  $W_2 \setminus W_1$ .

Zeigen Sie, dass  $\mathcal{M}$  induktiv geordnet ist.

### Aufgabe 0/5/010

$\mathbb{N}$  als Ordinalzahl\*

**Index:** Ordinalzahl, transitive Menge

**Stoffeinheiten:** 0/5/1 - 0/5/16 Kardinalzahlen

Zeigen Sie, dass die Menge  $\omega$  der natürlichen Zahlen eine Ordinalzahl ist.

**Hinweis.** Diese Aufgabe erscheint uns zu schwer für den Schwierigkeitsgrad, den Sie eingestellt haben. Wählen Sie die Option „vereinfacht = 0“, dann finden Sie ab 0/5/3 ausführliche Erläuterungen zum Begriff der Ordinalzahl.

### Aufgabe 0/5/020

Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (1)

**Index:** Ordinalzahl, Fundierungsaxiom

**Stoffeinheiten:** 0/5/1 - 0/5/16 Kardinalzahlen

Zeigen Sie, dass für alle Ordinalzahlen  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Oz}$  gilt:

- (1) Wenn  $x \in \alpha$ , so  $x \in \mathbf{Oz}$ .
- (2)  $\neg(\alpha < \alpha)$  (Irreflexivität)
- (3)  $\alpha < \beta \wedge \beta < \gamma \implies \alpha < \gamma$  (Transitivität)

**Hinweis.** Diese Aufgabe erscheint uns zu schwer für den Schwierigkeitsgrad, den Sie eingestellt haben. Wählen Sie die Option „vereinfacht = 0“, dann finden Sie ab 0/5/3 ausführliche Erläuterungen zum Begriff der Ordinalzahl.

### Aufgabe 0/5/030

Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (2)

**Index:** Ordinalzahl, transitive Menge

**Stoffeinheiten:** 0/5/1 - 0/5/16 Kardinalzahlen

Für alle Ordinalzahlen  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{Oz}$  gilt:

- (1)  $\alpha \leq \beta \iff \alpha \subseteq \beta$  ( $\alpha \leq \beta$  bedeutet  $\alpha \in \beta \vee \alpha = \beta$ ).
- (2) Für jedes  $\alpha \in \mathbf{Oz}$  ist  $\alpha^+ := \alpha \cup \{\alpha\}$  die kleinste Ordinalzahl, die größer ist als  $\alpha$ .
- (3) Für jede Menge  $M$  von Ordinalzahlen ist auch  $\bigcup M$  eine Ordinalzahl.

**Hinweis.** Diese Aufgabe erscheint uns zu schwer für den Schwierigkeitsgrad, den Sie eingestellt haben. Wählen Sie die Option „vereinfacht = 0“, dann finden Sie ab 0/5/3 ausführliche Erläuterungen zum Begriff der Ordinalzahl.

### Aufgabe 0/5/040

Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (3)

**Index:** Ordinalzahl, Limeszahl, Vereinigungsmenge

**Stoffeinheiten:** 0/5/1 - 0/5/16 Kardinalzahlen

Zeigen Sie für beliebige Ordinalzahlen  $\alpha$ :

$$\alpha \text{ ist eine Limeszahl} \iff \alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} \beta.$$

**Hinweis.** Diese Aufgabe erscheint uns zu schwer für den Schwierigkeitsgrad, den Sie eingestellt haben. Wählen Sie die Option „vereinfacht = 0“, dann finden Sie ab 0/5/3 ausführliche Erläuterungen zum Begriff der Ordinalzahl.

**Aufgabe 0/5/050**

Abzählbare Mengen (1)

**Index:** abzählbare Menge, gleichmächtige Mengen

**Stoffeinheiten:** 0/5/1 - 0/5/16 Kardinalzahlen

Beweisen Sie die folgenden Behauptungen:

- (1) Teilmengen abzählbarer Mengen sind abzählbar.
- (2) Ist  $n$  eine natürliche Zahl  $\geq 2$ , dann gilt  $\underbrace{\mathbb{N} \times \dots \times \mathbb{N}}_{n\text{-mal}} \approx \mathbb{N}$ .
- (3) Sind  $A_1, \dots, A_n$  abzählbar, dann ist  $A_1 \times \dots \times A_n$  abzählbar.

**Aufgabe 0/5/060**

Abzählbare Mengen (2)

**Index:** abzählbare Menge, gleichmächtige Mengen

**Stoffeinheiten:** 0/5/1 - 0/5/16 Kardinalzahlen

Beweisen Sie die folgenden Behauptungen:

- (1) Die Vereinigung abzählbar vieler abzählbarer Mengen ist abzählbar.
- (2) Die Mengen der ganzen und der rationalen Zahlen sind abzählbar.
- (3) Ist  $A$  abzählbar und  $B$  überabzählbar, dann ist  $B \setminus A$  überabzählbar.
- (4) Die Menge aller endlichen Folgen rationaler Zahlen ist abzählbar.

## Aufgaben zum Kapitel 1

### Aufgabe 1/1/010

Operationen, Beispiele

**Index:** Operation, Monoid, Operation eines Monoids

**Stoffeinheiten:** 1/1/1 Monoide

Auf der Menge  $\mathbb{Z}$  der ganzen Zahlen definieren wir Operationen

- (1)  $x * y := x - y$ ,
- (2)  $x \times y := x^2 + y^2$ ,
- (3)  $x \odot y := 3x + y$ .

Untersuchen Sie diese auf Assoziativität und Kommutativität.

### Aufgabe 1/1/020

Monoide und Gruppen, Beispiele

**Index:** Operation, Monoid, Gruppe

**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

Welches der folgenden Paare  $(M, \cdot)$  ist ein Monoid, welches eine Gruppe? Die Antworten sind zu beweisen.

- (1)  $M$  sei eine beliebige Menge mit wenigstens 2 Elementen. Die Operation  $\cdot$  ist durch  $x \cdot y = x$  für alle  $x, y \in M$  gegeben.
- (2)  $M = \mathbb{R}$  die Menge der reellen Zahlen mit der Operation  $x \circ y = x + y + xy$ .
- (3)  $M := \mathbb{N} - \{0\}$  mit einer der folgenden Operationen ggT, kgV,  
 $\text{kgV}(a, b) :=$  kleinstes gemeinsames Vielfaches von  $a$  und  $b$   
 $\text{ggT}(a, b) :=$  größter gemeinsamer Teiler von  $a$  und  $b$
- (4) Die Menge  $(\text{Abb}(X, X), \cdot)$  aller Abbildungen einer gegebenen Menge  $X$  in sich mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen.
- (5) Die Menge  $M = S(X)$  der bijektiven Abbildungen  $X \rightarrow X$  mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen.

### Aufgabe 1/1/030

Beispiele für Gruppen (1)

**Index:** Gruppe

**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

Untersuchen Sie, ob eine der folgenden Operationen eine Gruppenstruktur auf der angegebenen Menge  $G$  definiert:

- (1)  $G := \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid b \neq 0\}$  mit der Operation  
 $(a, b) \cdot (a', b') := (aa', ab' + ba')$ ,
- (2)  $G := \{(a, b) \in \mathbb{R}^2 \mid a \neq 0\}$  mit der Operation  
 $(a, b) \cdot (a', b') := (aa', ab' + ba')$ .

**Aufgabe** 1/1/040

Rechnen mit Gruppenelementen (1)

**Index:** Gruppenoperation**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

Zeigen Sie durch vollständige Induktion:

- (1)  $(M, \cdot)$  sei ein Monoid, dann gilt für alle  $a \in M$   
 $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$  und  $(a^m)^n = a^{(m \cdot n)}$  ( $m, n \in \mathbf{N}$ ).
- (2)  $(G, \cdot)$  sei eine Gruppe. Dann gilt die unter (1) angegebene Eigenschaft für alle  $m, n \in \mathbf{Z}$ .
- (3)  $G$  sei eine abelsche Gruppe. Dann ist  $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$  für alle  $a, b \in G$  und  $n \in \mathbf{Z}$ .

**Aufgabe** 1/1/060

Direktes Produkt von Gruppen

**Index:** direktes Produkt von Monoiden, direktes Produkt von Gruppen**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe $(G_1, \cdot_1)$  und  $(G_2, \cdot_2)$  seien Gruppen. Wir definieren auf  $G_1 \times G_2$  eine Operation durch

$$(x, y) * (x', y') := (x \cdot_1 x', y \cdot_2 y') \text{ für } (x, y), (x', y') \in G_1 \times G_2.$$

Beweisen Sie:

- (1)  $(G_1 \times G_2, *)$  ist eine Gruppe.
- (2)  $(G_1 \times G_2, *)$  ist genau dann kommutativ, wenn  $G_1$  und  $G_2$  kommutativ sind.

**Aufgabe** 1/1/070

Ein Untergruppenkriterium

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Untergruppenkriterium**Stoffeinheiten:** 1/1/6 - 1/1/12 Untergruppen, Homomorphismen

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe,  $H \subseteq G$  eine endliche, nichtleere Teilmenge von  $G$ . Beweisen Sie:  $H$  ist Untergruppe von  $G$  genau dann, wenn für alle  $x, y \in H$  gilt  $x \cdot y \in H$ .

Kann auf die Voraussetzung verzichtet werden, dass  $H$  endlich ist?**Aufgabe** 1/1/090

Gruppen von Primzahlordnung

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Ordnung einer Gruppe**Stoffeinheiten:** 1/1/6 - 1/1/12 Untergruppen, Homomorphismen

Zeigen Sie: Eine Gruppe, deren Ordnung eine Primzahl ist, ist zyklisch.

Wieviele Untergruppen hat eine solche Gruppe?

**Aufgabe** 1/1/110

Beispiele für Gruppen (2)

**Index:** Gruppe, Operation, Gruppentafel

**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

Bestimmen Sie bis auf Isomorphie alle Gruppen mit höchstens 5 Elementen.

**Aufgabe** 1/1/120

Zyklische Gruppen (1)

**Index:** zyklische Gruppe, Untergruppe, Erzeugung von Untergruppen, Isomorphismus von Gruppen

**Stoffeinheiten:** 1/1/6 - 1/1/12 Untergruppen, Homomorphismen

$G$  sei eine Gruppe,  $g \in G$ . Wir bezeichnen mit  $\langle g \rangle$  die Teilmenge  $\langle g \rangle := \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$  von  $G$ .

- (1) Zeigen Sie:  $\langle g \rangle$  ist Untergruppe von  $G$ .
- (2) Existiert in einer Gruppe  $G$  ein Element  $g$  mit  $\langle g \rangle = G$ , so heißt  $G$  eine zyklische Gruppe. Beweisen Sie: Zwei zyklische Gruppen sind genau dann isomorph, wenn ihre Kardinalzahlen übereinstimmen.
- (3) Bestimmen Sie alle Untergruppen einer zyklischen Gruppe.

**Aufgabe** 1/1/130

Zyklische Gruppen (2)

**Index:** zyklische Gruppe, Untergruppe, Erzeugung von Untergruppen

**Stoffeinheiten:** 1/1/6 - 1/1/12 Untergruppen, Homomorphismen

Zeigen Sie: Jede endlich erzeugte Untergruppe von  $(\mathbb{Q}, +)$  ist zyklisch.

**Aufgabe** 1/1/150

Symmetriegruppen einfacher Figuren

**Index:** Isomorphismus von Gruppen, Untergruppe, Symmetriegruppe

**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

Mit  $G$  bezeichnen wir die *Symmetriegruppe* eines gleichseitigen Dreiecks, das wir als Teilmenge des Raumes betrachten. Damit meinen wir die Gruppe der Bewegungen, die diese Figur in sich überführen; jedes ihrer Elemente ist durch die Zuordnung der Ecken eindeutig bestimmt.

- (1) Geben Sie einen Isomorphismus  $f : G \rightarrow S_3$  an!
- (2) Bestimmen Sie die Untergruppe  $f(U)$  von  $S_3$ , wenn  $U$  die Untergruppe der Drehungen des Dreiecks in der Ebene bezeichnet.
- (3) Lässt sich ein Isomorphismus der Symmetriegruppe eines Quadrats und der Gruppe  $S_4$  finden?

**Aufgabe** 1/1/160

Diedergruppe

**Index:** Isomorphismus von Gruppen, Symmetriegruppe, Diedergruppe, Normalteiler

**Stoffeinheiten:** 1/1/19 - 1/1/22 Nebenklassen einer Untergruppe

Es sei  $A$  eine abelsche Gruppe. Die zu  $A$  gehörige Diedergruppe wird als

$$D(A) := \{(a, \varepsilon) \mid a \in A, \varepsilon \in \{1, -1\}\}$$

definiert mit der Multiplikation

$$(a, \varepsilon)(b, \eta) = (ab^\varepsilon, \varepsilon\eta).$$

Zeigen Sie:

- (1)  $D(A)$  ist Gruppe mit neutralem Element  $(1, 1)$ , und  $(a, \varepsilon)^{-1} = (a^{-\varepsilon}, \varepsilon)$  für  $(a, \varepsilon) \in D(A)$ .
- (2) Wir identifizieren  $A$  mit dem Bild bei der injektiven Abbildung  $a \mapsto (a, 1)$ . Dann ist  $A$  Normalteiler in  $D(A)$  und hat den Index 2.
- (3) Wir bezeichnen mit  $D_n$  die *Symmetriegruppe* des regulären  $n$ -Ecks, betrachtet als Figur im 3-dimensionalen Raum. Damit meinen wir die Gruppe der Bewegungen, die diese Figur in sich überführen; jedes ihrer Elemente ist durch die Zuordnung der Ecken eindeutig bestimmt.  
 $D_n$  ist isomorph zur Diedergruppe  $D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$  der zyklischen Gruppe der Ordnung  $n$  (gewöhnlich wird  $D_n$  selbst als „Diedergruppe“ bezeichnet).

### Aufgabe 1/1/180

Gruppenhomomorphismen (1)

**Index:** Gruppenhomomorphismus, Gruppe

**Stoffeinheiten:** [1/1/6](#) - [1/1/12](#) [Untergruppen](#), [Homomorphismen](#)

Welche der folgenden Operationen definiert eine Gruppenstruktur auf der angegebenen Menge und welche der angegebenen Abbildungen ist ein Gruppenhomomorphismus?

- (1)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \{1, -1\}$  mit  $f(n) := (-1)^n$  (die Operation auf  $\mathbb{Z}$  ist die Addition ganzer Zahlen, die Operation auf  $\{1, -1\}$  die Multiplikation ganzer Zahlen)
- (2)  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \{1, -1\}$  mit  $f(n) := (-1)^{n+1}$  (die Operationen werden wie zuvor gewählt)
- (3)  $f : \mathbb{Q}^* \rightarrow \mathbb{Q}^*$  mit  $f(x) := \frac{x}{|x|}$  ( $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} - \{0\}$  erhält als Operation die Multiplikation rationaler Zahlen)

### Aufgabe 1/1/190

Gruppenhomomorphismen (2)

**Index:** Gruppenhomomorphismus, Gruppe

**Stoffeinheiten:** [1/1/6](#) - [1/1/12](#) [Untergruppen](#), [Homomorphismen](#)

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe. Bestimmen Sie alle Gruppenhomomorphismen  $(\mathbb{Z}, +) \rightarrow (G, \cdot)$ .

### Aufgabe 1/1/200

Gruppenhomomorphismen (3)

**Index:** Gruppenhomomorphismus, Gruppe

**Stoffeinheiten:** [1/1/6](#) - [1/1/12](#) [Untergruppen](#), [Homomorphismen](#)

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe und  $\varphi : (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (G, \cdot)$  ein Gruppenhomomorphismus. Wir setzen voraus, dass  $\varphi$  nicht jedes Element von  $\mathbb{Q}$  auf das neutrale Element der Gruppe  $G$  abbildet.

Zeigen Sie, dass  $G$  unendlich ist.

### Aufgabe 1/1/210

Gruppenhomomorphismen (4)

**Index:** Gruppenhomomorphismus, Gruppe, Normalteiler, Isomorphismus von Gruppen

**Stoffeinheiten:** 1/1/23 Bild und Kern eines Gruppenhomomorphismus

$(G, \cdot)$  sei Gruppe. Für  $g \in G$  definieren wir  $\varphi_g : G \rightarrow G$  durch  $\varphi_g(x) := g^{-1} \cdot x \cdot g$ . Zeigen Sie:

- (1)  $\varphi_g$  ist ein Isomorphismus (Isomorphismen  $G \rightarrow G$  heißen auch *Automorphismen* von  $G$ ).
- (2) Es sei  $Z(G) := \{x \in G \mid \forall g \in G : x \cdot g = g \cdot x\}$ . Die Mengen  $U_g := \{x \mid \varphi_g(x) = x\}$  bilden Untergruppen von  $G$  und  $Z(G)$  ist Durchschnitt aller  $U_g$  mit  $g \in G$ .
- (3)  $Z(G)$  ist Normalteiler in  $G$ .
- (4) Die Menge  $\text{Inn}(G)$  der Automorphismen  $\varphi_g$  mit  $g \in G$  ist ein Normalteiler in der Gruppe aller Automorphismen von  $G$ .
- (5)  $\text{Inn}(G) \cong G/Z(G)$ .

### Aufgabe 1/1/220

Rechnen mit Gruppenelementen (1)

**Index:** Gruppe, Ordnung eines Gruppenelements

**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe,  $a, b \in G$  und  $a$  ein Element der Ordnung 5, für das  $a^3 \cdot b = b \cdot a^3$  gilt. Beweisen Sie:  $a \cdot b = b \cdot a$ .

**Anmerkung.** Als *Ordnung* eines Gruppenelements  $a$  bezeichnen wir die kleinste Zahl  $n \geq 1$ , für die  $a^n$  das neutrale Element ist (bzw. das Symbol  $\infty$ , falls eine solche Zahl nicht existiert).

### Aufgabe 1/1/230

Rechnen mit Gruppenelementen (2)

**Index:** Gruppe, Ordnung eines Gruppenelements

**Stoffeinheiten:** 1/1/2 - 1/1/5 Begriff der Gruppe

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe mit neutralem Element  $e$ . Gilt dann  $g^2 = e$  für alle  $g \in G$ , so ist  $G$  abelsch.

**Anmerkung.** Als *Ordnung* eines Gruppenelements  $a$  bezeichnen wir die kleinste Zahl  $n \geq 1$ , für die  $a^n$  das neutrale Element ist (bzw. das Symbol  $\infty$ , falls eine solche Zahl nicht existiert).

### Aufgabe 1/1/240

Rechnen mit Permutationen, Signum

**Index:** Permutation, Signum einer Permutation, Vorzeichen einer Permutation

**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

Beweisen Sie: Für einen Zyklus  $\sigma \in S_n$  der Länge  $t$  ist  $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{t-1}$ .

**Aufgabe** 1/1/250

Rechnen mit Permutationen, Kommutator

**Index:** Permutationsgruppe, Gruppe

**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

$G$  sei eine Gruppe. Für  $x, y \in G$  nennen wir das Gruppenelement  $[x, y] := x \cdot y \cdot x^{-1} \cdot y^{-1}$  den „Kommutator“ von  $x$  und  $y$ .

- (1) Beweisen Sie: Für beliebige  $x, y \in G$  ist  $[x, y]^{-1} = [y, x]$ .
- (2) Beweisen Sie: Für beliebige  $x, y, z \in G$  gilt  $[x \cdot y, z] = x \cdot [y, z] \cdot x^{-1} \cdot [x, z]$ .
- (3) Überprüfen Sie, ob in der Permutationsgruppe  $S_3$  für alle Elemente  $x, y, z$  die Gleichung  $[[x, y], z] = \text{id}$  erfüllt ist.

**Aufgabe** 1/1/260

(S: Varianten)

Rechnen mit Permutationen

**Index:** Permutation

**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

Rechnen mit Permutationen:

- (1) Bestimmen Sie  $\sigma \cdot \tau$  und  $\tau \cdot \sigma$  für

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 2 & 3 & 5 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 6 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (2) Bestimmen Sie  $\sigma^{-1}$  und die Potenzen  $\sigma^n$  ( $n \in \mathbb{N}$ ) der nachfolgend angegebenen Permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 7 & 5 & 6 & 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**

- (1) Es ist

$$\sigma \cdot \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 1 & 5 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad \tau \cdot \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 4 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- (2)  $\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 7 & 6 & 4 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \sigma^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}, \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}, \sigma^4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 7 & 4 & 5 & 6 & 3 \end{pmatrix},$

$$\sigma^5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 6 & 4 & 7 \end{pmatrix}, \dots$$

**Aufgabe** 1/1/270

(S: Varianten)

Rechnen mit Permutationen

**Index:** Permutation, Zyklus, Signum einer Permutation, Vorzeichen einer Permutation**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

Bestimmen Sie die Faktoren der Zerlegungen in disjunkte Zyklen für folgende Permutationen:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 1 & 2 & 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 6 & 2 & 1 & 9 & 8 & 5 & 7 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 3 & 7 & 6 & 12 & 4 & 9 & 8 & 11 & 15 & 14 & 5 & 13 & 10 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

**Ergebnis.** Wir erhalten die folgenden Faktoren.

Fall (1):

$$(1,4,3,2)$$

Fall (2):

$$(1,6,5,8,3)$$

$$(4,9)$$

Fall (3):

$$(1,3,6,9,15)$$

$$(2,7,8,11,5,4,12,13,10,14)$$

**Aufgabe** 1/1/280

(S: Varianten)

Rechnen mit Permutationen, Zyklen

**Index:** Permutation, Zyklus, Signum einer Permutation, Vorzeichen einer Permutation**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 PermutationenFür einen Zyklus  $\sigma$  der Länge  $t$  ist  $\text{sign}(\sigma) = (-1)^{t-1}$ . Benutzen Sie diese Eigenschaft zur Bestimmung des Vorzeichens der folgenden Permutation

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \\ 14 & 20 & 11 & 10 & 4 & 2 & 3 & 6 & 18 & 9 & 19 & 21 & 17 & 1 & 13 & 5 & 12 & 16 & 15 & 8 & 7 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**

$$(1,14)$$

$$(2,20,8,6)$$

$$(3,11,19,15,13,17,12,21,7)$$

$$(4,10,9,18,16,5)$$

ist die Zyklenzerlegung der gegebenen Permutation  $\sigma$ ; daraus erhalten wir  $\text{sign}(\sigma) = -1$ .

**Aufgabe** 1/1/290

(S: Varianten)

Permutationsgruppe, Untergruppen (1)

**Index:** Permutationsgruppe, Untergruppe, Ordnung einer Gruppe**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

In  $S_n$  betrachten wir für  $\sigma \in S_n$  die Untergruppe  $\langle \sigma \rangle := \{\sigma^i \mid i \in \mathbb{Z}\}$ . Die Zahl  $o(\sigma) := |\langle \sigma \rangle|$  heißt Ordnung von  $\sigma$ .

- (1) Zeigen Sie:  $\langle \sigma \rangle = \{\sigma^i \mid i \in \mathbb{N}\}$ .
- (2)  $\mathcal{M} := \{\tau \cdot \langle \sigma \rangle \mid \tau \in S_n\}$  mit  $\tau \cdot \langle \sigma \rangle := \{\tau \cdot \sigma^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$  ist eine Partition der Menge  $S_n$ .
- (3) Die Klassen der Partition  $\mathcal{M}$  enthalten gleichviele Elemente, und es gilt
 
$$|\mathcal{M}| \cdot o(\sigma) = |S_n|,$$
 insbesondere ist also  $o(\sigma)$  ein Teiler von  $n! = |S_n|$ .
- (4) Es sei  $\text{id} \neq \sigma \in S_5$  mit  $\text{sign}(\sigma) = 1$ . Zeigen Sie, dass die Ordnung von  $\sigma$  eine der Zahlen 2, 3, 5 ist.
- (5)\* Berechnen Sie die Ordnung einer Permutation mittels ihrer Zyklenzerlegung. Bestimmen Sie insbesondere die Ordnung von

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 & 18 & 19 \\ 12 & 13 & 6 & 9 & 3 & 10 & 1 & 15 & 19 & 7 & 4 & 17 & 11 & 14 & 18 & 16 & 5 & 2 & 8 \end{pmatrix} \in S_{19}$$

**Ergebnis.** Zu (5) geben wir das Resultat der Rechnung an. Durch

$$(1, 12, 17, 5, 3, 6, 10, 7) \\ (2, 13, 11, 4, 9, 19, 8, 15, 18)$$

ist die Zyklenzerlegung der Permutation  $\sigma$  gegeben; es folgt  $o(\sigma) = 72$ .**Aufgabe** 1/1/300

Gruppen als Untergruppen der symmetrischen Gruppe

**Index:** Permutationsgruppe, Gruppenhomomorphismus, symmetrische Gruppe**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

$(G, \cdot)$  sei Gruppe. Zeigen Sie, dass die Abbildung  $\varphi : G \rightarrow S(G)$  mit  $\varphi(g)(x) := g \cdot x$  von  $G$  in die Gruppe  $S(G)$  der bijektiven Abbildungen  $G \rightarrow G$  ein injektiver Gruppenhomomorphismus ist.

**Aufgabe** 1/1/310

Permutationsgruppe, Untergruppen (2)

**Index:** Permutationsgruppe, Untergruppe**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 PermutationenBestimmen Sie alle Untergruppen der Permutationsgruppen  $S_3$  und  $S_4$ .**Aufgabe** 1/1/330

Typ einer Permutation

**Index:** Permutationsgruppe, Äquivalenzrelation, Zyklus, Normalteiler

**Stoffeinheiten:** 1/1/13 - 1/1/18 Permutationen

Wir betrachten die Gruppe  $S_n$  der Permutationen von  $\{1, \dots, n\}$ .

- (1) Zeigen Sie, dass die durch  $\sigma \sim \tau \iff \exists \rho(\sigma = \rho^{-1} \cdot \tau \cdot \rho)$  gegebene Relation auf  $S_n$  („Konjugation“) eine Äquivalenzrelation ist.
- (2) Wie wir schon wissen, ist eine Permutation (im wesentlichen eindeutig) Produkt elementfremder Zyklen. Wir sagen,  $\sigma$  hat die Zyklenstruktur  $(\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n)$ , falls in dieser Zerlegung  $\nu_2$  Zyklen der Länge 2,  $\nu_3$  Zyklen der Länge 3,  $\dots$ ,  $\nu_r$  Zyklen der Länge  $r$  usw. auftreten und  $\nu_1 + 2\nu_2 + \dots + n\nu_n = n$  ist.

Beweisen Sie: Die Abbildung, die jeder Permutation aus  $S_n$  ihre Zyklenstruktur zuordnet, ist eine vollständige Invariante der Konjugation.

**Aufgabe** 1/1/360

Normalteilerkriterien

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Normalteiler

**Stoffeinheiten:** 1/1/19 - 1/1/22 Nebenklassen einer Untergruppe

Es sei  $(G, \cdot)$  eine Gruppe,  $H$  eine Untergruppe von  $G$ .

Für Teilmengen  $A, B$  von  $G$  wird stets  $AB := \{ab \mid a \in A, b \in B\}$  gesetzt (bei einelementigen Mengen werden meist die Klammern  $\{\}$  weggelassen).

Zeigen Sie, dass folgende Aussagen äquivalent sind:

- (1)  $H$  ist Normalteiler von  $G$ .
- (2)  $x^{-1}hx \in H$  für alle  $x \in G$  und  $h \in H$ .
- (3)  $x^{-1}Hx \subseteq H$  für alle  $x \in G$ .
- (4)  $xH = Hx$  für alle  $x \in G$ .
- (5)  $(xH)(yH) = (xy)H$  für alle  $x, y \in G$ .

**Aufgabe** 1/1/370

Untergruppen vom Index 2

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Index einer Untergruppe, Normalteiler

**Stoffeinheiten:** 1/1/19 - 1/1/22 Nebenklassen einer Untergruppe

$G$  sei eine Gruppe,  $H$  eine Untergruppe vom Index 2, d.h. eine Untergruppe, die genau zwei rechte Nebenklassen besitzt. Beweisen Sie:  $H$  ist Normalteiler in  $G$ .

**Aufgabe** 1/1/380

Normalteiler, Gegenbeispiel

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Normalteiler, Gruppenhomomorphismus

**Stoffeinheiten:** 1/1/19 - 1/1/22 Nebenklassen einer Untergruppe

Geben Sie ein Beispiel für einen Gruppenhomomorphismus  $f : G_1 \rightarrow G_2$  an, dessen Bild  $\text{im}(f)$  kein Normalteiler in  $G_2$  ist.

**Aufgabe 1/1/400**

Normalteiler und Isomorphie (1)

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Normalteiler, Isomorphismus von Gruppen**Stoffeinheiten:** 1/1/24 - 1/1/28 Faktorgruppen, das Homomorphieprinzip

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe,  $H$  eine Untergruppe von  $G$  und  $N$  ein Normalteiler. Mit  $AB := \{ab \mid a \in A, b \in B\}$  wird das „Produkt“ zweier Teilmengen  $A, B \subseteq G$  bezeichnet. Dann gilt:

- (1)  $H \cap N$  ist Normalteiler von  $H$ .
- (3)  $HN$  ist Gruppe und  $N$  ist Normalteiler in  $HN$ .
- (3)  $H/(H \cap N) \cong HN/N$ .

**Aufgabe 1/1/410**

Normalteiler und Isomorphie (2)

**Index:** Gruppe, Untergruppe, Normalteiler, Isomorphismus von Gruppen**Stoffeinheiten:** 1/1/24 - 1/1/28 Faktorgruppen, das Homomorphieprinzip

$(G, \cdot)$  sei eine Gruppe und  $H$  und  $N$  Normalteiler in  $G$  mit  $N \subseteq H$ . Beweisen Sie:

- (1)  $H/N$  ist Normalteiler in  $G/N$ .
- (2)  $G/H \cong (G/N)/(H/N)$ .

**Aufgabe 1/1/420**

Isomorphie: Beispiele und Gegenbeispiele (1)

**Index:** Gruppe, Isomorphismus von Gruppen**Stoffeinheiten:** 1/1/24 - 1/1/28 Faktorgruppen, das Homomorphieprinzip

Welche der folgenden Gruppen sind isomorph?

- (1)  $D_4 :=$  Gruppe der Decktransformationen eines Quadrats
- (2)  $S_4$
- (3)  $\mathbb{Z}/(24)$
- (4)  $\mathbb{Z}/(4) \times \mathbb{Z}/(6)$

**Aufgabe 1/1/430**

Isomorphie: Beispiele und Gegenbeispiele (2)

**Index:** Gruppe, Isomorphismus von Gruppen**Stoffeinheiten:** 1/1/160 Diedergruppe

Untersuchen Sie in jedem der folgenden Fälle, welche der aufgeführten Gruppen isomorph sind.

- (1)  $(S_3, \circ)$ ,  $(\mathbb{Z}/(6), +)$ ,  $(\mathbb{Z}/(7)^*, \cdot)$
- (2)  $(\mathbb{Z}, +)$ ,  $(\mathbb{Q}^*, \cdot)$

- (3)  $(\mathbb{R}, +)$  und  $(\mathbb{R}_{>0}, \cdot)$ , wobei  $\mathbb{R}_{>0}$  die Menge der positiven reellen Zahlen ist; die Operationen sind Einschränkungen der ebenso bezeichneten Operationen für Zahlen.
- (4)  $(D_n, \circ)$  (die Diedergruppe) und  $(S_n, \cdot)$  (für ein festes  $n \geq 2$ )

**Aufgabe 1/2/010**

Rechnen mit Restklassen

**Index:** ganze Zahl, Restklasse**Stoffeinheiten:** 1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für RingeWir wissen bereits, dass  $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$  ein Ring ist.

- (1) Zeigen Sie: Eine natürliche Zahl ist genau dann durch  $2^n$  teilbar, wenn ihre letzten  $n$  Ziffern durch  $2^n$  teilbar sind.
- (2) Bestimmen Sie die letzte Ziffer der Zahl  $6^{6^6} - 5^{5^5}$ .

**Aufgabe 1/2/040**

(S: Varianten)

Rechnen mit komplexen Zahlen (1)

**Index:** komplexe Zahlen, Körper**Stoffeinheiten:** 1/2/7 - 1/2/8 Der Körper der komplexen Zahlen

Rechnen mit komplexen Zahlen:

- (1)  $a, b$  bezeichnen  $a = 2i - 1$ ,  $b = 3i + 3 \in \mathbb{C}$ . Geben Sie  $a + b$ ,  $a - b$ ,  $ab$  und  $\frac{a}{b}$  an.
- (2) Bestimmen Sie alle komplexen Zahlen  $x$  mit der Eigenschaft  $x^2 - (i - 4)x + (i + 5) = 0$ .
- (3) Lösen Sie die Gleichung  $x^3 = 56i$  mit  $x \in \mathbb{C}$ .

**Lösung.**

- (1) Es ist  $a + b = 5i + 2$ ,  $a - b = -i - 4$  und  $ab = 3i - 9$ .

Den Quotienten  $\frac{a}{b}$  erhalten wir als

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot \bar{b}}{b \cdot \bar{b}} = \frac{(2i - 1) \cdot (-3i + 3)}{(3i + 3) \cdot (-3i + 3)} = \frac{9i + 3}{18} = \left(\frac{1}{2}i + \frac{1}{6}\right).$$

- (2) Mit quadratischer Ergänzung lässt sich die gegebene Gleichung auch durch

$$\left(x - \left(\frac{1}{2}i - 2\right)\right)^2 = -\left(3i + \frac{5}{4}\right)$$

ausdrücken, gleichbedeutend als

$$(*) \quad 4 \cdot \left(x - \left(\frac{1}{2}i - 2\right)\right)^2 = -12i - 5.$$

Dies ist genau dann erfüllt, wenn  $-12i - 5$  das Quadrat einer komplexen Zahl  $z = u + vi$  ist ( $u, v \in \mathbb{R}$ ). Nun ist  $(u + vi)^2 = u^2 - v^2 + 2uvi$ , daher

$$(u + vi)^2 = -12i - 5$$

äquivalent zum System

$$(*) \quad \begin{cases} u^2 - v^2 = -5 \\ 2uv = -12. \end{cases}$$

Multiplizieren wir die erste Gleichung mit  $4u^2$  und quadrieren wir die zweite, so entsteht nach Addition eine leicht zu lösende biquadratische Gleichung für die reelle Zahl  $u$ ; nun finden wir auch  $v$  und prüfen durch Einsetzen, ob tatsächlich Lösungspaare  $(u, v)$  des Systems vorliegen. Es ergibt sich

$$z = u + vi = \pm(3i - 2).$$

Gleichheit der Quadrate zweier Zahlen bedeutet, dass diese bis auf den Faktor  $-1$  übereinstimmen. Aus  $(*)$  erhalten wir daher

$$2 \cdot (x - (\frac{1}{2}i - 2)) = \pm z.$$

Durch Einsetzen von  $z$  ergeben sich  $x_1 = -i - 1$  und  $x_2 = 2i - 3$  als diejenigen komplexen Zahlen, für die die Gleichung (2) erfüllt ist.

- (3) Wir setzen  $x = u + iv$  mit reellen Zahlen  $u, v$ . Die Gleichung  $x^3 = 56i$  ist nun äquivalent zu

$$u^3 + 3u^2vi - 3uv^2 - v^3i = 56i,$$

daher zu

$$\begin{cases} u^3 - 3uv^2 = 0 \\ 3uv^2 - v^3 = 56. \end{cases}$$

Im Fall  $u = 0$  ergibt die zweite dieser Bedingungen  $v = -2 \cdot \sqrt[3]{7}$ , wobei die erste trivialerweise erfüllt ist.

Ist  $u \neq 0$ , so erhalten wir aus der ersten Gleichung

$$u^2 - 3v^2 = 0, \text{ d.h. } (u + \sqrt{3}v)(u - \sqrt{3}v) = 0, \text{ also}$$

$$u = \pm\sqrt{3}v$$

und nach Einsetzen in die zweite

$$8v^3 = 56, \text{ daher } v = \sqrt[3]{7}.$$

$x^3 = 56i$  ist daher genau dann erfüllt, wenn  $x$  eine der drei Zahlen  $x = -2 \cdot \sqrt[3]{7}i$ ,  $x = \pm\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{7} + \sqrt[3]{7}i$  ist.

### Aufgabe 1/2/050

(S: Varianten)

Rechnen mit komplexen Zahlen (2)

**Index:** komplexe Zahlen, Körper

**Stoffeinheiten:** 1/2/7 - 1/2/8 Der Körper der komplexen Zahlen

Rechnen mit komplexen Zahlen:

- (1)  $a, b$  bezeichnen  $a = -2i - 1$ ,  $b = -i - 3 \in \mathbb{C}$ . Geben Sie  $a + b$ ,  $a - b$ ,  $ab$  und  $\frac{a}{b}$  an.
- (2) Bestimmen Sie alle komplexen Zahlen  $x$  mit der Eigenschaft

$$x^2 - (i - 1)x - 13i = 0.$$

**Lösung.**

- (1) Es ist  $a + b = -3i - 4$ ,  $a - b = -i + 2$  und  $ab = 7i + 1$ .

Den Quotienten  $\frac{a}{b}$  erhalten wir als

$$\frac{a}{b} = \frac{a \cdot \bar{b}}{b \cdot \bar{b}} = \frac{(-2i - 1) \cdot (i - 3)}{(-i - 3) \cdot (i - 3)} = \frac{5i + 5}{10} = \left(\frac{1}{2}i + \frac{1}{2}\right).$$

- (2) Mit quadratischer Ergänzung lässt sich die gegebene Gleichung auch durch

$$\left(x - \left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right)\right)^2 = \frac{25}{2}i$$

ausdrücken, gleichbedeutend als

$$(*) \quad 4 \cdot \left(x - \left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right)\right)^2 = 50i.$$

Dies ist genau dann erfüllt, wenn  $50i$  das Quadrat einer komplexen Zahl  $z = u + vi$  ist ( $u, v \in \mathbb{R}$ ). Nun ist  $(u + vi)^2 = u^2 - v^2 + 2uvi$ , daher

$$(u + vi)^2 = 50i$$

äquivalent zum System

$$(*) \quad \begin{cases} u^2 - v^2 = 0 \\ 2uv = 50. \end{cases}$$

Multiplizieren wir die erste Gleichung mit  $4u^2$  und quadrieren wir die zweite, so entsteht nach Addition eine leicht zu lösende biquadratische Gleichung für die reelle Zahl  $u$ ; nun finden wir auch  $v$  und prüfen dann durch Einsetzen, ob tatsächlich Lösungspaare  $(u, v)$  des Systems vorliegen. Es ergibt sich

$$z = u + vi = \pm(5i + 5).$$

Gleichheit der Quadrate zweier Zahlen bedeutet, dass diese bis auf den Faktor  $-1$  übereinstimmen. Aus  $(*)$  erhalten wir daher

$$2 \cdot \left(x - \left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right)\right) = \pm z.$$

Durch Einsetzen von  $z$  ergeben sich  $x_1 = -2i - 3$  und  $x_2 = 3i + 2$  als diejenigen komplexen Zahlen, für die die Gleichung (2) erfüllt ist.

### Aufgabe 1/2/070

Adjunktion von Quadratwurzeln

**Index:** Unterkörper

**Stoffeinheiten:** 1/2/4 - 1/2/5 Integritätsbereiche und Körper

Wir betrachten die Menge  $K = \mathbb{Q}[\sqrt{2}]$  aller reellen Zahlen der Form  $a + b\sqrt{2}$  mit rationalen Zahlen  $a$  und  $b$ . Beweisen Sie:

- (1) Die Addition reeller Zahlen besitzt eine Einschränkung auf  $K$ , und  $K$  ist mit dieser Operation eine Gruppe.
- (2) Die Multiplikation reeller Zahlen besitzt eine Einschränkung auf die Teilmenge  $K \setminus \{0\}$  von  $K$ , und  $K \setminus \{0\}$  ist mit dieser Operation eine Gruppe.
- (3)  $(K, +, \cdot)$  ist ein Körper.

**Aufgabe** 1/2/080

Ganze gaußsche Zahlen, Division mit Rest

**Index:** Unterkörper, Unterring, Division mit Rest**Stoffeinheiten:** 1/2/7 - 1/2/8 Der Körper der komplexen Zahlen

- (1) Es sei  $\mathbb{Q}[i] := \{a+ib \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$ . Zeigen Sie, dass  $\mathbb{Q}[i]$  ist ein Unterkörper von  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  ist.
- (2) Es sei  $\mathbb{Z}[i] := \{a+ib \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ . Zeigen Sie, dass  $\mathbb{Z}[i]$  ist ein Unterring von  $(\mathbb{Q}[i], +, \cdot)$  ist.
- (3) Wir definieren  $\varphi : \mathbb{Z}[i] \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $a+ib \mapsto |a+ib|^2 = a^2 + b^2$ . Zeigen Sie: Für  $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i] \setminus \{0\}$  gibt es  $\kappa, \rho \in \mathbb{Z}[i]$  mit  $\alpha = \kappa \cdot \beta + \rho$  und  $0 \leq \varphi(\rho) < \varphi(\beta)$ .

**Aufgabe** 1/2/090

Einheiten einiger Ringe (1)

**Index:** Einheit, Ring**Stoffeinheiten:** 1/2/26 - 1/2/28 Teilbarkeitslehre im Ring der ganzen Zahlen $p$  sei eine Primzahl. Wir bezeichnen mit  $\mathbb{Z}_{(p)}$  die Menge

$$\mathbb{Z}_{(p)} := \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \text{ ist nicht durch } p \text{ teilbar} \right\}.$$

- (1) Zeigen Sie: Addition und Multiplikation rationaler Zahlen besitzen Einschränkungen auf  $\mathbb{Z}_{(p)}$ , und  $\mathbb{Z}_{(p)}$  ist mit diesen Operationen ein Unterring von  $\mathbb{Q}$ .
- (2) Bestimmen Sie die Einheiten in  $\mathbb{Z}_{(p)}$ .

**Aufgabe** 1/2/100

Einheiten einiger Ringe (2)

**Index:** Einheit, Ring**Stoffeinheiten:** 1/2/19 - 1/2/25 Der Begriff der TeilbarkeitBestimmen Sie die Einheiten der Ringe  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  und  $\mathbb{R}[X]$ .**Aufgabe** 1/2/110

Einheiten einiger Ringe (3)

**Index:** Einheit, Ring, Einsetzungshomomorphismus**Stoffeinheiten:** 1/2/19 - 1/2/25 Der Begriff der TeilbarkeitMit  $\mathbb{Z}[i]$  bezeichnen wir das Bild des Einsetzungshomomorphismus

$$\mathbb{Z}[X] \rightarrow \mathbb{C}, \quad X \mapsto i.$$

Bestimmen Sie die Einheiten im Ring  $\mathbb{Z}[i]$ .**Aufgabe** 1/2/120

Einheiten einiger Ringe (4)

**Index:** Restklassenring modulo  $m$ , Einheit**Stoffeinheiten:** 1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für Ringe

Geben Sie alle Einheiten der folgenden Ringe an:

- (1)  $\mathbb{Z}/(7)$ ,
- (2)  $\mathbb{Z}/(8)$ ,
- (3)\*  $\mathbb{Z}/(n)$ ,
- (4)\*  $\mathbb{Z}[i\sqrt{5}] := \{a + bi\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$  (als Unterring von  $\mathbb{C}$ ).

**Aufgabe 1/2/130**

Nilpotente Ringelemente und Einheiten

**Index:** Einheit, Ring, nilpotentes Ringelement**Stoffeinheiten:** [1/2/19 - 1/2/25 Der Begriff der Teilbarkeit](#)

$R$  sei ein kommutativer Ring,  $e \in R$  eine Einheit und  $n \in R$  *nilpotent* (d.h. es existiert  $k \in \mathbb{N}$  mit  $n^k = 0$ ). Beweisen Sie:  $e + n$  ist eine Einheit.

**Anleitung.** Betrachten Sie zunächst den Fall  $e = 1$ .**Aufgabe 1/2/140**

Faktoring nach einem Maximalideal

**Index:** Ideal, Ring, Körper**Stoffeinheiten:** [1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für Ringe](#)

$R$  sei ein kommutativer Ring mit mehr als einem Element. Zeigen Sie:

- (1)  $R$  besitzt ein Maximalideal, d.h. ein Ideal  $\mathfrak{m} \neq R$ , das bezüglich der Inklusion unter allen von  $\mathbf{0}$  verschiedenen Idealen maximal ist.
- (2) Für jedes Maximalideal  $\mathfrak{m}$  in  $R$  ist  $R/\mathfrak{m}$  ein Körper.

**Aufgabe 1/2/150**

Rechnen mit Idealen

**Index:** Ideal, Ring, Körper**Stoffeinheiten:** [1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für Ringe](#)Sei  $R$  ein Ring.

- (1) Zeigen Sie:  $\{0\}$  und  $R$  sind Ideale, und falls  $R$  ein Körper ist, dann gibt es keine weiteren.
- (2) Zeigen Sie: Der Durchschnitt einer Menge von Idealen in  $R$  ist wieder ein Ideal.
- (3)  $I$  und  $J$  seien Ideale, ist dann  $I \cup J$  immer ein Ideal?  
Zeigen Sie: Das kleinste Ideal, das  $I$  und  $J$  enthält, ist  $I + J := \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$ .
- (4) Zeigen Sie, daß für Ideale  $I, J, L$  in  $R$  stets  $I + J = J + I$  und  $(I + J) + L = I + (J + L)$  gilt.

**Aufgabe 1/2/170**

Der Ersetzungshomomorphismus für ganzzahlige Polynome

**Index:** Ersetzungshomomorphismus, Einsetzungshomomorphismus, Polynomring

**Stoffeinheiten:** 1/2/12 - 1/2/15 Algebren

Bestimmen Sie alle  $\mathbb{Z}$ -Algebrahomomorphismen von  $\mathbb{Z}[X]$  auf  $\mathbb{Z}[X]$ . Welche sind Isomorphismen?

**Aufgabe** 1/2/190

Polynome und Abbildungen

**Index:** Ersetzungshomomorphismus, Einsetzungshomomorphismus, Polynom, Polynome sind keine Funktionen

**Stoffeinheiten:** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik

Sind Polynome Funktionen?

Wir betrachten den dreielementigen Primkörper  $K = \mathbb{F}_3$  und bilden den Polynomring  $P := K[X]$  über  $K$ . Überprüfen Sie, dass der Einsetzungshomomorphismus durch

$$\Phi : P \rightarrow \text{Abb}(K, K)$$

$$(\Phi(f))(\alpha) := f(\alpha) \quad \text{für } f \in P, \alpha \in K$$

einen Ringhomomorphismus  $\Phi$  definiert und untersuchen Sie diesen auf Injektivität.

**Aufgabe** 1/2/195

Nichteindeutigkeit des Polynomgrades?\*

**Index:** Polynomring, Grad eines Polynoms, Polynom

**Stoffeinheiten:** 1/2/9 - 1/2/11 Polynome in einer Unbestimmten

\* Wir betrachten den Polynomring  $R^{[1]}$  in einer Unbestimmten über dem Ring  $R$ . Geben Sie eine hinreichende Bedingung für  $R$  an, dass der Grad eines Polynoms unabhängig von der Wahl einer Unbestimmten definiert werden kann.

**Motivation zur Lösung.** Immer ist das bestimmt nicht der Fall, wie folgendes Beispiel zeigt:

Wir wählen  $R = \mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$  als Faktorring des Polynomrings  $\mathbb{F}_2[\varepsilon]$  in der Unbestimmten  $\varepsilon$ . Der Einsetzungshomomorphismus

$$\Phi : R[X] \rightarrow R[X], \quad X \mapsto \varepsilon X^2 + X$$

ist dann offensichtlich ein Isomorphismus der  $R$ -Algebra  $R[X]$  auf sich, denn  $\Psi^2$  ist die Identität. Daher ist  $\varepsilon X^2 + X$  ebenfalls eine Unbestimmte in  $R[X]$ .

Den hier genannten Begriff des *Faktorring*s finden Sie unter 1/2/29 - 1/2/33, er ist jedoch für eine Lösung nicht erforderlich. Und natürlich werden keine trivialen Antworten erwartet ...

**Aufgabe** 1/2/200

Nilpotente Polynome

**Index:** nilpotentes Ringelement, Polynom, Polynomring

**Stoffeinheiten:** 1/2/9 - 1/2/11 Polynome in einer Unbestimmten

Ein Element  $a$  eines Ringes heißt *nilpotent*, wenn es eine Zahl  $n \in \mathbb{N}$  gibt, so dass  $a^n = 0$ . Nun sei  $R$  ein kommutativer Ring. Zeigen Sie:

$f \in R[X]$  ist genau dann nilpotent, wenn alle Koeffizienten nilpotent sind.

### Aufgabe 1/2/210

Nullstellenbestimmung (1)

**Index:** Polynom, Nullstelle, endlicher Körper

**Stoffeinheiten:** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik

Bestimmen Sie die Elemente  $x$  aus dem jeweils angegebenen Körper  $K$ , für die die angegebene Gleichung erfüllt ist.

(1)  $x^5 + x^4 + 1 = 0$  ( $K$  ist einer der Körper  $\mathbb{F}_3, \mathbb{F}_7$ )

(2)  $x^3 - 1 = 0$  ( $K$  ist einer der Körper  $\mathbb{F}_3, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$ )

### Aufgabe 1/2/220

(S: Varianten)

Nullstellenbestimmung (2)

**Index:** Polynom, endlicher Körper, Nullstelle

**Stoffeinheiten:** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik

Bestimmen Sie alle  $x \in \mathbb{F}_{13}$  mit  $x^4 - 4x^3 - 6x + 2 = 0$ .

**Ergebnis.** Durch Einsetzen folgt

$$f(0) = 2, f(1) = 6, f(2) = 0, f(3) = -4, f(4) = 4, f(5) = 6, f(6) = -5, f(7) = 1, \\ f(8) = 0, f(9) = 5, f(10) = 1, f(11) = -3, f(12) = 0,$$

daher erhalten wir als Lösungen die Klassen von 2, 8, 12 in  $\mathbb{F}_{13}$ .

### Aufgabe 1/2/240

Ideale und Teilbarkeit

**Index:** Ideal, Teiler, größter gemeinsamer Teiler, Ring

**Stoffeinheiten:** 1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für Ringe

$R$  sei ein kommutativer Ring,  $(a) = \{ax \mid x \in R\}$  das von  $a$  erzeugte Ideal. Beweisen Sie die folgenden Teilbarkeitseigenschaften:

(1)  $a \mid b$  genau dann wenn  $(b) \subset (a)$  und  $a \sim b$  genau dann, wenn  $(a) = (b)$  ( $a, b \in R$ ).

(2) Es sei  $d \in R$  so dass  $(a) + (b) = (d)$ , dann ist  $d$  der größte gemeinsame Teiler von  $a$  und  $b$ .

### Aufgabe 1/2/260

Irreduzible Elemente in  $\mathbb{Z}[i]$

**Index:** irreduzibles Ringelement, Irreduzibilität, Primzahl

**Stoffeinheiten:** 1/2/26 - 1/2/28 Teilbarkeitslehre im Ring der ganzen Zahlen

Bestimmen Sie die irreduziblen Elemente im Ring  $\mathbb{Z}[i]$ .

### Aufgabe 1/2/270

(S: Varianten)

Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme

**Index:** größter gemeinsamer Teiler, Kettendivision, euklidischer Algorithmus

**Stoffeinheiten:** 1/2/26 - 1/2/28 Teilbarkeitslehre im Ring der ganzen Zahlen

Bestimmen Sie den größten gemeinsamen Teiler für die ganzen Zahlen  $f = 344$ ,  $g = 160$  und stellen ihn als Vielfachensumme dieser Zahlen dar.

**Lösung.** Wir setzen  $r_{-1} := f$  und  $r_0 := g$ . Für  $i > 0$  wird mit  $r_i$  der  $i$ -te Rest bei der Kettendivision bezeichnet. Dann ergibt sich die folgende Tabelle:

$344 : 160 = 2 \text{ Rest } 24$	$r_{-1} - 2 \cdot r_0 = r_1$	$r_1 = f - 2g$
$160 : 24 = 6 \text{ Rest } 16$	$r_0 - 6 \cdot r_1 = r_2$	$r_2 = -6f + 13g$
$24 : 16 = 1 \text{ Rest } 8$	$r_1 - 1 \cdot r_2 = r_3$	$r_3 = 7f - 15g$

Die erste Spalte enthält den euklidischen Algorithmus (vgl. 1/2/26). In der zweiten Spalte sind die Rekursionen der Reste angegeben, d.h. jeder auftretende Rest ist als Vielfachensumme der vorhergehenden ausgedrückt. Die letzte Spalte der Tabelle entsteht aus der zweiten durch Einsetzen der bereits bekannten Ausdrücke und enthält die Darstellung der Reste als Vielfachensummen von  $f$  und  $g$ . Da  $r_2$  durch  $r_3$  teilbar ist, ergibt sich  $r_3 = 8$  als der größte gemeinsame Teiler. Weiter erhalten wir  $8 = 7f - 15g$ .

**Aufgabe** 1/2/275

(S: Varianten)

Bestimmung von Inversen in Primkörpern (1)

**Index:** multiplikatives Inverses, Primkörper, Kettendivision, euklidischer Algorithmus, größter gemeinsamer Teiler

**Stoffeinheiten:** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik

Bestimmen Sie das multiplikative Inverse der Zahl 10 im endlichen Primkörper  $\mathbb{F}_{47}$ .

**Lösung.** Der größte gemeinsame Teiler von  $f = 47$  und  $g = 10$  ist 1, denn  $f$  ist Primzahl. Wir stellen 1 als Vielfachensumme von  $f$  und  $g$  dar. Dazu setzen wir  $r_{-1} := f$  und  $r_0 := g$ . Für  $i > 0$  wird mit  $r_i$  der Rest bei der  $i$ -ten Division bezeichnet. Es ergibt sich die folgende Tabelle:

$47 : 10 = 4 \text{ Rest } 7$	$r_{-1} - 4 \cdot r_0 = r_1$	$r_1 = f - 4g$
$10 : 7 = 1 \text{ Rest } 3$	$r_0 - 1 \cdot r_1 = r_2$	$r_2 = -f + 5g$
$7 : 3 = 2 \text{ Rest } 1$	$r_1 - 2 \cdot r_2 = r_3$	$r_3 = 3f - 14g$

Die erste Spalte enthält den euklidischen Algorithmus (vgl. 1/2/26). In der zweiten Spalte sind die Rekursionen der Reste angegeben. Die letzte Spalte der Tabelle entsteht aus der zweiten durch Einsetzen der bereits bekannten Ausdrücke und enthält die Darstellung der Reste als Vielfachensummen. Der größte gemeinsame Teiler ist  $r_3 = 1$ ; er ergibt sich als Vielfachensumme

$$1 = 3f - 14g.$$

Bei Übergang zu den Restklassen verschwindet der erste Summand und es folgt in  $\mathbb{F}_{47}$  (vgl. 1/2/29)

$$-14 = 10^{-1}.$$

**Aufgabe** 1/2/280

(S: Varianten)

Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2)

**Index:** multiplikatives Inverses, Primkörper, Division mit Rest, euklidischer Algorithmus, größter gemeinsamer Teiler, Kettendivision**Stoffeinheiten:** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und CharakteristikFür Zahlen  $f, g \in \mathbb{Z}$ ,  $g \neq 0$  wird die Division mit Rest in der Form

$$f : g = q \text{ Rest } r$$

angegeben, wobei  $f = g \cdot q + r$  mit  $q, r \in \mathbb{Z}$  und  $|g| > r \geq 0$ .Ausgehend von den Zahlen  $r_{-1} := f$ ,  $r_0 := g$ ,  $v_{-1} := 0$ ,  $v_0 := 1$  und mit dem Startindex  $i = -1$  führen wir das folgende Verfahren aus:**Berechne** {

$$i := i + 1,$$

$$r_{i-1} : r_i = q_{i+1} \text{ Rest } r_{i+1},$$

$$\text{falls } \{r_{i+1} \neq 0\} \ v_{i+1} = v_{i-1} - v_i \cdot q_{i+1},$$

} **solange**  $\{r_{i+1} \neq 0\}$ ,

$$k := i \text{ (letzter Index),}$$

$$u_k = (r_k - v_k \cdot g) / f.$$

Das Ergebnis des Verfahrens sind die Zahlen  $r_k, u_k$  und  $v_k$ .

- (i) Zeigen Sie, dass  $r_k$  der größte gemeinsame Teiler von  $f$  und  $g$  ist und  $u_k f + v_k g = r_k$ .
- (ii) Verwenden Sie das obige Verfahren zur Berechnung des multiplikativen Inversen von 5 im endlichen Primkörper  $\mathbb{F}_{23}$ .

**Lösung.** (i) Dass  $r_k$  größter gemeinsamer Teiler von  $f$  und  $g$  ist, folgt aus dem euklidischen Algorithmus, der hier nur um die Berechnung der Zahlen  $u_k$  und  $v_k$  erweitert wurde (das angegebene Verfahren trägt deshalb auch die Bezeichnung *erweiterter euklidischer Algorithmus*).

Um die Darstellung von  $r_k$  als Vielfachensumme zu gewinnen, definieren wir  $u_{-1} := 1$  und  $u_0 := 0$  sowie mit Hilfe zweier Unbestimmter  $X$  und  $Y$  die Startgrößen  $s_{-1} := u_{-1} \cdot X - v_{-1} \cdot Y$  und  $s_0 := u_0 \cdot X - v_0 \cdot Y$  aus  $\mathbb{Z}[X, Y]$ . Nun kann der vertraute euklidische Algorithmus in jedem Schritt um die Berechnung von

$$s_{i+1} = s_{i-1} - s_i \cdot q_{i+1}$$

erweitert werden; es folgt

$$s_{i+1} = u_{i+1} \cdot X - v_{i+1} \cdot Y = (u_{i-1} - u_i \cdot q_{i+1}) \cdot X - (v_{i-1} - v_i \cdot q_{i+1}) \cdot Y.$$

Mit  $X = f$  und  $Y = g$  gilt  $s_i = r_i$ . Für alle Reste  $r_i$  ist damit eine Darstellung als Vielfachensumme der Ausgangszahlen gewonnen.

Der Kunstgriff und Vorteil des vorliegenden Verfahrens besteht darin, nur die Zahlen  $v_i$  zu berechnen;  $u_k$  kann dann im letzten Schritt durch Division erhalten werden.

(ii) Das Verfahren ist gut geeignet zur Inversenberechnung in einem endlichen Primkörper. Wir initialisieren  $r_{-1}$  mit der Primzahl  $p$  und  $r_0$  mit der zu invertierenden Zahl  $z$ . Das Verfahren liefert

$$u_k \cdot p + v_k \cdot z = 1.$$

Es folgt  $z^{-1} = v_k$  in  $\mathbf{F}_p$  (vgl. 1/2/29). Auf die Berechnung von  $u_k$  kann hier verzichtet werden.

Um das multiplikative Inverse von 5 in  $\mathbf{F}_{23}$  zu bestimmen, wird also

$$r_{-1} = 23, r_0 = 5$$

initialisiert. Es entsteht die Tabelle:

$23 : 5 = 4 \text{ Rest } 3$	$v_{-1} - 4 \cdot v_0 = v_1$	$v_1 = -4$
$5 : 3 = 1 \text{ Rest } 2$	$v_0 - 1 \cdot v_1 = v_2$	$v_2 = 5$
$3 : 2 = 1 \text{ Rest } 1$	$v_1 - 1 \cdot v_2 = v_3$	$v_3 = -9$

Wir erhalten als Resultat  $5^{-1} = -9$  im Körper  $\mathbf{F}_{23}$ .

### Aufgabe 1/2/290

Chinesischer Restsatz

**Index:** Ring, teilerfremde Elemente, Isomorphismus von Ringen

**Stoffeinheiten:** [1/2/29 - 1/2/33 Das Homomorphieprinzip für Ringe](#)

- (1)  $R_1, R_2$  seien kommutative Ringe. Zeigen Sie dass  $R_1 \times R_2$  ebenfalls ein kommutativer Ring ist mit den komponentenweisen Operationen, die auf den Produkten der Monoide  $(R_1, +)$  und  $(R_2, +)$  bzw.  $(R_1, \cdot)$  und  $(R_2, \cdot)$  gegeben sind.
- (2)  $m$  und  $n$  seien teilerfremde Zahlen. Zeigen Sie: Die Ringe  $\mathbb{Z}/(mn)$  und  $\mathbb{Z}/(n) \times \mathbb{Z}/(m)$  sind isomorph. Gilt das auch ohne die Voraussetzung, dass  $m$  und  $n$  teilerfremd sind?

### Aufgabe 1/2/320

Körper mit 4 Elementen

**Index:** Körper, endlicher Körper

**Stoffeinheiten:** [1/2/4 - 1/2/5 Integritätsbereiche und Körper](#)

Geben Sie die Strukturtafeln aller Körper mit 4 Elementen an.

### Aufgabe 1/2/330

Endliche Körper, Gegenbeispiel

**Index:** Körper, Charakteristik eines Körpers

**Stoffeinheiten:** [1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik](#)

Zeigen Sie: Es gibt keinen Körper mit 6 Elementen.

### Aufgabe 1/2/340

Der Frobenius-Homomorphismus

**Index:** Körper, Charakteristik eines Körpers

**Stoffeinheiten:** [1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik](#)

$K$  sei ein Körper mit  $\text{char}(K) = p \neq 0$ . Mit  $F$  bezeichnen wir die Abbildung  $K \rightarrow K$ , die durch  $F(x) := x^p$  definiert ist. Zeigen Sie:

- (1)  $F$  ist injektiver Ringhomomorphismus.
- (2)  $F$  ist bijektiv, falls  $K$  endlich ist.
- (3) Im Fall  $K = \mathbb{F}_p$  ist  $F$  die Identität.

**Aufgabe 1/2/350**

Der kleine fermatsche Satz

**Index:** Körper, Charakteristik eines Körpers**Stoffeinheiten:** 1/2/34 - 1/2/36 Primkörper und Charakteristik $K$  sei ein endlicher Körper mit  $n$  Elementen. Zeigen Sie:  $a^n - a = 0$  für alle  $a \in K$ .**Aufgabe 1/3/005**

(S: Varianten)

Matrizenmultiplikation, erste Schritte

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von MatrizenBestimmen Sie das Produkt  $A \cdot B$  der Matrizen  $A$  und  $B$  für

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \in M(2, 3; \mathbb{R}), \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} \in M(3, 2; \mathbb{R}).$$

**Lösung.** Ist  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{jk})$ , so ergibt sich der Eintrag  $c_{ik}$  der Produktmatrix  $C = A \cdot B$  definitionsgemäß als  $c_{ik} = \sum_j a_{ij} b_{jk}$ . Wir schreiben dies ausführlich auf und erhalten

$$c_{11} = a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} + a_{13} \cdot b_{31} = 0 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 5 \cdot 4 = 35,$$

$$c_{21} = a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} + a_{23} \cdot b_{31} = -2 \cdot 1 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 = 25,$$

$$c_{12} = a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} + a_{13} \cdot b_{32} = 0 \cdot 4 + 5 \cdot 0 + 5 \cdot 5 = 25,$$

$$c_{22} = a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} + a_{23} \cdot b_{32} = -2 \cdot 4 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 5 = 7.$$

Damit ergibt sich als Resultat

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 & 25 \\ 25 & 7 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 1/3/010**

Eigenschaften der Matrizenmultiplikation

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Überprüfen Sie die folgenden Rechenregeln:

- (1)  $A, B, C$  seien Matrizen, für die das Produkt  $A \cdot (B \cdot C)$  definiert ist. Beweisen Sie, dass dann stets  $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$  gilt (und insbesondere die rechte Seite dieser Gleichung definiert ist).
- (2) Für  $A \in M(m, n; K)$ ,  $B \in M(n, p; K)$  gilt  ${}^t(A \cdot B) = {}^tB \cdot {}^tA$ .

- (3) Für  $A \in M(m, n; K)$ ,  $B \in M(n, p; K)$  und  $a, b \in K$  gilt  
 $(a \cdot A) \cdot (b \cdot B) = (ab) \cdot (A \cdot B)$ .

**Aufgabe 1/3/020**

Der Ring der quadratischen Matrizen eines festen Typs

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition, Ring, quadratische Matrix

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 [Multiplikation von Matrizen](#)

$R$  sei ein kommutativer Ring. Zeigen Sie, dass  $M(n; R)$  mit den Matrizenoperationen  $+$  und  $\cdot$  ein Ring ist.

Hinweis: Die bereits im Text bewiesenen Eigenschaften der Matrizenoperationen dürfen verwendet werden.

**Aufgabe 1/3/030**

(S: Varianten)

Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (1)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 [Multiplikation von Matrizen](#)

Berechnen Sie für die gegebenen reellen Matrizen  $A$ ,  $B$  in jedem Fall  $A + B$ ,  $A - B$ ,  $A \cdot B$  und  $B \cdot A$ , sofern die betreffende Operation definiert ist.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & -3 & 4 \\ -3 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -3 & -2 \\ -2 & 0 \\ 0 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A = (-4 \ -1 \ -3), \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

**Ergebnis.**

$$(1) \quad A + B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 9 \\ -2 & 7 & 0 \\ 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} -10 & 5 & 1 \\ 4 & -1 & -2 \\ -5 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -6 & 28 & -23 \\ -9 & 8 & 8 \\ 9 & 11 & -1 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} -28 & 9 & 40 \\ 19 & 8 & -16 \\ -24 & 11 & 21 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & -6 & -6 \\ 1 & 7 & -8 & -6 \\ 2 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} -8 & -2 & -6 \\ 12 & 3 & 9 \\ 12 & 3 & 9 \end{pmatrix}$$

Die übrigen Operationen sind nicht definiert.

### Aufgabe 1/3/040

(S: Varianten)

Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (2)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Berechnen Sie zu den angegebenen reellen Matrizen  $A$  und  $B$  jeweils Summe  $A + B$ , die Differenz  $A - B$ , sowie die Produkte  $A \cdot B$  und  $B \cdot A$ .

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} 5a & -b \\ 5c & -d \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -d & b \\ -5c & 5a \end{pmatrix} \text{ wobei } a, b, c, d, \in \mathbb{R}.$$

### Ergebnis.

$$(1) \quad A + B = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} -4 & -6 \\ -4 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$(2) \quad A + B = \begin{pmatrix} 5a - d & 0 \\ 0 & 5a - d \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 5a + d & -2b \\ 10c & -5a - d \end{pmatrix},$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 5bc - 5ad & 0 \\ 0 & 5bc - 5ad \end{pmatrix},$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 5bc - 5ad & 0 \\ 0 & 5bc - 5ad \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 1/3/050

(S: Varianten)

Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (3)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Berechnen Sie für die folgenden Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & -2 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -4 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & -1 \\ -2 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -1 \\ 0 & -3 & -2 \end{pmatrix}$$

die angegebenen Ausdrücke, sofern diese definiert sind.

$$A + 3B - 4C$$

$$A \cdot B \cdot C$$

$$A \cdot {}^t B \cdot C$$

$$A \cdot (B + C)$$

$$C + {}^t A \cdot B$$

$$A \cdot {}^t A$$

$${}^t A + A$$

$${}^t(2A - B)$$

$${}^t A \cdot A$$

$${}^t(A \cdot B + C)$$

### Ergebnis.

$$A + 3B - 4C$$

ist nicht definiert.

$$A \cdot B \cdot C$$

ist nicht definiert.

$$A \cdot {}^t B \cdot C$$

ist nicht definiert.

$$A \cdot (B + C)$$

ist nicht definiert.

$$C + {}^t A \cdot B$$

ist nicht definiert.

$$A \cdot {}^t A = \begin{pmatrix} 17 & -16 & -14 \\ -16 & 20 & 18 \\ -14 & 18 & 21 \end{pmatrix}$$

$${}^t A + A = \begin{pmatrix} -8 & 5 & 4 \\ 5 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$${}^t(2A - B) = \begin{pmatrix} -4 & 12 & 10 \\ 1 & 2 & 8 \\ 2 & -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$${}^t A \cdot A = \begin{pmatrix} 48 & 4 & -12 \\ 4 & 5 & -2 \\ -12 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

$${}^t(A \cdot B + C)$$

ist nicht definiert.

**Aufgabe** 1/3/060

(S: Varianten)

Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (4)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Berechnen Sie für die gegebenen Matrizen  $A$ ,  $B$  über den Körper  $\mathbb{F}_3$  in in jedem der folgenden Fälle  $A + B$ ,  $A - B$ ,  $A \cdot B$  und  $B \cdot A$ , sofern die betreffende Operation definiert ist.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A = (0 \ 0 \ -1), \quad B = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Ergebnis.**

$$(1) \quad A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A - B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A \cdot B = (0), \quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Die übrigen Operationen sind nicht definiert.

**Aufgabe** 1/3/070

(S: Varianten)

Substitution von Matrizen in Polynome

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition, Polynom**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Berechnen Sie die Matrix  $f(A) \in M(3; \mathbb{F}_3)$ , wenn  $f \in \mathbb{F}_3[X]$  das Polynom  $f = -X^2 - X + 1$  bezeichnet und  $A \in M(3; \mathbb{F}_3)$  die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Die Aufgabe ist so zu verstehen, dass  $M(3; \mathbb{F}_3)$  als Algebra über  $\mathbb{F}_3$  betrachtet wird; dann ist  $f(A)$  das Bild von  $f$  beim Ersetzungshomomorphismus  $X \mapsto A$ . Die Zahl  $1 \in \mathbb{F}_3$  entspricht dabei der Einheitsmatrix  $E_3$ ; so ergibt sich  $f(A) = -A^2 - A + 1$  als Summe von

$$-A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad -A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir erhalten

$$f(A) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 1/3/080

(S: Varianten)

Operationen mit polynomialen Matrizen

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Matrizenaddition, polynomiale Matrix

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Bestimmen Sie  $A + B$ ,  $A - B$ ,  $A \cdot B$  und  $B \cdot A$  für die folgenden Matrizen  $A, B \in M(4; \mathbb{F}_5[X])$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 2X^2 + 2X - 1 & X - 2 \\ X + 2 & 2X^2 + X \end{pmatrix},$$

$$B = \begin{pmatrix} 2X^2 + X + 2 & -X^2 + X + 2 \\ -2X^2 - X + 2 & 2X^2 + 2X - 1 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**

$$A + B = \begin{pmatrix} -X^2 - 2X + 1 & -X^2 + 2X \\ -2X^2 - 1 & -X^2 - 2X - 1 \end{pmatrix},$$

$$A - B = \begin{pmatrix} X + 2 & X^2 + 1 \\ 2X^2 + 2X & -X + 1 \end{pmatrix},$$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} -X^4 - X^3 + 2X^2 + 2X - 1 & -2X^4 + 2X^3 - 2X \\ X^4 - 2X^3 - 2X^2 + X - 1 & -X^4 - X^2 - 2X - 1 \end{pmatrix},$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} -X^4 - 2X^2 + 2X + 2 & -2X^4 - 2X^3 + 2X^2 + 2X + 1 \\ X^4 + X^3 - 2X + 1 & -X^4 - X^3 - 2X^2 - 2X + 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 1/3/090

Potenzen von Matrizen (1)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, obere Dreiecksmatrix

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Bestimmen Sie für alle  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  die Potenzen  $A^n$  der folgenden Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M(n; \mathbb{Z}).$$

**Aufgabe 1/3/100**

Potenzen von Matrizen (2)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von MatrizenBerechnen Sie für  $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$  die Potenzen  $A^n$  der folgenden Matrix

$$A := \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 1/3/120**

Potenzen von Matrizen (3)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Es sei  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  eine Matrix über einem kommutativen Ring. Wir setzen  $\alpha := a + d$  und  $\beta := bc - ad$ . Zeigen Sie:

- (i)  $A^2 = \alpha A + \beta E_2$ .
- (ii)  $A^n = x_n A + \beta x_{n-1} E_2$ , und  $(x_n)$  ist die Folge, die rekursiv durch  $x_n := \alpha x_{n-1} + \beta x_{n-2}$  für  $n \geq 2$  und  $x_1 = 1$ ,  $x_0 = 0$  definiert ist.

**Aufgabe 1/3/130****(S: Varianten)**

Potenzen von Matrizen (4)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von MatrizenBerechnen Sie alle Potenzen der folgenden Matrix  $A$  über  $\mathbb{F}_2$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.** Es ist

$$A^4 = E_4, \quad A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daraus ergibt sich für beliebige  $n \geq 1$  die Matrix  $A^n$  als eine der hier aufgeführten.

**Aufgabe** 1/3/140

(S: Varianten)

Potenzen von Matrizen (5)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Gegeben ist die Matrix

$$A := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R}).$$

Ist die dritte Potenz von  $A$  die Nullmatrix?**Lösung.** Es ist

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 1/3/160

(S: Varianten)

Nilpotente Matrizen (1)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, nilpotente Matrix**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von MatrizenFinden Sie die kleinste natürliche Zahl  $n \geq 1$  mit  $A^n = 0$ , wenn  $A$  die folgende Matrix über den Körper  $\mathbb{F}_2$  bezeichnet,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**  $n = 4$ , denn es ist

$$A^1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 1/3/165

Nilpotente Matrizen (2)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, nilpotente Matrix, obere Dreiecksmatrix**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen $K$  sei ein kommutativer Ring. Zeigen Sie: Für eine obere Dreiecksmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ & 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & \mathbf{0} & & 0 & a_{n-1n} \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \in M(n; K)$$

mit Nullen auf der Hauptdiagonale ist  $A^n = 0$ .

**Lösung.** Induktiv wird ausgerechnet, dass die Matrix  $A^m = (a_{ij}^{(m)})$  nur Einträge  $a_{ij}^{(m)} = 0$  hat für  $j - i < m$  und  $m = 1, \dots, n$ .

Induktionsanfang  $m = 1$  ist die Voraussetzung, und aus  $A^{m+1} = A^m \cdot A$  ergibt sich für  $k - i < m + 1$ , d.h. für  $k - i \leq m$ ,

$$a_{ik}^{(m+1)} = \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(m)} \cdot a_{jk} = \sum_{j=1}^{m+i-1} a_{ij}^{(m)} \cdot a_{jk} + \sum_{j=m+i}^n a_{ij}^{(m)} \cdot a_{jk}.$$

Der erste Summand verschwindet nach der Induktionsvoraussetzung  $a_{ij}^{(m)} = 0$  für  $j - i < m$ , der zweite ist 0, weil aus  $j \geq m + i$  (und  $m \geq k - i$ ) folgt  $j \geq k$ .  $\square$

### Aufgabe 1/3/170

Matrizen mit Parametern (1)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

$A$  und  $B$  seien quadratische Matrizen über einem kommutativen Ring. Vorausgesetzt wird  $A \cdot B = B \cdot A$ .

(1) Zeigen Sie :

$$(A + B)^n = \sum_{i=1}^n \binom{n}{i} A^i \cdot B^{n-i}.$$

(2) Berechnen Sie für  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  die Potenzen der Matrix

$$\begin{pmatrix} \alpha + \beta & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & \alpha + \beta \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R}).$$

### Aufgabe 1/3/180

Matrizen mit Parametern (2)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, obere Dreiecksmatrix

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Es sei  $x \in \mathbb{R}$  und

$$A(x) := \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2 - x}{2} \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{R}).$$

Zeigen Sie, dass  $A(x + y) = A(x) \cdot A(y)$  ist für alle  $x, y \in \mathbb{R}$  und bestimmen Sie  $A(x)^n$  für alle  $n \in \mathbb{N}$ .

### Aufgabe 1/3/190

Gruppen von Matrizen (1)

(S: Varianten)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Gruppe

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

(1) Zeigen Sie, dass die Menge  $G := \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{Q} \right\}$  mit der Matrizenmultiplikation eine Gruppe bildet.

(2) Lösen Sie für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$$

die Gleichungen  $A \cdot X = B$ ,  $Y \cdot A = B$ , wobei  $X, Y$  Matrizen aus  $G$  sind.

(3) Lösen Sie für die zuvor angegebenen Matrizen  $A, B$  und eine weitere Matrix

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$$

die Gleichung  $A \cdot Z \cdot B = C$ .

**Ergebnis.** Wir geben die Lösungen der Rechenaufgaben (2) und (3) an. Die unbekanntenen Matrizen  $X, Y$  und  $Z$  sind leicht aus den angegebenen Bedingungen zu ermitteln. Bezeichnen wir z.B. mit  $x_1, x_2$  die Einträge der ersten Spalte von  $X$ , so ergeben sich aus  $A \cdot X = B$  die Bedingungen

$$\left. \begin{array}{l} x_1 - x_2 = 1 \\ x_2 = 0 \end{array} \right\},$$

aus denen  $x_1 = 1$  und  $x_2 = 0$  abzulesen ist. Insgesamt erhalten wir

$$(2) \quad X = Y = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(3) \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 1/3/200

(S: Varianten)

Gruppen von Matrizen (2)

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Gruppe

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Es sei

$$G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{F}_3 \right\}.$$

(1) Beweisen Sie, daß die Menge  $G$  mit der Matrizenmultiplikation eine Gruppe bildet und bestimmen Sie ihre Ordnung.

(2) Lösen Sie für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$$

die Gleichungen  $A \cdot X = B$ ,  $Y \cdot A = B$ , wobei  $X, Y$  Matrizen aus  $G$  sind.

**Ergebnis.** Wir geben das Resultat der Rechenaufgabe (2) an, das leicht folgt, indem beispielsweise die Einträge beider Seiten der Bedingung  $A \cdot X = B$  aufgeschrieben werden. Bezeichnen wir z.B. mit  $x_1, x_2, x_3$  die Einträge der ersten Spalte von  $X$ , so ergeben sich die Bedingungen

$$\left. \begin{array}{l} x_1 - x_3 = 1 \\ x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{array} \right\},$$

aus denen  $x_1 = 1$ ,  $x_2 = 0$  und  $x_3 = 0$  abzulesen ist usw. Insgesamt erhalten wir

$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 1/3/210

Ein Körper mit 9 Elementen

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Körper

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Es sei  $M = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{F}_3 \right\}$ . Beweisen Sie, dass  $M$  mit der Addition und Multiplikation von Matrizen einen Körper mit 9 Elementen bildet.

**Anleitung.** Berechnen Sie die Potenzen von  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

### Aufgabe 1/3/220

Matrizen und Drehungen

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Isomorphismen von Gruppen, komplexe Zahlen

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Für  $\varphi \in R$  setzen wir  $M(\varphi) := \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ . Zeigen Sie:

$$(1) \quad M(\varphi) \cdot M(\psi) = M(\varphi + \psi)$$

Schließen Sie daraus, dass  $G = \{M(\varphi) \mid \varphi \in R\}$  mit der Matrizenmultiplikation eine abelsche Gruppe bildet.

(2)  $S^1 := \{z \mid z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$  bezeichne den Einheitskreis. Er bildet mit der Multiplikation komplexer Zahlen eine Gruppe  $(S^1, \cdot)$ , die zu  $G$  isomorph ist.

### Aufgabe 1/3/230

Matrizen und Permutationen

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Gruppe, Permutationsgruppe, Isomorphismen von Gruppen

**Stoffeinheiten:** 1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen

Wir setzen

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ und } B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie, dass die Menge  $G = \{A^i \cdot B^j \mid i = 0, 1, 2, j = 0, 1\}$  mit der Matrizenmultiplikation eine Gruppe bildet, die zur Permutationsgruppe  $S_3$  isomorph ist.

**Aufgabe 1/3/240**

Matrizen und die Diedergruppe

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Gruppe

**Stoffeinheiten:** [1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen](#)

Es seien  $A$  und  $B$  die durch

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

gegebenen Matrizen aus  $M(2; \mathbb{R})$ .

Überprüfen Sie, dass  $A^4 = E_2$ ,  $B^2 = E_2$ ,  $B \cdot A = A^3 \cdot B$  ist und beweisen Sie, dass die Menge

$$G = \{A^i \cdot B^j \mid i = 0, \dots, 3, j = 0, 1\}$$

mit der Matrizenmultiplikation eine 8-elementige Gruppe bildet. Geben Sie die Strukturtafel für  $G$  an.

**Aufgabe 1/3/250**

Matrizen und Quaternionen

**Index:** Matrix, Matrizenmultiplikation, Gruppe

**Stoffeinheiten:** [1/3/4 - 1/3/10 Multiplikation von Matrizen](#)

Mit  $I, J \in M(2; \mathbb{C})$  bezeichnen wir die Matrizen  $I := \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$  und  $J := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

Überprüfen Sie die folgenden Eigenschaften:

- (1)  $I^4 = J^4 = E_2$  und  $J \cdot I = I^3 \cdot J$ .
- (2)  $Q_8 := \{J^n \cdot I^m \mid n = 0, \dots, 3, m = 0, 1\}$  ist eine Gruppe mit 8 Elementen (die *Quaternionengruppe*).

## Aufgaben zum Kapitel 2

### Aufgabe 2/1/010

(S: Varianten)

Nullstellenmengen von Polynomen (1)

**Index:** Nullstellenmenge, Polynom**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des Gleichungssystems

Berechnen Sie die Nullstellenmenge  $V(\{f_1, f_2\}) \subseteq \mathbb{R}^2$ , wobei  $f_1$  und  $f_2$  die folgenden Polynome sind:

$$f_1 = X_1 + X_2 - 2, \quad f_2 = X_1^2 - X_1X_2 + X_2^2 + X_2 - 6$$

**Lösung.**  $(x_1, x_2)$  sei eine Nullstelle. Aus der ersten Gleichung ergibt sich  $x_2 = -x_1 + 2$ , dann aus der zweiten  $3x_1^2 - 7x_1 = 0$ , folglich

$$V(\{f_1, f_2\}) = \left\{ (0, 2), \left( \frac{7}{3}, -\frac{1}{3} \right) \right\}.$$

### Aufgabe 2/1/015

(S: Varianten)

Nullstellenmengen von Polynomen (2)

**Index:** Nullstellenmenge, Polynom**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des Gleichungssystems

Berechnen Sie die Nullstellenmenge  $V(\{f_1, f_2\}) \subseteq \mathbb{R}^2$ , wobei  $f_1$  und  $f_2$  die folgenden Polynome sind:

$$f_1 = X_1^2 - X_2^2 + X_1 + X_2, \quad f_2 = X_1^3 + X_1^2X_2 - X_1X_2 - X_2 + 1$$

**Lösung.** Für eine Nullstelle  $(x_1, x_2)$  erhalten wir aus der ersten Gleichung  $x_2 = x_1 + 1$  oder  $x_2 = -x_1$ , dann aus der zweiten  $2x_1^3 - 2x_1 = 0$  oder (im zweiten Fall)  $x_1^2 + x_1 + 1 = 0$ . Die erste dieser beiden Gleichungen für  $x_1$  hat die Lösungen  $-1, 0, 1$ , woraus sofort  $x_2 = 0, 1$  bzw.  $2$  folgt. Im zweiten Fall ist entsprechend vorzugehen.

### Aufgabe 2/1/020

Eigenschaften von Nullstellenmengen (1)

**Index:** Nullstellenmenge, Polynom, Ideal, Nullstellenmenge eines Ideals**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des Gleichungssystems

$f_1, f_2$  seien Polynome in  $K[X_1, \dots, X_n]$ . Wir bezeichnen mit  $I$  die Menge  $I := \{q_1f_1 + q_2f_2 \mid q_1, q_2 \in K[X_1, \dots, X_n]\}$ ; dies ist *das von  $f_1$  und  $f_2$  erzeugte Ideal* in  $K[X_1, \dots, X_n]$ . Zeigen Sie:

$$V(I) = V(\{f_1, f_2\}).$$

(Es führt daher nicht zu Verwechslungen, wenn  $V(f_1, f_2)$  anstelle von  $V(\{f_1, f_2\})$  geschrieben wird.)

### Aufgabe 2/1/030

Eigenschaften von Nullstellenmengen (2)

**Index:** Nullstellenmenge

**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des Gleichungssystems

Überprüfen Sie, dass für beliebige Mengen  $F$  und  $G$  von Polynomen aus  $K[X_1, \dots, X_n]$  die folgenden Eigenschaften erfüllt sind.

- (1)  $V(F \cup G) = V(F) \cap V(G)$ ,
- (2)  $F \subseteq G \implies V(F) \supseteq V(G)$ ,
- (3)  $V(F \cap G) \supseteq V(F) \cup V(G)$ ,
- (4)  $1 \in F \implies V(F) = \emptyset$ ,
- (5)  $V(\{0\}) = V(\emptyset) = K^n$ .

**Aufgabe** 2/1/040

(S: Varianten)

Nullstellenmengen von Polynomen (3)

**Index:** Nullstellenmenge, Polynom**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des GleichungssystemsBestimmen Sie die folgenden Nullstellenmengen von Polynomen über dem Körper  $\mathbf{F}_2$ .

- (1)  $V(\{X_1^2 + X_1 + X_3^2 + 1, X_1^2 X_3 + X_1 X_3\}) \subseteq \mathbf{F}_2^3$ .
- (2)  $V(\{X_1^2 + X_1 X_3 + X_1 + 1, X_1 X_2 + X_1 X_3 X_4 + X_2 X_3^2, X_1 X_2 + X_2^2\}) \subseteq \mathbf{F}_2^4$ .

**Lösung.** Da die Lösungen in einer endlichen Menge zu suchen sind, lassen sie sich durch systematisches Probieren ermitteln. Wir setzen alle Tripel bzw. Quadrupel aus Elementen von  $\mathbf{F}_2$  ein und erhalten

$$\begin{aligned} \text{Fall (1): } V &= \{(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\} \\ \text{Fall (2): } V &= \{(1, 0, 1, 0), (1, 1, 1, 0)\} \end{aligned}$$

**Aufgabe** 2/1/050

(S: Varianten)

Nullstellenmengen von Polynomen (4)

**Index:** Nullstellenmenge, Polynom**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des GleichungssystemsBerechnen Sie die folgenden Nullstellenmengen über dem Körper  $\mathbf{F}_3$ .

- (1)  $V(\{-X_1^3 - X_1 X_2 - X_1, X_1^2 - X_2^2 - X_2 + 1\}) \subseteq \mathbf{F}_3^2$ .
- (2)  $V(\{-X_1 + X_3, X_1 X_2^2 X_3 + X_1 + X_2^3 + X_3^2\}) \subseteq \mathbf{F}_3^3$ .
- (3)  $V(\{-X_1 X_2 - X_2^2\}) \subseteq \mathbf{F}_3^2$ .

**Lösung.** Die Aufgabe ist durch systematisches Probieren lösbar. Es ergibt sich

$$\text{Fall (1): } V = \{(1, 1), (2, 1)\}$$

Fall (2):

$$V = \{(0, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 2, 0), (1, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 2, 1), (2, 0, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 2)\}$$

$$\text{Fall (3): } V = \{(0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (1, 2)\}$$

**Aufgabe** 2/1/060

Veranschaulichung von Nullstellenmengen

**Index:** Nullstellenmenge, Polynom

**Stoffeinheiten:** 2/1/1 - 2/1/2 Der Begriff des Gleichungssystems

Wir betrachten die reellen Polynome

$$f_1 = X - 3Y + 5 \quad \text{und} \quad f_2 = X^2 + Y^2 - 5.$$

Skizzieren Sie die Nullstellenmengen  $V(\{f_1\})$ ,  $V(\{f_2\})$  und  $V(\{f_1, f_2\})$  in  $\mathbb{R}^2$ . Beweisen und interpretieren Sie an diesem Bild die Formel

$$V(\{f_1, f_2\}) = V(\{f_1\}) \cap V(\{f_2\}).$$

**Aufgabe** 2/1/070

(S: Varianten)

Lineare Gleichungen, erste Schritte (1)

**Index:** lineares Gleichungssystem, Zeilenstufenform, Lösungsmenge eines Gleichungssystems

**Stoffeinheiten:** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

Lösen Sie das folgende (bereits in Zeilenstufenform vorliegende) Gleichungssystem über  $\mathbb{R}$ , d.h. bestimmen Sie die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ , für die folgende Bedingungen erfüllt sind.

$$\begin{aligned} 4x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 1 \\ 2x_2 - x_3 &= 1 \end{aligned}$$

**Lösung.** Stufenindizes sind 1 und 2. Entsprechend der verbleibenden Position setzen wir einen Parameter  $x_3 = 4t \in \mathbb{R}$  ein. (Wir hätten natürlich auch  $x_3 = t$  wählen können; durch den Trick mit dem Faktor wollen wir uns das Rechnen mit einigen Brüchen ersparen. Wir finden ihn, indem wir die Koeffizienten der „Stufenvariablen“ betrachten.)

Nach Umstellen der zweiten Gleichung ergibt sich

$$x_2 = 2t + \frac{1}{2}, \text{ sowie durch Einsetzen in die erste}$$

$$x_1 = -3t + \frac{1}{2}, \text{ folglich}$$

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3) &= \left(-3t + \frac{1}{2}, 2t + \frac{1}{2}, 4t\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) + t \cdot (-3, 2, 4). \end{aligned}$$

Der gaußsche Algorithmus zeigt, dass eine notwendige und hinreichende Bedingung gefunden wurde, wir erhalten damit die Lösungsmenge des Gleichungssystems als

$$\left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right) + t \cdot (-3, 2, 4) \mid t \in \mathbb{R} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3.$$

**Aufgabe** 2/1/080

(S: Varianten)

Lineare Gleichungen, erste Schritte (2)

**Index:** lineares Gleichungssystem, Zeilenstufenform, Lösungsmenge eines Gleichungssystems

**Stoffeinheiten:** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

Lösen Sie über dem Grundkörper der reellen Zahlen das folgende lineare Gleichungssystem:

$$\begin{aligned}x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\-4x_1 - x_2 - 4x_3 - 7x_4 &= -8 \\-x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 &= 5\end{aligned}$$

**Lösung.** Da der Koeffizient von  $x_1$  in der ersten Gleichung verschwindet, wird diese zunächst mit der zweiten vertauscht, was auf die Lösungsmenge keinen Einfluss hat.

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\-4x_1 - x_2 - 4x_3 - 7x_4 &= -8 \\-x_1 + 5x_2 - 2x_3 + x_4 &= 5\end{aligned}$$

Nun können Vielfache der ersten Gleichung von den folgenden subtrahiert werden, so dass in diesen die Koeffizienten vor  $x_1$  verschwinden.

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\-x_2 + 8x_3 + 9x_4 &= 16 \\5x_2 + x_3 + 5x_4 &= 11\end{aligned}$$

Entsprechend wird das aus der zweiten bis vierten Gleichung bestehende Teilsystem umgeformt:

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\5x_3 + 7x_4 &= 12 \\16x_3 + 15x_4 &= 31\end{aligned}$$

Da wir ungern mit Brüchen rechnen, werden die 3. und 4. Gleichung mit 16 bzw. 5 multipliziert. Das so entstehende System

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\80x_3 + 112x_4 &= 192 \\80x_3 + 75x_4 &= 155\end{aligned}$$

wird durch Subtraktion der dritten Gleichung von der vierten in ein System in Stufenform überführt.

$$\begin{aligned}x_1 + 3x_3 + 4x_4 &= 6 \\x_2 - 3x_3 - 2x_4 &= -4 \\80x_3 + 112x_4 &= 192 \\-37x_4 &= -37\end{aligned}$$

Wir erhalten zunächst aus der letzten Gleichung  $x_4 = 1$ ; entsprechend ergeben sich die übrigen  $x_i$  durch Einsetzen in die vorhergehenden, also

$$x_3 = \frac{1}{80} \cdot (192 - 112x_4) = \frac{1}{80} \cdot (192 - 112) = 1 \quad \text{usw.}$$

Die Lösungsmenge des Systems ist

$$\{(-1, 1, 1, 1)\}.$$

**Anmerkung.** Das hier verwendete Verfahren ist eine Variante des gaußschen Algorithmus, bei der durch Multiplikation mit geeigneten von 0 verschiedenen ganzen Zahlen vermieden wurde, dass Brüche als Koeffizienten auftreten.

Der Fall, dass ein Gleichungssystem mit quadratischer reeller Koeffizientenmatrix genau eine Lösung hat, kann als „allgemein“ angesehen werden, da er für „fast beliebige“ Koeffizienten auftritt. Sonst kann die Lösungsmenge leer oder unendlich sein.

### Aufgabe 2/2/010

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme in Stufenform

**Index:** lineares Gleichungssystem, lineares Gleichungssystem in Stufenform, Zeilenstufenform, Stufenindizes

**Stoffeinheiten:** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

Lösen Sie das folgende (bereits in Zeilenstufenform vorliegende) Gleichungssystem, d.h. bestimmen Sie die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$ , so dass die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.

$$\begin{aligned} -x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 - 2x_5 &= 0 \\ -x_3 - x_4 - 2x_5 &= 0 \\ -x_4 + x_5 &= -1 \end{aligned}$$

**Lösung.** Wir setzen Parameter  $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$  für die beiden Unbestimmten ein, die an keiner Stufenposition vorkommen.

„Von unten“ beginnend ergibt sich durch schrittweise Substitution nun  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  in Abhängigkeit von den Zahlen  $t_i$ . Durch Umstellen erhalten wir die Lösungsmenge  $\{(-2, 0, -1, 1, 0) + t_1 \cdot (2, 1, 0, 0, 0) + t_2 \cdot (-6, 0, -3, 1, 1) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$ .

### Aufgabe 2/2/020

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_3$

**Index:** lineares Gleichungssystem, lineares Gleichungssystem in Stufenform, Zeilenstufenform, Stufenindizes

**Stoffeinheiten:** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

Lösen Sie das folgende (bereits in Zeilenstufenform vorliegende) Gleichungssystem über  $\mathbb{F}_3$ , d.h. bestimmen Sie die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  aus  $\mathbb{F}_3^5$ , so dass die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.

$$\begin{aligned} -x_1 - x_4 + x_5 &= -1 \\ x_3 + x_5 &= 0 \\ x_4 - x_5 &= 1 \end{aligned}$$

**Lösung.** Wir setzen Parameter  $t_1, t_2 \in \mathbb{F}_3$  für die beiden Unbestimmten ein, die an keiner Stufenposition vorkommen.

„Von unten“ beginnend ergibt sich durch schrittweise Substitution nun  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  in Abhängigkeit von den Zahlen  $t_i$ . Durch Umstellen erhalten wir die Lösungsmenge

$$\{(0, 0, 0, 1, 0) + t_1 \cdot (0, 1, 0, 0, 0) + t_2 \cdot (0, 0, -1, 1, 1) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{F}_3\} \subseteq \mathbb{F}_3^5.$$

**Aufgabe 2/2/030**

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten (1)

**Index:** lineares Gleichungssystem, lineares Gleichungssystem in Stufenform, Zeilenstufenform, Stufenindizes**Stoffeinheiten:** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in Stufenform

Lösen Sie das folgende (bereits in Zeilenstufenform vorliegende) Gleichungssystem über  $\mathbb{C}$ , d.h. bestimmen Sie die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{C}^3$ , so dass die angegebenen Bedingungen erfüllt sind.

$$\begin{aligned} -(2i - 1)x_1 - (i + 1)x_2 - 2ix_3 &= 0 \\ -ix_2 + 2ix_3 &= -2i \end{aligned}$$

**Lösung.** Stufenindizes sind 1 und 2. Entsprechend der verbleibenden Position setzen wir einen Parameter  $x_3 = 5t \in \mathbb{C}$  ein. (Wir hätten natürlich auch  $x_3 = t$  wählen können; durch den Trick wollen wir uns das Rechnen mit einigen Brüchen ersparen. Wir finden einen geeigneten Faktor, indem wir die Koeffizienten der „Stufenvariablen“ betrachten.) Nach Umstellen der zweiten Gleichung ergibt sich

$$x_2 = 10t + 2, \text{ sowie durch Einsetzen in die erste}$$

$$x_1 = (8i - 6)t + \left(\frac{6}{5}i - \frac{2}{5}\right), \text{ folglich}$$

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3) &= \left((8i - 6)t + \left(\frac{6}{5}i - \frac{2}{5}\right), 10t + 2, 5t\right) \\ &= \left(\left(\frac{6}{5}i - \frac{2}{5}\right), 2, 0\right) + t \cdot ((8i - 6), 10, 5). \end{aligned}$$

Wir haben eine notwendige und hinreichende Bedingung gefunden und erhalten damit die Lösungsmenge des Gleichungssystems als

$$\left\{ \left(\left(\frac{6}{5}i - \frac{2}{5}\right), 2, 0\right) + t \cdot ((8i - 6), 10, 5) \mid t \in \mathbb{C} \right\} \subseteq \mathbb{C}^3.$$

**Aufgabe 2/2/040**

(S: Varianten)

Einfache Fälle linearer Gleichungssysteme

**Index:** lineares Gleichungssystem, lineares Gleichungssystem in Stufenform, Zeilenstufenform, Stufenindizes**Stoffeinheiten:** 2/2/1 - 2/2/6 Transformation in eine Stufenform

Bestimmen Sie die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ , für die das jeweilige Gleichungssystem erfüllt ist.

$$(1) \begin{cases} -x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + x_2 = -1 \\ -x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -1 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

**Ergebnis.** Die Lösungsmengen der Systeme sind

- (1)  $\{(-1, 0, 1)\}$  bzw.  
 (2)  $\{(-1, 0, 0) + t \cdot (0, -1, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ .

**Aufgabe 2/2/060**

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_7$ **Index:** lineares Gleichungssystem, erweiterte Koeffizientenmatrix, gaußscher Algorithmus**Stoffeinheiten:** 2/2/7 - 2/2/13 Beschreibung eines linearen Gleichungssystems durch Matrizen und reduzierte FormLösen Sie das folgende Gleichungssystem über dem Körper  $\mathbb{F}_7$ , wobei die Koeffizienten durch die Struktur von  $\mathbb{F}_7$  als  $\mathbb{Z}$ -Algebra gegeben sind.

$$44x_1 + 61x_2 + 47x_3 + 20x_4 = -60$$

$$-30x_1 + 8x_2 - 41x_3 - 34x_4 = 14$$

$$40x_1 - 63x_2 + 13x_3 - 22x_4 = 61$$

$$75x_1 - 44x_2 + 57x_3 - 82x_4 = -74$$

**Lösung.** Nach geeigneter Reduktion der Koeffizienten  $\text{mod}(7)$  erhalten wir die folgenden Gleichungen:

$$2x_1 - 2x_2 - 2x_3 - x_4 = 3$$

$$-2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$$

$$-2x_1 - x_3 - x_4 = -2$$

$$-2x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 = 3$$

Die erweiterte Koeffizientenmatrix

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & -1 & 3 \\ -2 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & -1 & -1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

des Systems wird mit dem gaußschen Algorithmus umgeformt; wir erhalten die Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

eines äquivalenten Systems. Daraus ergibt sich leicht  $\{(2, -1, -2, 0)\}$  als Lösungsmenge des gegebenen Gleichungssystems.**Aufgabe 2/2/070**Anzahl der Lösungen einiger linearer Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_2$ **Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge**Stoffeinheiten:** 2/1/3 - 2/1/6 Die Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems in StufenformWir fixieren den 2-elementigen Grundkörper  $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/(2)$ .

(1) Lösen Sie das folgende System:

$$\begin{aligned}x + y + z &= 1 \\x + z &= 1\end{aligned}$$

(2) Wieviele Lösungen hat die folgende Gleichung?

$$x + y + z + u + v + w = 1$$

(3)  $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{F}_2$  und  $n \geq 1$  seien beliebig. Wieviele Lösungen hat das folgende Gleichungssystem? (Vorsicht!)

$$a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$$

### Aufgabe 2/2/080

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme in der Charakteristik 0, 3, 5

**Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge, erweiterte Koeffizientenmatrix, gaußscher Algorithmus, Charakteristik eines Körpers

**Stoffeinheiten:** 2/2/1 - 2/2/6 Transformation in eine Stufenform

Lösen Sie das Gleichungssystem

$$\begin{aligned}2x_1 - 2x_2 - 7x_3 - 6x_4 &= 5 \\-4x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 2x_4 &= 10 \\10x_2 - x_3 - 10x_4 &= -9 \\2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 &= -3\end{aligned}$$

über dem Körper  $K$  in jedem der folgenden Fälle

- (1)  $\text{char}(K) = 0$ ,
- (2)  $\text{char}(K) = 5$ ,
- (3)  $\text{char}(K) = 3$ .

Beachten Sie, dass das Symbol für eine ganze Zahl  $n$  auch als Bezeichnung für das Element  $n \cdot 1 \in K$  verwendet wird.

### Ergebnis.

- (1)  $\{(-2, -1, -1, 0)\}$ ,
- (2)  $\{(-1, 0, -1, 0) + t_1 \cdot (1, 1, 0, 0) + t_2 \cdot (-2, 0, 0, 1) \mid t_1, t_2 \in K\}$ ,
- (3)  $\{(1, -1, -1, 0) + t_1 \cdot (1, 0, -1, 1) \mid t_1 \in K\}$ .

### Aufgabe 2/2/090

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten (2)

**Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge, erweiterte Koeffizientenmatrix, gaußscher Algorithmus

**Stoffeinheiten:** 2/2/7 - 2/2/13 Beschreibung eines linearen Gleichungssystems durch Matrizen und reduzierte Form

Lösen Sie das folgende Gleichungssystem über  $\mathbb{C}$ , d.h. bestimmen Sie die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{C}^3$  für die folgende Bedingungen erfüllt sind.

$$\begin{aligned} -x_1 - (i-1)x_2 - ix_3 &= -(i-1) \\ -ix_1 - (i-1)x_2 - ix_3 &= 1 \end{aligned}$$

**Lösung.** Mit dem gaußschen Algorithmus wird die erweiterte Koeffizientenmatrix des Systems in die Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} -1 & -(i-1) & -i & -(i-1) \\ 0 & -2i & -(i+1) & -i \end{pmatrix}$$

überführt. Stufenindizes sind 1 und 2. Entsprechend der verbleibenden Position setzen wir einen Parameter  $x_3 = 2t \in \mathbb{C}$  ein. (Wir hätten natürlich auch  $x_3 = t$  wählen können; durch den Trick wollen wir uns das Rechnen mit einigen Brüchen ersparen. Wir finden einen geeigneten Faktor, indem wir die Koeffizienten der „Stufenvariablen“ betrachten.) Nach Umstellen der zweiten Gleichung ergibt sich

$$x_2 = (i-1)t + \frac{1}{2}, \text{ sowie durch Einsetzen in die erste}$$

$$x_1 = \left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right), \text{ folglich}$$

$$\begin{aligned} (x_1, x_2, x_3) &= \left(\left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right), (i-1)t + \frac{1}{2}, 2t\right) \\ &= \left(\left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right), \frac{1}{2}, 0\right) + t \cdot (0, (i-1), 2). \end{aligned}$$

Der gaußsche Algorithmus zeigt, dass eine notwendige und hinreichende Bedingung gefunden wurde, wir erhalten damit die Lösungsmenge des Gleichungssystems als

$$\left\{ \left(\left(\frac{1}{2}i - \frac{1}{2}\right), \frac{1}{2}, 0\right) + t \cdot (0, (i-1), 2) \mid t \in \mathbb{C} \right\} \subseteq \mathbb{C}^3.$$

### Aufgabe 2/2/100

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (1)

**Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge, gaußscher Algorithmus

**Stoffeinheiten:** 2/2/1 - 2/2/6 Transformation in eine Stufenform

Lösen Sie für eine feste Zahl  $c \in \mathbb{R}$  das folgende Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 &= -2 \\ -2x_1 + (c-1)x_2 + cx_3 &= (c-1) \\ -2x_1 + (2c-4)x_2 + 2cx_3 &= (2c-10) \end{aligned}$$

**Lösung.** Mit dem gaußschen Algorithmus erhalten wir leicht das folgende äquivalente System:

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 - x_3 &= -2 \\ (c-3)x_2 + (c-2)x_3 &= (c-5) \\ 2x_3 &= -4 \end{aligned}$$

Im Falle  $c \neq 3$  ergibt sich daraus die Lösungsmenge

$$\{(-1, 3, -2)\},$$

sowie für  $c = 3$

$$\{(-4, 0, -2) + t \cdot (1, 1, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

### Aufgabe 2/2/110

(S: Varianten)

Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (2)

**Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge

**Stoffeinheiten:** 2/2/1 - 2/2/6 Transformation in eine Stufenform

Lösen Sie für eine feste Zahl  $c \in \mathbb{R}$  das folgende Gleichungssystem:

$$\begin{aligned}x_1 - (c - 1)x_2 + (c - 2)x_3 &= (c - 3) \\2x_1 - (c + 1)x_2 + (4c - 10)x_3 &= (2c - 9)\end{aligned}$$

**Lösung.** Durch eine einfache Zeilenoperation erhalten wir ein äquivalentes System in Zeilenstufenform:

$$\begin{aligned}x_1 - (c - 1)x_2 + (c - 2)x_3 &= (c - 3) \\(c - 3)x_2 + (2c - 6)x_3 &= -3\end{aligned}$$

Daraus sind die Lösungsmengen leicht abzulesen, dies sind falls  $c \neq 3$

$$\left\{ \left( \frac{(c^2 - 9c + 12)}{(c - 3)}, \frac{-3}{(c - 3)}, 0 \right) + t \cdot (-(3c - 4), -2, 1) \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

sowie für  $c = 3$  die leere Menge.

**Aufgabe 2/2/130**

Rechnen mit Näherungen

**Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge

**Stoffeinheiten:** 2/2/7 - 2/2/13 Beschreibung eines linearen Gleichungssystems durch Matrizen und reduzierte Form

Bestimmen Sie in  $\mathbb{R}^3$  jeweils die Anzahl der Lösungen  $(x, y, z)$  des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned}x + wy &= 1 \\wx + 3y &= 2 \\2y + wz &= 3,\end{aligned}$$

wobei  $w$  eine der folgenden drei Zahlen ist.

- (1)  $w = \sqrt{3}$ ,
- (2)  $w = 1,7320508075688772935274463415058723669428$ ,
- (3)  $w = 0$ .

**Aufgabe 2/2/140**

Matrizengleichungen

(S: Varianten)

**Index:** lineares Gleichungssystem, Lösungsmenge

**Stoffeinheiten:** 2/2/1 - 2/2/6 Transformation in eine Stufenform

Geben Sie ein lineares Gleichungssystem an, das zur Bedingung

$$\begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ -7 & -6 \end{pmatrix}$$

äquivalent ist und lösen Sie dieses System.

**Lösung.** Wir erhalten das folgende lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} -3x_1 &= 6 \\ -3x_2 &= 6 \\ 3x_1 + x_3 &= -7 \\ 3x_2 + x_4 &= -6, \end{aligned}$$

dessen Lösung sich leicht als  $x_1 = -2$ ,  $x_2 = -2$ ,  $x_3 = -1$ ,  $x_4 = 0$  ergibt.

### Aufgabe 2/2/150

(S: Varianten)

Stufentransformation für Matrizen

**Index:** lineares Gleichungssystem, Zeilenstufenmatrix

**Stoffeinheiten:** [2/2/7](#) - [2/2/13](#) [Beschreibung eines linearen Gleichungssystems durch Matrizen und reduzierte Form](#)

Überführen Sie mit Hilfe des gaußschen Algorithmus die folgenden Matrizen (über den jeweils angegebenen Grundkörpern) in äquivalente Zeilenstufenmatrizen.

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 2 & -4 & 5 \\ 2 & -8 & 10 \\ -4 & 4 & 4 \end{pmatrix} \in M(4, 3; \mathbb{R}),$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M(5; \mathbb{F}_2),$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in M(3, 4; \mathbb{F}_5).$$

**Ergebnis.** Wir erhalten in den jeweiligen Fällen

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 5 & 4 & 3 \\ 0 & -28 & 19 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/010

(S: Varianten)

Rangbestimmung, erste Schritte

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Überführen Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ -4 & -2 & -3 & -6 \\ -1 & 1 & -4 & 6 \end{pmatrix}$$

durch Zeilentransformationen in eine obere Dreiecksmatrix und geben Sie ihren Rang an.

**Lösung.**  $a_{11} = 0$ , daher wird zunächst die erste Zeile mit der zweiten vertauscht. Wir erhalten

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ -4 & -2 & -3 & -6 \\ -1 & 1 & -4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Nun können Vielfache der ersten Zeile von den folgenden subtrahiert werden, so dass die übrigen Einträge der ersten Spalte verschwinden. Entsprechend wird mit der zweiten Zeile verfahren; wir erhalten zeilenäquivalente Matrizen

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 11 \end{pmatrix}.$$

Da wir ungern mit Brüchen rechnen, werden die 3. und 4. Zeile der zuletzt aufgetretenen Matrix mit  $-3$ , bzw.  $7$ , multipliziert; entsprechend ergibt sich sich

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 7 & 2 \\ 0 & 0 & -3 & 11 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -21 & -6 \\ 0 & 0 & -21 & 77 \end{pmatrix},$$

daher nach Subtraktion der dritten Zeile von der vierten

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -21 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 83 \end{pmatrix}.$$

Es entsteht eine Stufenmatrix mit vier Zeilenstufen, daher ist

$$\text{rang}(A) = 4.$$

Tatsächlich lässt sich zeigen, dass hier der allgemeine Fall vorliegt; eine Matrix aus  $M(n; \mathbb{R})$  hat „fast immer“ den Rang  $n$ .

Das hier verwendete Verfahren ist eine Variante des gaußschen Algorithmus. Es ist allgemein ausführbar und beruht auf der Hintereinanderausführung von Zeilentransformationen der folgenden Art:

- (1) Addition des Vielfachen einer Zeile von  $A$  zu einer anderen,
- (2) Multiplikation einer Zeile der Matrix  $A$  mit einer Zahl  $c \neq 0$ ,
- (3) Vertauschen zweier Zeilen der Matrix  $A$ .

**Aufgabe 2/3/011**

(S: Varianten)

Rangbestimmung, einfache Beispiele

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Bestimmen Sie den Rang jeder der folgenden reellen Matrizen.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -4 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.** Wir erhalten durch Zeilen- und Spilentransformationen Stufenmatrizen, aus denen sich leicht der Rang ablesen lässt. Es ist  $\text{rang}(A_1) = 3$ ,  $\text{rang}(A_2) = 2$ ,  $\text{rang}(A_3) = 2$ .

**Aufgabe 2/3/020**

(S: Varianten)

Rangbestimmung, Beispiele aus  $M(4; \mathbb{R})$ **Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Bestimmen Sie den Rang jeder der folgenden reellen Matrizen.

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 8 & -4 & -6 & -3 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.** Wir erhalten durch Zeilen- und Spilentransformationen Stufenmatrizen, aus denen sich leicht der Rang ablesen lässt. Es ist  $\text{rang}(A_1) = 2$ ,  $\text{rang}(A_2) = 4$

**Aufgabe 2/3/030**

(S: Varianten)

Rangbestimmung, Beispiele über  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{F}_2$ ,  $\mathbb{F}_3$ **Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -5 & -3 \\ 3 & 7 & 1 \\ 2 & -8 & -6 \end{pmatrix},$$

wenn diese als Matrix

- (1) über dem Körper  $\mathbb{R}$ ,
- (2) über dem Körper  $\mathbb{F}_3$  bzw.
- (3) über dem Körper  $\mathbb{F}_2$

aufgefasst wird.

**Ergebnis.**

- (1)  $\text{rang}_{\mathbb{R}}(A) = 3$ ,
- (2)  $\text{rang}_{\mathbb{F}_3}(A) = 2$ ,
- (3)  $\text{rang}_{\mathbb{F}_2}(A) = 1$ .

**Aufgabe 2/3/040**

(S: Varianten)

Rangbestimmung, Beispiele mit einem Parameter

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A(t) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & t & t \\ 0 & (t+3) & (2t+6) & 0 & (2t+6) \\ -2 & -(2t+4) & -(4t+13) & -t & -(5t+12) \end{pmatrix}$$

aus  $M(3, 5; \mathbb{R})$  für beliebige Zahlen  $t \in \mathbb{R}$ .

**Lösung.**  $A(t)$  ist zeilenäquivalent zu

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & t & t \\ 0 & (t+3) & (2t+6) & 0 & (2t+6) \\ 0 & 0 & 1 & t & t \end{pmatrix},$$

daher folgt  $\text{rang}(A(t)) = 3$  für  $t \neq -3$ . Anderenfalls ist  $\text{rang}(A(t)) = 2$ .

**Aufgabe 2/3/050**

(S: Varianten)

Rangbestimmung, Beispiele mit zwei Parametern

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Bestimmen Sie den Rang der folgenden Matrix in Abhängigkeit von den Parametern  $s, t \in \mathbb{R}$ .

$$A(s, t) = \begin{pmatrix} s & (s-2t) & -(s+t) \\ s & (2s-5t) & -(3s+3t) \\ s & t & (2s+2t) \end{pmatrix}.$$

**Lösung.**  $A(s, t)$  ist zeilenäquivalent zur Matrix

$$\begin{pmatrix} s & (s-2t) & -(s+t) \\ 0 & (s-3t) & -(2s+2t) \\ 0 & 0 & (s+t) \end{pmatrix}.$$

Daraus ergeben sich zunächst die folgenden Möglichkeiten.

$$s = t = 0: A = 0, \text{rang}(A(s, t)) = 0,$$

$$s = 0, t \neq 0: \text{rang}(A(s, t)) = 2,$$

$$s = 3t \neq 0: \text{rang}(A(s, t)) = 2,$$

$$s = -t \neq 0: \text{rang}(A(s, t)) = 2.$$

In allen anderen Fällen ist  $\text{rang}(A(s, t)) = 3$ .

### Aufgabe 2/3/060

Rangbestimmung, Beispiele mit 3 Parametern

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix

**Stoffeinheiten:** [2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix](#)

$a, b, c$  seien reelle Zahlen. Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/070

Rangbestimmung für einige spezielle Matrizen

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Permutationsmatrix

**Stoffeinheiten:** [2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix](#)

Überprüfen Sie die folgenden Behauptungen für Matrizen über dem Körper  $K$ .

(1)  $A$  sei die Diagonalmatrix

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

mit  $a_i \in K$ . Dann gilt  $\text{rang}(A) = n - |\{i \mid a_i = 0\}|$ .

(2) Eine obere Dreiecksmatrix

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

hat genau dann den Rang  $n$ , wenn  $a_{11} \cdot a_{22} \cdot \dots \cdot a_{nn} \neq 0$ .

(3)  $B$  sei eine Matrix der Gestalt

$$\begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \dots & a_n b_n \end{pmatrix}$$

mit  $a_i, b_j \in K$ , wobei wenigstens eine der Zahlen  $a_i$  und wenigstens eine der Zahlen  $b_j$  von Null verschieden sind. Dann hat die Matrix  $B$  den Rang 1.

(4) Permutationsmatrizen aus  $M(n; K)$  haben den Rang  $n$ .

### Aufgabe 2/3/080

Rangbestimmung, ein Beispiel mit irrationalen Koeffizienten

**Index:** Matrix, Rang einer Matrix, Stufenmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Bestimmen Sie den Rang der Matrix

$$\begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} + \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 2 & \sqrt{3} + 1 & \sqrt{2} \\ 2 + 2\sqrt{3} & 5 + \sqrt{6} + \sqrt{3} & 2\sqrt{6} \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R}).$$

**Aufgabe** 2/3/090

(S: Varianten)

Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme

**Index:** Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems, Rang einer Matrix, Satz von Kronecker-Capelli**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Entscheiden Sie mit Hilfe des Satzes von Kronecker-Capelli, welches der folgenden Gleichungssysteme lösbar ist.

$$(1) \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 = -4 \\ -x_1 - x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 2x_3 = 0 \\ -2x_1 = 2 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} -2x_1 - x_3 - x_4 = 0 \\ -2x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 = -2 \\ -6x_1 - x_2 - 4x_3 - 4x_4 = -1 \end{cases}$$

**Lösung.** Wir bezeichnen mit  $A$  die Koeffizientenmatrix, mit  $(A, b)$  die erweiterte Koeffizientenmatrix des jeweiligen Systems. Beispielsweise ist im Fall (3)

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -2 & -2 \\ -6 & -1 & -4 & -4 \end{pmatrix}, \quad (A, b) = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 & -2 & -2 \\ -6 & -1 & -4 & -4 & -1 \end{pmatrix}.$$

Nun werden (z.B. mit dem gaußschen Algorithmus oder einer phantasievollen Methode)  $\text{rang}(A)$  und  $\text{rang}(A, b)$  bestimmt. Lösbarkeit ist äquivalent zur Bedingung  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A, b)$ . Wir erhalten in den angegebenen Fällen:

- (1)  $\text{rang}(A) = 2$ ,  $\text{rang}(A, b) = 2$ ; das System ist lösbar.
- (2)  $\text{rang}(A) = 2$ ,  $\text{rang}(A, b) = 3$ ; das System ist unlösbar.
- (3)  $\text{rang}(A) = 2$ ,  $\text{rang}(A, b) = 3$ ; das System ist unlösbar.

**Aufgabe** 2/3/100

(S: Varianten)

Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems über  $\mathbb{F}_5$ **Index:** Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems, Rang einer Matrix, Satz von Kronecker-Capelli**Stoffeinheiten:** 2/3/1 - 2/3/5 Der Rang einer Matrix

Entscheiden Sie mit Hilfe des Satzes von Kronecker-Capelli, welches der folgenden Gleichungssysteme über den Körper  $\mathbb{F}_5$  lösbar ist und geben Sie in diesem Fall die Anzahl der Lösungen an.

$$(1) \quad \begin{cases} 2x_1 - x_2 - 2x_3 = -2 \\ -2x_1 - 2x_3 = -1 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = -1 \\ -2x_1 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(3) \quad \begin{cases} -2x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

**Lösung.** Wir bezeichnen mit  $A$  die Koeffizientenmatrix, mit  $(A, b)$  die erweiterte Koeffizientenmatrix des jeweiligen Systems; Lösbarkeit ist äquivalent zur Bedingung  $\text{rang}(A) = \text{rang}(A, b)$ . Tritt nach Ausführung des gaußschen Algorithmus in einem lösba- ren System kein Parameter auf, so existiert genau eine Lösung; bei einem Parameter  $t$  sind dies (entsprechend der Zahl der möglichen Werte  $t \in \mathbb{F}_5$ ) genau 5 Werte.

Wir erhalten in den angegebenen Fällen:

- (1)  $\text{rang}(A) = 2$ ,  $\text{rang}(A, b) = 2$ ; das System ist lösbar (5 Lösungen).
- (2)  $\text{rang}(A) = 3$ ,  $\text{rang}(A, b) = 3$ ; das System ist lösbar (1 Lösung).
- (3)  $\text{rang}(A) = 2$ ,  $\text{rang}(A, b) = 3$ ; das System ist unlösbar.

**Anmerkung.** Tatsächlich erhalten wir bei konsequenter Ausführung des gaußschen Algo- rithmus allgemein genau  $5^m$  Lösungen, falls  $m$  die Zahl der dabei auftretenden Parameter bezeichnet.

### Aufgabe 2/3/110

(S: Varianten)

Beispiele für inverse Matrizen (1)

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Untersuchen Sie, welche der folgenden Matrizen invertierbar ist und geben Sie in diesem Fall die Inverse an.

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 4 \\ 9 & -7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ -6 & -8 & -8 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ \lambda & 1 \end{pmatrix} \quad \text{für } \lambda \in \mathbb{R}.$$

**Lösung.** Wir erhalten die inverse Matrix, indem wir beispielsweise im ersten Fall  $(A, E_2)$  durch Zeilentransformationen äquivalent in eine Matrix  $(E_2, A')$  umformen; dies ist genau

dann möglich, wenn  $A$  invertierbar ist und es gilt dann  $A' = A^{-1}$ . So ergibt sich im ersten Fall

$$\begin{pmatrix} -5 & 4 & 1 & 0 \\ 9 & -7 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -5 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -9 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7 & 4 \\ 0 & 1 & 9 & 5 \end{pmatrix}.$$

Daher ist  $A$  invertierbar und  $A^{-1} = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 9 & 5 \end{pmatrix}$ .

Entsprechend (wenn auch mit etwas mehr Mühe) erhalten wir wir in den weiteren Fällen:

$B$  ist nicht invertierbar (auch erkennbar aus  $\text{rang}(B) < 3$ ),

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$D(\lambda)$  ist genau dann invertierbar, wenn  $\lambda \neq \pm 1$ ; dann gilt

$$D(\lambda)^{-1} = \frac{1}{\lambda^2 - 1} \begin{pmatrix} -1 & \lambda \\ \lambda & -1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/120

(S: Varianten)

Beispiele für inverse Matrizen (2)

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Zeigen Sie, dass die folgende Matrix  $A \in M(4; \mathbb{R})$  invertierbar ist und bestimmen Sie ihre inverse Matrix:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 & -3 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

**Ergebnis.** Die Matrix  $(A, E_4)$  lässt sich durch Zeilentransformationen in eine äquivalente Matrix  $(E_4, A')$  überführen. Daher ist  $A$  invertierbar und  $A^{-1} = A'$ ; es ergibt sich

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ -10 & 3 & 11 & 13 \\ -6 & 1 & 7 & 9 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/130

(S: Varianten)

Beispiele für inverse Matrizen über  $\mathbb{F}_3, \mathbb{C}$

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Für die nachfolgend angegebenen Matrizen sind die Inversen zu bestimmen;

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & -5 & 3 \\ 1 & -3 & -2 \\ 9 & -7 & 5 \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{F}_3),$$

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} i & -(i+1) \\ -i & (i+2) \end{pmatrix} \in M(2; \mathbb{C}).$$

**Ergebnis.** Unter (1) erhalten wir aus der Matrix  $A$  durch Reduktion mod(3) eine Matrix

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Wir formen  $(\bar{A}, E_3)$  zeilenäquivalent in die Matrix  $(E_3, A^{-1})$  um und erhalten dabei

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Im Fall (2) ergibt sich entsprechend

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} -(2i-1) & -(i-1) \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/131

(S: Varianten)

Bestimmung inverser Matrizen über  $\mathbb{F}_{29}$

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix, gaußscher Algorithmus, reguläre Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Invertieren Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -14 \\ -10 & 3 \end{pmatrix}$$

über dem endlichen Primkörper  $\mathbb{F}_{29}$ .

**Lösung.** Wir erhalten die inverse Matrix, indem wir beispielsweise  $(A, E_2)$  durch Zeilentransformationen äquivalent in eine Matrix  $(E_2, A')$  umformen. Ist dies möglich, so gilt  $A' = A^{-1}$ . Dabei werden wir unter Vermeidung von Divisionen zunächst eine Matrix  $(D, A'')$  erzeugen, wobei  $D$  eine Diagonalmatrix ist. Ausgehend von

$$\begin{pmatrix} 2 & -14 & 1 & 0 \\ -10 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich schrittweise

$$\begin{pmatrix} 2 & -14 & 1 & 0 \\ 0 & 11 & 10 & 2 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 6 & -1 \\ 0 & 11 & 10 & 2 \end{pmatrix}.$$

Multiplikation mit  $D^{-1}$  führt nun auf die Lösung. Dazu müssen wir die Zahlen 2 und 11 in  $\mathbb{F}_{29}$  invertieren. Wegen  $15 \cdot 2 = 30 = 1$  ist  $-14 = 2^{-1}$ . Um 11 zu invertieren, wird der euklidische Algorithmus (vgl. 1/2/26) mit den Zahlen 29 und 11 im Ring  $\mathbb{Z}$  ausgeführt, wobei der größte gemeinsame Teiler (d.h. die Zahl 1) als Vielfachensumme der Ausgangszahlen dargestellt wird. Wir setzen  $r_{-1} := f$  und  $r_0 := g$ . Für  $i > 0$  wird mit  $r_i$  der Rest bei der  $i$ -ten Division bezeichnet. Es ergibt sich die folgende Tabelle:

29 : 11 = 2 Rest 7	$r_{-1} - 2 \cdot r_0 = r_1$	$r_1 = f - 2g$
11 : 7 = 1 Rest 4	$r_0 - 1 \cdot r_1 = r_2$	$r_2 = -f + 3g$
7 : 4 = 1 Rest 3	$r_1 - 1 \cdot r_2 = r_3$	$r_3 = 2f - 5g$
4 : 3 = 1 Rest 1	$r_2 - 1 \cdot r_3 = r_4$	$r_4 = -3f + 8g$

Die erste Spalte enthält den euklidischen Algorithmus. In der zweiten Spalte sind die Regeln zur Bildung der letzten Spalte angegeben. Diese entsteht durch Einsetzen der bereits bekannten Ausdrücke und enthält die Darstellung der Reste als Vielfachensummen. So ergibt sich

$$1 = -3f + 8g.$$

In  $\mathbb{F}_{29}$  folgt (vgl. 1/2/29)

$$8 = 11^{-1}.$$

Multiplikation der zuletzt erhaltenen Matrix mit  $D^{-1}$  ergibt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & -7 & -13 \end{pmatrix},$$

daher

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 14 \\ -7 & -13 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/132

(S: Varianten)

Inverse Matrizen über Primkörpern (1)

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix, gaußscher Algorithmus, reguläre Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Invertieren Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 9 \\ 16 & 29 \end{pmatrix}$$

über dem endlichen Primkörper  $\mathbb{F}_{97}$ .

**Lösung.** Wir erhalten die inverse Matrix, indem wir beispielsweise  $(A, E_2)$  durch Zeilentransformationen äquivalent in eine Matrix  $(E_2, A')$  umformen. Ist dies möglich, so gilt  $A' = A^{-1}$ . Dabei werden wir unter Vermeidung von Divisionen zunächst eine Matrix  $(D, A'')$  erzeugen, wobei  $D$  eine Diagonalmatrix ist. Ausgehend von

$$\begin{pmatrix} 2 & 9 & 1 & 0 \\ 16 & 29 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich schrittweise

$$\begin{pmatrix} 2 & 9 & 1 & 0 \\ 0 & 11 & -16 & 2 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 2 & 0 & -39 & -18 \\ 0 & 11 & -16 & 2 \end{pmatrix}.$$

Multiplikation mit  $D^{-1}$  führt nun auf die Lösung. Dazu müssen wir die Zahlen 2 und 11 in  $\mathbb{F}_{97}$  invertieren. Wegen  $49 \cdot 2 = 98 = 1$  ist  $-48 = 2^{-1}$ . Um 11 zu invertieren, wird der euklidische Algorithmus (vgl. 1/2/26) mit den Zahlen 97 und 11 im Ring  $\mathbb{Z}$  ausgeführt, wobei der größte gemeinsame Teiler (d.h. die Zahl 1) als Vielfachensumme der Ausgangszahlen dargestellt wird. Wir setzen  $r_{-1} := f$  und  $r_0 := g$ . Für  $i > 0$  wird mit  $r_i$  der Rest bei der  $i$ -ten Division bezeichnet. Es ergibt sich die folgende Tabelle:

97 : 11 = 8 Rest 9	$r_{-1} - 8 \cdot r_0 = r_1$	$r_1 = f - 8g$
11 : 9 = 1 Rest 2	$r_0 - 1 \cdot r_1 = r_2$	$r_2 = -f + 9g$
9 : 2 = 4 Rest 1	$r_1 - 4 \cdot r_2 = r_3$	$r_3 = 5f - 44g$

Die erste Spalte enthält den euklidischen Algorithmus. In der zweiten Spalte sind die Regeln zur Bildung der letzten Spalte angegeben. Diese entsteht durch Einsetzen der bereits bekannten Ausdrücke und enthält die Darstellung der Reste als Vielfachensummen. So ergibt sich

$$1 = 5f - 44g.$$

In  $\mathbb{F}_{97}$  ergibt sich (vgl. 1/2/29)

$$-44 = 11^{-1}.$$

Multiplikation der zuletzt gefundenen Matrix mit  $D^{-1}$  ergibt

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 29 & -9 \\ 0 & 1 & 25 & 9 \end{pmatrix},$$

daher

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 29 & -9 \\ 25 & 9 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/133

(S: Varianten)

Inverse Matrizen über Primkörpern (2)

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix, gaußscher Algorithmus, reguläre Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Invertieren Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & -1 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

über dem endlichen Primkörper  $\mathbb{F}_5$ .

**Lösung.** Wir erhalten die inverse Matrix, indem wir beispielsweise  $(A, E_3)$  durch Zeilentransformationen äquivalent in eine Matrix  $(E_3, A')$  umformen. Ist dies möglich, so ist  $A$  invertierbar und es gilt  $A^{-1} = A'$ . Dabei werden wir unter Vermeidung von Divisionen zunächst eine Matrix  $(D, A'')$  erzeugen, wobei  $D$  eine Diagonalmatrix ist. Ausgehend von

$$(A, E_3) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ergibt sich zunächst mit dem gaußschen Algorithmus

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Analog erhalten wir (mit der letzten Spalte beginnend) Nullen oberhalb der Einträge mit Index  $(i, i)$  durch die Umformungen

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Multiplikation von links mit

$$D^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \text{ ergibt } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Daher ist

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/140

(S: Varianten)

Inverse Matrizen, Beispiele mit 3 Parametern

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Bestimmen Sie jeweils die inverse Matrix, sofern diese existiert.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{R}),$$

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 1 & 0 & c \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R}) \text{ für } a, b, c \in \mathbb{R}.$$

**Ergebnis.**

$$(1) \quad A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{R}).$$

(2) Für  $a \cdot b \cdot c = 0$  ist die Matrix  $B$  nicht invertierbar. Anderenfalls erhalten wir

$$B^{-1} = \frac{1}{abc} \cdot \begin{pmatrix} bc & 0 & 0 \\ 0 & ac & 0 \\ -b & 0 & ab \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/150

(S: Varianten)

Inverse Matrizen, Beispiele mit einem Parameter

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Für welche Zahlen  $a \in \mathbb{R}$  existiert die Inverse der folgenden Matrix  $A$ ? Geben Sie in diesem Fall  $A^{-1}$  an.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -(a-2) & 0 \\ 6 & -(a-2) & -2 \\ -6 & (3a-6) & -4 \end{pmatrix}$$

**Ergebnis.**  $A$  ist zeilenäquivalent zur Matrix

$$\begin{pmatrix} 3-(a-2) & 0 \\ 0 & (a-2) & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Daraus folgt für  $a = 2$ , dass  $A$  nicht invertierbar ist. Im Fall  $a \neq 2$  ergibt sich

$$A^{-1} = \frac{1}{(-6a+12)} \begin{pmatrix} (10a-20) - (4a-8)(2a-4) \\ 36 & -12 & 6 \\ (12a-24) - (3a-6)(3a-6) \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 2/3/160

(S: Varianten)

Eigenschaften und Beispiele invertierbarer Matrizen

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Wir untersuchen Eigenschaften von Matrizen:

- (1) Zeigen Sie, dass eine Matrix  $A \in M(n; K)$ , in der eine Zeile oder eine Spalte nur aus Nullen besteht, nicht invertierbar sein kann.
- (2) Geben Sie ein Beispiel einer nicht invertierbaren Matrix  $A$  an, in der keine Zeile und keine Spalte nur aus Nullen besteht.
- (3) Für welche  $t \in \mathbf{C}$  ist die folgende Matrix  $A$  invertierbar? Geben Sie in diesem Fall die Inverse von  $A$  an,

$$A = \begin{pmatrix} t & t & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & t & 1 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.** Wir geben das Resultat für (3) an.

1. Fall,  $t = 0$ :  $A$  ist nicht invertierbar.

2. Fall,  $t \neq 0$ :  $A^{-1} = \frac{1}{t} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & t & 1 \\ t & -t^2 & 0 \end{pmatrix}.$

### Aufgabe 2/3/170

Bestimmung der Inversen spezieller invertierbarer Matrizen

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix, Diagonalmatrix, Permutationsmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

Zeigen Sie, dass die folgenden Matrizen invertierbar sind und berechnen Sie die Inversen.

- (1)  $A$  sei die Diagonalmatrix

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{pmatrix}$$

mit  $a_i \in K$  und  $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \neq 0$ .

(2)  $B$  sei die Permutationsmatrix

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Verallgemeinern Sie überdies das Resultat von (2) auf beliebige Permutationsmatrizen.

**Aufgabe 2/3/180**

Inverse Matrizen, Beispiele mit 3 Parametern

**Index:** invertierbare Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/6 - 2/3/9 Die allgemeine lineare Gruppe

$K$  sei ein Körper. Bestimmen Sie die Inversen der folgenden Matrizen

(1)  $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in M(2; K),$

(2)  $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in M(2; K), (a, c \neq 0)$

(3)  $\begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M(3; K).$

**Hinweis.** Die oberen Dreiecksmatrizen mit von Null verschiedenen Elementen auf der Hauptdiagonale bilden eine Untergruppe von  $GL(n; K)$ .

**Aufgabe 2/3/190**

(S: Varianten)

Hill-Ciphern (1)

**Index:** Hill-Ciphern, Matrizenmultiplikation, reguläre Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/10 Beispiel: Hill - Ciphern

Eine Nachricht wird in der folgenden Weise verschlüsselt, indem zunächst Buchstaben auf Elemente des Primkörpers  $\mathbb{F}_{29}$  abgebildet werden.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	-	,	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Die entstandenen Ziffern werden als Folge von Zahlenpaaren angeordnet (wobei ggf. am Ende der Nachricht ein Leerzeichen einzufügen ist, damit eine gerade Anzahl von Buchstaben entsteht). Nun bezeichne  $A$  eine reguläre Matrix aus  $M(2; \mathbb{F}_{29})$ ; die zugehörige Abbildung  $\mathbb{F}_{29}^2 \rightarrow \mathbb{F}_{29}^2$  bildet die Paare der Folge auf neue Paare ab.

Als verschlüsselte Nachricht bezeichnen wir denjenigen Text, der der Folge der Bilder der Zahlenpaare entspricht.

Verschlüsseln Sie die Nachricht „MITTWOCH-EMIL“ unter Verwendung der Matrix  $A = \begin{pmatrix} -11 & -14 \\ -9 & -6 \end{pmatrix}$ .

**Lösung.** Zunächst stellen wir die Zuordnung der Buchstaben zu den Elementen von  $\mathbb{F}_{29}$  her und erhalten die folgende Liste von Paaren

$$(12, 8), (19, 19), (22, 14), (2, 7), (26, 4), (12, 8), (11, 28).$$

Durch Multiplikation der Transponierten der Paare  $p$  mit der Matrix  $A$ , d.h. durch  ${}^t p \mapsto A \cdot {}^t p$  erhalten wir die gesuchten Bilder, das erste entsteht beispielsweise durch

$$\begin{pmatrix} 12 \\ 8 \end{pmatrix} \mapsto A \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 \\ 18 \end{pmatrix}.$$

Die Resultate werden wiederum als Liste von Paaren aus  $\mathbb{F}_{29}^2$  angeordnet; es ergibt sich

$$(17, 18), (18, 5), (26, 8), (25, 27), (6, 3), (17, 18), (9, 23).$$

Wir stellen gemäß der Tabelle die Zuordnung zu den Buchstaben her und erhalten die verschlüsselte Nachricht

„RSSF-IZ,GDRSJX“.

**Aufgabe** 2/3/200

(S: Varianten)

Hill-Ciphern (2)

**Index:** Hill-Ciphern, Matrizenmultiplikation, reguläre Matrix, inverse Matrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/10 **Beispiel:** Hill - Ciphern

Eine Nachricht wird in der folgenden Weise verschlüsselt, indem zunächst Buchstaben auf Elemente des Primkörpers  $\mathbb{F}_{29}$  abgebildet werden.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	-	,	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Die entstandenen Ziffern werden als Folge von Zahlenpaaren angeordnet (wobei ggf. am Ende der Nachricht ein Leerzeichen einzufügen ist, damit eine gerade Anzahl von Buchstaben entsteht). Nun bezeichne  $A$  eine reguläre Matrix aus  $M(2; \mathbb{F}_{29})$ ; die zugehörige Abbildung  $\mathbb{F}_{29}^2 \rightarrow \mathbb{F}_{29}^2$  bildet die Paare der Folge auf neue Paare ab.

Als verschlüsselte Nachricht bezeichnen wir denjenigen Text, der der Folge der Bilder der Zahlenpaare entspricht.

Eine Nachricht wurde unter Verwendung der Matrix  $A = \begin{pmatrix} 2 & -10 \\ -4 & -12 \end{pmatrix}$  verschlüsselt und lautet jetzt „DLYL IMGOREY“. Finden Sie die Nachricht.

**Lösung.** Zunächst stellen wir die Zuordnung der Buchstaben zu den Elementen von  $\mathbb{F}_{29}$  her und erhalten die folgende Liste von Paaren

$$(3, 11), (24, 11), (28, 8), (12, 6), (14, 17), (4, 24).$$

Durch Multiplikation der Transponierten der Paare  $p$  mit der Matrix

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 9 & -10 \end{pmatrix},$$

d.h. durch  ${}^t p \mapsto A^{-1} \cdot {}^t p$  erhalten wir die gesuchten Urbilder, das erste entsteht beispielsweise durch

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 11 \end{pmatrix} \mapsto A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Die Resultate werden wiederum als Liste von Paaren aus  $\mathbb{F}_{29}^2$  angeordnet; es ergibt sich

$$(7, 4), (20, 19), (4, 27), (14, 19), (19, 14), (26, 28).$$

Wir stellen gemäß der Tabelle die Zuordnung zu den Buchstaben her und erhalten die unverschlüsselte Nachricht

„HEUTE,OTTO-“.

### Aufgabe 2/3/240

(S: Varianten)

Gauß-Bruhat-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$

**Index:** Gauß-Bruhat-Zerlegung, Permutationsmatrix, Dreiecksmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/16 - 2/3/18 LR-Zerlegung und Gauß-Bruhat-Zerlegung

- (1) Finden Sie die Gauß-Bruhat Zerlegung der Matrix  $A$ , d. h. bestimmen Sie eine Permutationsmatrix  $P$  und eine obere Dreiecksmatrix  $Q$  mit Einsen auf der Hauptdiagonale, so dass  $A = Q \cdot P \cdot A'$  gilt mit einer oberen Dreiecksmatrix  $A'$ . Dabei ist

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \\ 1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

- (2) Bestimmen Sie die entsprechende Zerlegung für

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M(2; \mathbb{R}) \quad \text{mit } ad \neq bc \text{ und } c \neq 0.$$

**Ergebnis.** Wir geben die Zerlegung im Fall (1) an:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{4} & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{23}{2} \end{pmatrix}$$

### Aufgabe 2/3/250

(S: Varianten)

LR-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$

**Index:** LR-Zerlegung, Permutationsmatrix, Dreiecksmatrix

**Stoffeinheiten:** 2/3/16 - 2/3/18 LR-Zerlegung und Gauß-Bruhat-Zerlegung

Finden Sie die LR-Zerlegung für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**  $A$  ergibt sich als das folgende Produkt:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe** 2/4/005

(S: Varianten)

Division mit Rest für Polynome (1)

**Index:** Division mit Rest

**Stoffeinheiten:** 2/4/1 - 2/4/4 Der euklidische Algorithmus

Gegeben sind die Polynome

$$f = -18X^3 + 3X^2 - 7 \quad \text{und} \quad g = -6X^2 + 3X - 1$$

in  $\mathbb{R}[X]$ . Dividieren Sie  $f$  durch  $g$  mit Rest, d.h. ermitteln Sie Polynome  $q$  und  $r$ , die den Bedingungen

$$f = g \cdot q + r, \quad \deg(g) > \deg(r).$$

genügen.

**Lösung.** Wir schreiben den Lösungsweg in üblicher Weise auf:

$$\begin{array}{r} (-18X^3 + 3X^2 - 7) : (-6X^2 + 3X - 1) = 3X + 1 \text{ Rest } -6 \\ \underline{-18X^3 + 9X^2 - 3X} \quad | - \\ \phantom{-18X^3} -6X^2 + 3X - 7 \\ \underline{-6X^2 + 3X - 1} \quad | - \\ \phantom{-18X^3} \phantom{-6X^2} -6 \end{array}$$

**Aufgabe** 2/4/006

(S: Varianten)

Division mit Rest, ausführliche Darstellung (2)

**Index:** Division mit Rest

**Stoffeinheiten:** 2/4/1 - 2/4/4 Der euklidische Algorithmus

Gegeben sind die Polynome

$$f = -72X^3 - 109X^2 + 14 \quad \text{und} \quad g = -9X^2 - 8X + 1$$

in  $\mathbb{R}[X]$ . Dividieren Sie  $f$  durch  $g$  mit Rest, d.h. ermitteln Sie Polynome  $q$  und  $r$ , die den Bedingungen

$$f = g \cdot q + r, \quad \deg(g) > \deg(r).$$

genügen.

**Lösung.** So wie wir in der Schule die Division mit Rest gelernt haben, schreiben wir unseren Lösungsweg in üblicher Weise auf:

$$\begin{array}{r} (-72X^3 - 109X^2 + 14) : (-9X^2 - 8X + 1) = 8X + 5 \text{ Rest } 32X + 9 \\ \underline{-72X^3 - 64X^2 + 8X} \quad | - \\ \phantom{-72X^3} -45X^2 - 8X + 14 \\ \underline{-45X^2 - 40X + 5} \quad | - \\ \phantom{-72X^3} \phantom{-45X^2} 32X + 9 \end{array}$$

Wer das verstanden hat, ist eigentlich fertig.

Nun soll ausführlich erläutert werden, was mit der obigen Schreibweise gemeint ist; wir geben eine exakte Beschreibung des Algorithmus und üben gleichzeitig den Umgang mit den Begriffen „Leitern“ und „S-Polynom“ (vgl. 2/4/1). Tatsächlich ist es möglich, das Verfahren in einem wohlverstandenen Sinn sogar auf Polynome mehrerer Variabler zu übertragen (vgl. 2/5/14).

$LT(p)$  bezeichnet (wie immer) den Leitern eines Polynoms  $p$ . Im Polynomring einer Unbestimmten können mit seiner Hilfe für Polynome  $f$  und  $g$  mit  $\deg(f) \geq \deg(g)$  der Leiternquotient

$$LQ(f, g) := \frac{LT(f)}{LT(g)}$$

sowie das S-Polynom

$$S(f, g) = f - LQ(f, g) \cdot g$$

gebildet werden. Im Fall  $\deg(f) > 0$  hat das S-Polynom die Eigenschaft  $\deg(S(f, g)) < \deg(f)$ . Die Division mit Rest ist damit das folgende Verfahren:

$$r := f, q := 0,$$

**Berechne** {

$$q := q + LQ(r, g),$$

$$r := S(r, g),$$

} **solange**  $(\deg(r) \geq \deg(g))$ .

Für die Polynome unserer Aufgabe stellen wir dies in einer Tabelle zusammen:

$r$	$q$	$LQ(r, g)$	$LQ(r, g) \cdot g$
$-72X^3 - 109X^2 + 14$	$8X$	$8X$	$-72X^3 - 64X^2 + 8X$
$-45X^2 - 8X + 14$	$8X + 5$	$5$	$-45X^2 - 40X + 5$
$32X + 9$			

Das Ergebnis ist

$$r = 32X + 9, q = 8X + 5,$$

d.h. es gilt (wie eingangs behauptet)

$$(-72X^3 - 109X^2 + 14) : (-9X^2 - 8X + 1) = 8X + 5 \text{ Rest } 32X + 9.$$

### Aufgabe 2/4/007

(S: Varianten)

Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (1)

**Index:** größter gemeinsamer Teiler für Polynome, Division mit Rest, Kettendivision, euklidischer Algorithmus

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Gegeben sind die Polynome

$$f = -18X^4 - 27X^3 + 11X^2 + 39X + 21 \quad \text{und}$$

$$g = 18X^3 + 45X^2 + 40X + 14$$

in  $\mathbb{R}[X]$ . Ermitteln Sie ihren größten gemeinsamen Teiler.

**Lösung.**  $\text{LT}(p)$  bezeichnet (wie immer) den Leitterm eines Polynoms  $p$ . Im Polynomring einer Unbestimmten kann mit seiner Hilfe für Polynome  $f$  und  $g$  mit  $\deg(f) \geq \deg(g)$  der Leittermquotient

$$\text{LQ}(f, g) := \frac{\text{LT}(f)}{\text{LT}(g)}$$

sowie das S-Polynom

$$S(f, g) = f - \text{LQ}(f, g) \cdot g$$

gebildet werden (vgl. 2/4/1). Im Fall  $\deg(f) > 0$  hat das S-Polynom die Eigenschaft  $\deg(S(f, g)) < \deg(f)$ .

Damit kann der euklidische Algorithmus für Polynome in der folgenden Weise formuliert werden:

$$r_1 := f, r_2 := g,$$

**Berechne** {

$$r_1 := S(r_1, r_2),$$

**falls** ( $\deg(r_1) < \deg(r_2)$ ) vertausche  $r_1$  und  $r_2$ ,

**}** **solange** ( $r_2 \neq 0$ ).

Das letzte Polynom  $r_2$ , mit dem reduziert wurde, ist ein größter gemeinsamer Teiler der Ausgangspolynome  $f$  und  $g$ .

Für die Polynome unserer Aufgabe stellen wir dies in einer Tabelle zusammen:

$r_1$	$\text{LQ}(r_1, r_2) \cdot r_2$
$-18X^4 - 27X^3 + 11X^2 + 39X + 21$ $18X^3 + 51X^2 + 53X + 21$ $6X^2 + 13X + 7$	$-X \cdot (18X^3 + 45X^2 + 40X + 14)$ $1 \cdot (18X^3 + 45X^2 + 40X + 14)$
$18X^3 + 45X^2 + 40X + 14$ $6X^2 + 19X + 14$ $6X + 7$	$3X \cdot (6X^2 + 13X + 7)$ $1 \cdot (6X^2 + 13X + 7)$
$6X^2 + 13X + 7$ $6X + 7$ $0$	$X \cdot (6X + 7)$ $1 \cdot (6X + 7)$

Daher ist das assoziierte normierte Polynom  $\text{ggT}(f, g) = X + \frac{7}{6}$  der gesuchte größte gemeinsame Teiler.

**Aufgabe** 2/4/010

(S: Varianten)

Division mit Rest für Polynome (3)

**Index:** Division mit Rest

**Stoffeinheiten:** 2/4/1 - 2/4/4 Der euklidische Algorithmus

Führen Sie in den angegebenen Polynomringen die Division mit Rest für die folgenden Paare  $(f, g)$  von Polynomen aus.

- (1)  $f = -3X^6 + X^2 - 2X + 1$ ,  $g = X^4 + 2X^2 - X - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ ,  
 (2)  $f = \sqrt{2}X^4 + (1 + \sqrt{6})X^3 + (\sqrt{3} - 2\sqrt{2})X^2 - X - \sqrt{3}$ ,  
 $g = X^2 + \sqrt{3}X - 2 \in \mathbb{R}[X]$ ,  
 (3)  $f = -X^5 + X^4 - X^3 + X^2 - X$ ,  $g = -X^3 + X^2 - X + 1 \in \mathbb{F}_3[X]$ .

**Ergebnis.** Wir erhalten  $f = qg + r$  mit Polynomen  $q$  und  $r$ :

- (1)  $q = -3X^2 + 6$ ,  $r = -3X^3 - 14X^2 + 4X + 7$ ,  
 (2)  $q = \sqrt{2}X^2 + X$ ,  $r = X - \sqrt{3}$ ,  
 (3)  $q = X^2$ ,  $r = -X$ .

**Aufgabe 2/4/020**

(S: Varianten)

Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (2)

**Index:** größter gemeinsamer Teiler für Polynome, Division mit Rest, Kettendivision, euklidischer Algorithmus

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Bestimmen Sie den größten gemeinsamen Teiler der Polynome

$$f = X^4 + 5X^3 + 5X^2 + 5X + 4,$$

$$g = X^6 + 12X^5 + 19X^4 - 5X^3 + 48X^2 - 17X + 30$$

aus  $K[X]$ , falls  $K$  einer der folgenden Körper ist:

- (1)  $K = \mathbb{R}$ ,  
 (2)  $K = \mathbb{F}_3$ ,  
 (3)  $K = \mathbb{F}_2$ .

**Ergebnis.** Als größte gemeinsame Teiler erhalten wir

- (1)  $\text{ggT}(f, g) = X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ ,  
 (2)  $\text{ggT}(f, g) = X^4 - X^3 - X^2 - X + 1 \in \mathbb{F}_3[X]$ ,  
 (3)  $\text{ggT}(f, g) = X^4 + X^3 + X^2 + X \in \mathbb{F}_2[X]$ .

**Aufgabe 2/4/030**

(S: Varianten)

Der größte gemeinsame Teiler in Abhängigkeit von Parametern

**Index:** größter gemeinsamer Teiler für Polynome, Division mit Rest, Kettendivision

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Für welche Zahlen  $t \in \mathbb{R}$  besitzen die Polynome

$$f = 4X^4 + (2t + 2)X^3 - (6t + 8)X^2 + (4t - 1)X + 1,$$

$$g = -2X^3 - (t + 3)X^2 + (2t + 1)X + 2$$

aus dem Ring  $\mathbb{R}[X]$  einen nichttrivialen gemeinsamen Teiler?

**Lösung.** Wir führen den euklidischen Algorithmus für  $f$  und  $g$  aus; als erste Reste ergeben sich

$$r_1 = X - 3 \quad \text{und} \quad r_2 = -(3t + 76).$$

$r_2(t) = 0$  ist hier (wegen  $\deg_X(r_2(t)) \leq 0$ ) notwendig und hinreichend dafür, dass  $r_1$  größter gemeinsamer Teiler der Polynome  $f$  und  $g$  ist, anderenfalls gilt  $\text{ggT}(f, g) = 1$ . Die Bedingung für die Existenz eines nichttrivialen gemeinsamen Teilers lautet daher  $3t + 76 = 0$ .

**Aufgabe 2/4/040**

(S: Varianten)

Nullstellenbestimmung mit Hilfe des euklidischen Algorithmus

**Index:** größter gemeinsamer Teiler für Polynome, Division mit Rest, Kettendivision, Nullstellenmenge

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Es seien  $f_1, f_2, \dots, f_n \in K[X]$  Polynome und  $d \in K[X]$  ihr größter gemeinsamer Teiler. Beweisen Sie, dass  $V(\{f_1, f_2, \dots, f_n\}) = V(\{d\})$  ist und verwenden Sie diese Eigenschaft zur Berechnung der folgenden Nullstellenmengen.

- (1)  $V(\{2X^6 + 5X^4 - 5X^3 + 4X^2 + X + 3, X^5 + 3X^3 + 5X + 6\}) \subseteq \mathbb{R}$ ,
- (2)  $V(\{3X^4 - 4X^3 - 12X^2 - 8X - 3, 9X^5 - 15X^4 - 38X^3 + 2X^2 + 9X + 9, 9X^4 + 12X^3 - 2X^2 - 4X - 3\}) \subseteq \mathbb{C}$ ,
- (3)  $V(\{X^6 + X^5 + 2X^4 + X^3 + X^2 + 2X, X^7 + X^5 + 2X^4 + X^3 - X\}) \subseteq \mathbb{F}_5$ .

**Hinweise zur Lösung.**

- (1) Als Nullstellenmenge ergibt sich  $V(\{X^2 + X + 3\})$  und aus den leicht zu bestimmenden Nullstellen des Polynoms das Resultat.
- (2) Die Nullstellenmenge ist  $V(\{3X^3 - 7X^2 - 5X - 3, 9X^4 + 12X^3 - 2X^2 - 4X - 3\}) = V(\{3X^2 + 2X + 1\})$ ; das zuletzt gefundene Polynom ist wiederum leicht zu faktorisieren.
- (3) Die Nullstellenmenge ist  $V(\{2X^4 - X^3 + X^2 - X\}) = \{0, 4\}$ .

**Aufgabe 2/4/050**

(S: Varianten)

Nullstellen rationaler Polynome

**Index:** größter gemeinsamer Teiler für Polynome, Division mit Rest, Kettendivision, Nullstellenmenge

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Wir bezeichnen mit  $f = a_0X^n + a_1X^{n-1} + \dots + a_{n-1}X + a_n$  ein Polynom aus  $\mathbb{Q}[X]$ , das ganzzahlige Koeffizienten  $a_i$  hat. Es sei  $\alpha \in \mathbb{Q}$  eine Nullstelle von  $f$ . Angenommen  $\alpha = \frac{a}{b}$  mit  $a, b \in \mathbb{Z}$  und  $(a, b) = 1$ .

- (1) Zeigen Sie:  $a \mid a_n$  und  $b \mid a_0$ .
- (2) Benutzen Sie diese Eigenschaft zur Bestimmung aller Nullstellen des Polynoms  $f = 15X^5 - 23X^4 - 26X^3 - 14X^2 + 84X - 16$  im Körper der komplexen Zahlen.

**Hinweis zur Lösung.**

Wir finden die rationalen Nullstellen  $2, \frac{1}{5}$  und  $\frac{4}{3}$  für  $f$  und damit

$$f = (3X - 4)(X - 2)(5X - 1)(X^2 + 2X + 2).$$

Der letzte Faktor besitzt ein Paar konjugiert komplexer Nullstellen, die leicht angegeben werden können.

**Aufgabe 2/4/070**

(S: Varianten)

Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme

**Index:** größter gemeinsamer Teiler für Polynome, euklidischer Algorithmus, Division mit Rest, Kettendivision

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Finden Sie für die folgenden Paare  $(f, g)$  reeller Polynome den größten gemeinsamen Teiler  $d$ , sowie Polynome  $u, v$  mit der Eigenschaft  $d = fu + gv$ .

$$(1) \quad f = X^3 + 2X^2 + 2X + 1, \quad g = X^3 + X^2 + 3X + 1,$$

$$(2) \quad f = X^4 + 4X^3 + 4X^2 + 7X - 6, \quad g = X^5 + 5X^4 + 6X^3 + 3X^2 - X - 2.$$

**Ergebnis.**

$$(1) \quad 1 = f \cdot \left(\frac{5}{6}X^2 + \frac{2}{3}X + \frac{13}{6}\right) + g \cdot \left(-\frac{5}{6}X^2 - \frac{3}{2}X - \frac{7}{6}\right),$$

$$(2) \quad 3X^2 + 9X - 6 = f \cdot \left(-\frac{1}{2}X^2 - \frac{1}{2}X + 1\right) + g \cdot \left(\frac{1}{2}X\right).$$

**Aufgabe 2/4/080**

(S: Varianten)

Faktorzerlegung von Polynomen

**Index:** irreduzibles Polynom, Zerlegung in irreduzible Faktoren

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Bestimmen Sie die Zerlegung von  $f = X^4 + 2X^3 - 7X^2 - 4X + 4$  in irreduzible Faktoren, wenn  $f$  als Polynom über dem jeweils angegebenen Körper  $K$  betrachtet wird.

$$(1) \quad K = \mathbb{Q},$$

$$(2) \quad K = \mathbb{R},$$

$$(3) \quad K = \mathbb{C},$$

$$(4) \quad K = \mathbb{F}_2,$$

$$(5) \quad K = \mathbb{F}_3.$$

**Ergebnis.**

$$(1) \quad f = (X^2 + 3X - 2) \cdot (X + 1) \cdot (X - 2).$$

(2) Unter (1) ist noch  $X^2 + 3X - 2$  in Linearfaktoren zu zerlegen.

(3) Die Zerlegung ist dieselbe wie unter (2).

$$(4) \quad f = (X + 1)^2 \cdot X^2.$$

$$(5) \quad f = (X^2 + 1) \cdot (X + 1)^2.$$

**Aufgabe 2/4/090**Irreduzible Polynome über dem Primkörper  $\mathbb{F}_2$ **Index:** irreduzibles Polynom**Stoffeinheiten:** [2/4/5](#) - [2/4/14](#) Nullstellen und Faktorzerlegung

Bestimmen Sie alle irreduzible Polynome vom Grad 2 bzw. 3 aus  $\mathbb{F}_2[X]$ . Wieviele irreduzible Polynome vom Grad 4 gibt es über  $\mathbb{F}_2$ ?

**Aufgabe 2/4/100**

(S: Varianten)

Faktorzerlegung von Polynomen über  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{F}_p$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{R}$ **Index:** Zerlegung in irreduzible Faktoren, irreduzibles Polynom**Stoffeinheiten:** [2/4/5](#) - [2/4/14](#) Nullstellen und Faktorzerlegung

Wir betrachten die folgenden Polynome aus den Polynomringen über den angegebenen Körpern. Zerlegen Sie diese in irreduzible Faktoren.

- (1)  $3X^3 - X^2 - 2X + 3 \in \mathbb{Q}[X]$ ,
- (2)  $X^4 + X^3 + X^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$ ,
- (3)  $2X^5 - 7X^4 - 2X^3 - 6X^2 - 12X + 16 \in \mathbb{C}[X]$ ,
- (4)  $X^5 - 4X^3 - 5X^2 + 20 \in \mathbb{R}[X]$ ,
- (5)\*  $X^{p-1} - 1 \in \mathbb{F}_p[X]$  ( $p$  bezeichnet eine Primzahl).

**Hinweise zur Lösung.** Mit  $f$  bezeichnen wir das jeweilige Polynom.

- (1)  $f$  ist unzerlegbar.
- (2)  $f = (X^3 + X + 1) \cdot (X + 1)$ .
- (3)  $f = (X^2 + 2) \cdot (2X^2 + X - 2) \cdot (X - 4)$ ; die Zerlegung in Linearfaktoren ist nun offensichtlich.
- (4)  $f = (X^3 - 5) \cdot (X - 2) \cdot (X + 2)$ ; damit wird ersichtlich, wie weiter vorzugehen ist.
- (5)  $f = (X - 1) \cdot (X - 2) \cdot \dots \cdot (X - (p - 1))$ .

**Aufgabe 2/4/105**

(S: Varianten)

Irrationalität von Quadratwurzeln

**Index:** rationale Zahl, Teilbarkeit, Hauptsatz der Arithmetik**Stoffeinheiten:** [2/4/5](#) - [2/4/14](#) Nullstellen und FaktorzerlegungZeigen Sie: Die Zahl  $35 \in \mathbb{N}$  besitzt keine rationale Wurzel.

**Lösung.** Wegen  $25 < 35 < 36$  gilt  $5 < \sqrt{35} < 6$ , d.h. die Wurzel ist keine ganze Zahl. Angenommen, die Wurzel ist rational, so können Zähler und Nenner teilerfremd angenommen werden mit einem Nenner ungleich 1. Diese Eigenschaft bleibt für das Quadrat dieser Zahl erhalten, was aus der eindeutigen Zerlegung jeder ganzen Zahl in Primfaktoren folgt. Das ist ein Widerspruch, denn 35 ist ganz.

**Aufgabe 2/4/110**

Eisenstein-Kriterium

**Index:** irreduzibles Polynom

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Es seien  $f = X^n + a_1X^{n-1} + \dots + a_{n-1}X + a_n \in \mathbb{Z}[X]$  ein Polynom und  $p \in \mathbb{Z}$  eine Primzahl mit den folgenden Eigenschaften:

- (1)  $p \mid a_i$  für alle  $i$ ,
- (2)  $p^2 \nmid a_n$ .

Dann ist  $f$  irreduzibel als Polynom aus  $\mathbb{Q}[X]$  (*Eisenstein-Kriterium*).

**Aufgabe 2/4/120**

Irreduzibilität von Polynomen in  $\mathbb{Q}[X]$

**Index:** irreduzibles Polynom

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

$p$  sei eine Primzahl. Zeigen Sie, dass  $X^{p-1} + X^{p-2} + \dots + X + 1 \in \mathbb{Q}[X]$  irreduzibel ist.

**Hinweis.** Verwenden Sie das Eisenstein-Kriterium.

**Aufgabe 2/4/130**

Zerfällungskörper von  $X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$

**Index:** Zerfällungskörper

**Stoffeinheiten:** 2/4/15 - 2/4/21 Endliche algebraische Körpererweiterungen

Es sei  $\omega = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$  (dann ist  $\omega^3 = 1$  und  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ ). Zeigen Sie, dass der Erweiterungskörper  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega] = (\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}])[\omega]$  von  $\mathbb{Q}$  die folgenden Eigenschaften besitzt:

- (1) Alle Nullstellen von  $X^3 - 2$  liegen in  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega]$ .
- (2)  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega]$  ist der kleinste Erweiterungskörper mit der Eigenschaft (1), d.h.  $\mathbb{Q}[\sqrt[3]{2}, \omega]$  ist Zerfällungskörper von  $X^3 - 2$ .

**Aufgabe 2/4/140**

Konstruktion eines 9-elementigen Körpers

**Index:** irreduzibles Polynom, Nullstelle eines Polynoms

**Stoffeinheiten:** 2/4/5 - 2/4/14 Nullstellen und Faktorzerlegung

Zeigen Sie, dass das Polynom  $p = X^2 + X + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$  irreduzibel ist. Beschreiben Sie  $\mathbb{F}_2[X]/(p(X))$  durch Angabe der Additions- und Multiplikationstabellen.

**Aufgabe 2/4/150**

Konstruktion endlicher Körper

**Index:** irreduzibles Polynom, Zerfällungskörper

**Stoffeinheiten:** 2/4/15 - 2/4/21 Endliche algebraische Körpererweiterungen

Es sei  $p \in \mathbb{Z}$  eine Primzahl und  $f \in \mathbb{F}_p[X]$  ein irreduzibles Polynom vom Grad  $n$ . Zeigen Sie, dass  $\mathbb{F}_p[X]/(f(X))$  ein Körper mit  $p^n$  Elementen ist. Geben Sie insbesondere ein Beispiel für einen Körper mit 9 Elementen an.

**Aufgabe 2/5/010**

(S: Varianten)

Matrixordnungen (1)

**Index:** Monomordnung, Matrixordnung**Stoffeinheiten:** 2/5/8 - 2/5/16 Monomordnungen und Division mit Rest

Wir betrachten die Matrixordnungen  $<_A$  und  $<_B$  für Monome in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , die durch

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & -6 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -6 \\ 4 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

gegeben sind. Welche dieser Matrixordnungen ist keine Monomordnung? Finden Sie in diesem Fall ein Monom kleiner als 1.

**Lösung.** Offensichtlich ist  $<_B$  keine Monomordnung und  $X_3 <_B 1$ .

Im anderen Fall liegt eine Monomordnung vor, denn die Matrix  $A$  hat den Rang 3 und enthält als ersten (von 0 verschiedenen) Eintrag in jeder Spalte eine positive Zahl.

**Aufgabe 2/5/020**

(S: Varianten)

Matrixordnungen (2)

**Index:** Monomordnung, Matrixordnung**Stoffeinheiten:** 2/5/8 - 2/5/16 Monomordnungen und Division mit Rest

Wir betrachten die Monomordnung  $<_A$  für  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Ordnen Sie die Menge

$$M = \{X_1^2, X_1X_2, X_1X_3, X_2^2, X_2X_3, X_3^2\}$$

bezüglich  $<_A$ .

**Lösung.** Offensichtlich ist  $A$  regulär und enthält insbesondere in der ersten Zeile nur positive Einträge; daher wird durch diese Matrix tatsächlich eine Monomordnung definiert. Für ein beliebiges Monom  $q = X_1^{u_1} X_2^{u_2} X_3^{u_3}$  bilden wir  $p = X_1^{v_1} X_2^{v_2} X_3^{v_3}$ , wobei  $v_1, v_2, v_3$  durch

$$(v_1 \ v_2 \ v_3) = A \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

gegeben sind.  $f$  sei die Abbildung  $q \mapsto p$  der Menge der Monome aus  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$  in sich. Sie ist bijektiv, da  $A$  regulär ist. Wir bestimmen nun die lexikographische Ordnung der Menge  $N := f(M)$ ,

$$N = \{X_1^2 X_2^{10} X_3^2, X_1^4 X_2^9 X_3^2, X_1^6 X_2^8 X_3^2, X_1^5 X_2^5 X_3, X_1^7 X_2^4 X_3, X_1^8\}.$$

Das größte Monom in  $N$  ist  $X_1^8$ .

Das bedeutet, dass  $X_3^2 = f^{-1}(X_1^8)$  das größte Monom von  $M$  bezüglich  $<_A$  ist. Entsprechend erhalten wir die Anordnung aller Monome bezüglich  $<_A$ ; es ergibt sich

$$X_3^2 > X_2X_3 > X_2^2 > X_1X_3 > X_1X_2 > X_1^2.$$

**Aufgabe** 2/5/030

(S: Varianten)

Matrixordnungen (3)

**Index:** Monomordnung, Matrixordnung

**Stoffeinheiten:** 2/5/8 - 2/5/16 Monomordnungen und Division mit Rest

Wir betrachten die Monomordnung  $<_A$  für  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Ordnen Sie die Menge

$$M = \{X_1^3X_2, X_1X_2X_3^2, X_1X_2^2X_3, X_1^2X_3, X_2X_3^3, X_1^2X_2X_3^2\}$$

bezüglich  $<_A$ .

**Lösung.** Offensichtlich ist  $A$  regulär und enthält insbesondere in der ersten Zeile nur positive Einträge; daher wird durch diese Matrix tatsächlich eine Monomordnung definiert. Für ein beliebiges Monom  $q = X_1^{u_1}X_2^{u_2}X_3^{u_3}$  bilden wir  $p = X_1^{v_1}X_2^{v_2}X_3^{v_3}$ , wobei  $v_1, v_2, v_3$  durch

$$(v_1 \ v_2 \ v_3) = A \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}$$

gegeben sind.  $f$  sei die Abbildung  $q \mapsto p$  der Menge der Monome aus  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$  in sich. Sie ist bijektiv, da  $A$  regulär ist. Wir bestimmen nun die lexikographische Ordnung der Menge  $N := f(M)$ ,

$$N = \{X_1^9X_2^4X_3^3, X_1^9X_2^6X_3^7, X_1^{10}X_2^5X_3^4, X_1^6X_2^4X_3^5, X_1^9X_2^7X_3^9, X_1^{11}X_2^7X_3^8\}.$$

Das größte Monom in  $N$  ist  $X_1^{11}X_2^7X_3^8$ .

Das bedeutet, dass  $X_1^2X_2X_3^2 = f^{-1}(X_1^{11}X_2^7X_3^8)$  das größte Monom von  $M$  bezüglich  $<_A$  ist. Entsprechend erhalten wir die Anordnung aller Monome bezüglich  $<_A$ ; es ergibt sich

$$X_1^2X_2X_3^2 > X_1X_2^2X_3 > X_2X_3^3 > X_1X_2X_3^2 > X_1^3X_2 > X_1^2X_3.$$

**Aufgabe** 2/5/040

(S: Varianten)

Gröbnerbasen (1)

**Index:** reduzierte Gröbnerbasis, lexikographische Ordnung, Ideal

**Stoffeinheiten:** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

Bestimmen Sie (bezüglich der lexikographischen Ordnung) die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , das durch die folgenden Polynome  $f$  und  $g$ ,

$$f = X_1^2 + X_2^{16}X_3^4, \quad g = X_1X_2 + X_2^5X_3^{11}$$

erzeugt wird.

**Lösung.** Wir gehen im Wesentlichen so vor wie beim Buchberger-Algorithmus und bestimmen

$$S(f, g) = X_2 \cdot f - X_1 \cdot g = -X_1 X_2^5 X_3^{11} + X_2^{17} X_3^4.$$

Nun ergibt sich der Rest von  $S(f, g)$  bei Division durch  $(f, g)$  als

$$q := X_2^{17} X_3^4 + X_2^9 X_3^{22}.$$

$S(f, q)$  ist bezüglich  $(f, q)$  speziell erzeugbar (vgl. Lemma 2/5/27).

Wir berechnen  $S(g, q)$  wie oben und sehen, dass bei Division durch  $(g, q)$  der Rest 0 auftritt, denn

$$\begin{aligned} S(g, q) &= X_2^{16} X_3^4 \cdot g - X_1 \cdot q = -X_1 X_2^9 X_3^{22} + X_2^{21} X_3^{15} \\ &= -X_2^8 X_3^{22} \cdot g + X_2^4 X_3^{11} \cdot q. \end{aligned}$$

Dann ist

$$(f, g, q) = (X_1^2 + X_2^{16} X_3^4, X_1 X_2 + X_2^5 X_3^{11}, X_2^{17} X_3^4 + X_2^9 X_3^{22})$$

eine Gröbnerbasis des von  $f, g$  erzeugten Ideals. Wir überzeugen uns leicht davon, dass diese sogar reduziert ist.

**Aufgabe 2/5/050**

(S: Varianten)

Gröbnerbasen (2)

**Index:** reduzierte Gröbnerbasis, lexikographische Ordnung, Ideal

**Stoffeinheiten:** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

Bestimmen Sie (bezüglich der lexikographischen Ordnung) die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , das durch die folgenden Polynome  $f$  und  $g$  erzeugt wird,

$$f = X_1 X_2 + X_2^3 X_3^5, \quad g = X_1 X_3^9 + X_2 X_3^3.$$

**Lösung.** Wir gehen im Wesentlichen so vor wie beim Buchberger-Algorithmus und bestimmen

$$S(f, g) = X_3^9 \cdot f - X_2 \cdot g = X_2^3 X_3^{14} - X_2^2 X_3^3.$$

Wir setzen  $q := X_2^3 X_3^{14} - X_2^2 X_3^3$  und berechnen  $S(g, q)$  wie oben; es zeigt sich, dass in beiden Fällen bei Division durch  $(f, g, q)$  der Rest 0 auftritt, denn

$$\begin{aligned} S(f, q) &= X_2^2 X_3^{14} \cdot f - X_1 \cdot q = X_1 X_2^2 X_3^3 + X_2^5 X_3^{19} \\ &= X_2 X_3^3 \cdot f + X_2^5 X_3^{19} - X_2^4 X_3^8 = X_2 X_3^3 \cdot f + X_2^2 X_3^5 \cdot q \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} S(g, q) &= X_2^3 X_3^5 \cdot g - X_1 \cdot q = X_1 X_2^2 X_3^3 + X_2^4 X_3^8 \\ &= X_2 X_3^3 \cdot f + X_2^4 X_3^8 - X_2^4 X_3^8 = X_2 X_3^3 \cdot f. \end{aligned}$$

Dann ist

$$(f, g, q) = (X_1 X_2 + X_2^3 X_3^5, X_1 X_3^9 + X_2 X_3^3, X_2^3 X_3^{14} - X_2^2 X_3^3)$$

eine Gröbnerbasis des von  $f, g$  erzeugten Ideals. Wir überzeugen uns leicht davon, dass diese sogar reduziert ist.

**Aufgabe 2/5/060**

(S: Varianten)

Gröbnerbasen (3)

**Index:** reduzierte Gröbnerbasis, lexikographische Ordnung, Ideal

**Stoffeinheiten:** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

Bestimmen Sie (bezüglich der lexikographischen Ordnung) die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , das durch die folgenden Polynome  $f$  und  $g$  erzeugt wird,

$$f = X_1^2, \quad g = X_1X_2^8 + X_2^2X_3^{12}.$$

**Lösung.** Wir gehen im Wesentlichen so vor wie beim Buchberger-Algorithmus und bestimmen

$$S(f, g) = X_2^8 \cdot f - X_1 \cdot g = -X_1X_2^2X_3^{12}.$$

Wir setzen  $h := X_1X_2^2X_3^{12}$  und sehen, dass  $S(f, h) = 0$  ist, weil  $f, h$  Monome sind. Es ist

$$S(g, h) = X_3^{12} \cdot g - X_2^6 \cdot h = X_2^2X_3^{24}.$$

Mit  $q := X_2^2X_3^{24}$  ergibt sich  $S(f, q) = S(h, q) = 0$  da  $f, h, q$  Monome sind. Wir berechnen  $S(g, q)$  wie oben und sehen, dass bei Division durch  $(g, q)$  der Rest 0 auftritt, denn

$$S(g, q) = X_3^{24} \cdot g - X_1X_2^6 \cdot q = X_3^{12} \cdot q.$$

Dann ist

$$(f, g, h, q) = (X_1^2, X_1X_2^8 + X_2^2X_3^{12}, X_1X_2^2X_3^{12}, X_2^2X_3^{24})$$

eine Gröbnerbasis des von  $f, g$  erzeugten Ideals. Wir überzeugen uns leicht davon, dass diese sogar reduziert ist.

**Aufgabe** 2/5/070

(S: Varianten)

Gröbnerbasen (4)

**Index:** reduzierte Gröbnerbasis, lexikographische Ordnung, Ideal**Stoffeinheiten:** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

Bestimmen Sie (bezüglich der lexikographischen Ordnung) die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , das durch die folgenden Polynome  $f$  und  $g$  erzeugt wird,

$$f = X_1^2 + X_3^{16}, \quad g = X_1X_2 + X_3^8.$$

**Lösung.** Wir gehen im Wesentlichen so vor wie beim Buchberger-Algorithmus und bestimmen

$$S(f, g) = X_2 \cdot f - X_1 \cdot g = -X_1X_3^8 + X_2X_3^{16}.$$

Wir setzen  $h := X_1X_3^8 - X_2X_3^{16}$  und sehen, dass

$$S(f, h) = X_3^8 \cdot f - X_1 \cdot h = X_3^{16} \cdot g$$

und

$$S(g, h) = X_3^8 \cdot g - X_2 \cdot h = X_2^2X_3^{16} + X_3^{16}$$

ist. Wir setzen  $q = X_2^2X_3^{16} + X_3^{16}$  und bemerken, dass  $S(f, q)$  bezüglich  $(f, q)$  speziell erzeugbar ist (vgl. Lemma 2/5/27).

Wir berechnen  $S(g, q)$  wie oben und sehen, dass der Rest bei Division durch  $(g, q)$  gleich 0 ist,

$$S(g, q) = X_2X_3^{16} \cdot g - X_1 \cdot q = -X_3^8 \cdot h.$$

Offensichtlich haben wir

$$S(h, q) = X_2^2X_3^8 \cdot h - X_1 \cdot q = -X_3^8 \cdot h - X_2X_3^8 \cdot q.$$

Daher ist

$$(f, g, h, q) = (X_1^2 + X_3^{16}, X_1X_2 + X_3^8, X_1X_3^8 - X_2X_3^{16}, X_2^2X_3^{16} + X_3^{16})$$

eine Gröbnerbasis des von  $f, g$  erzeugten Ideals. Wir überzeugen uns leicht davon, dass diese sogar reduziert ist.

**Aufgabe** 2/5/080

(S: Varianten)

Gröbnerbasen (5)

**Index:** reduzierte Gröbnerbasis, lexikographische Ordnung, Ideal

**Stoffeinheiten:** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

Bestimmen Sie (bezüglich der lexikographischen Ordnung) die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , das durch die folgenden Polynome  $f$  und  $g$  erzeugt wird,

$$f = X_1^2 + X_2^{12}X_3^{18}, \quad g = X_1X_2^8 + X_2^7X_3^9.$$

**Lösung.** Wir gehen im Wesentlichen so vor wie beim Buchberger-Algorithmus und bestimmen

$$S(f, g) = X_2^8 \cdot f - X_1 \cdot g = -X_1X_2^7X_3^9 + X_2^{20}X_3^{18}.$$

Wir setzen  $h := X_1X_2^7X_3^9 - X_2^{20}X_3^{18}$  und sehen, dass

$$S(f, h) = X_2^7X_3^9 \cdot f - X_1 \cdot h = X_2^{12}X_3^{18} \cdot g$$

und

$$S(g, h) = X_3^9 \cdot g - X_2 \cdot h = X_2^{21}X_3^{18} + X_2^7X_3^{18}$$

ist. Mit  $q := X_2^{21}X_3^{18} + X_2^7X_3^{18}$  bemerken wir, dass  $S(f, q)$  bezüglich  $(f, q)$  speziell erzeugbar ist (vgl. Lemma 2/5/27). Wir berechnen  $S(g, q)$  wie oben und sehen, dass bei Division durch  $(g, q)$  der Rest 0 auftritt,

$$S(g, q) = X_2^{13}X_3^{18} \cdot g - X_1 \cdot q = -X_3^9 \cdot h.$$

Offensichtlich gilt

$$S(h, q) = X_2^{14}X_3^9 \cdot h - X_1 \cdot q = -X_3^9 \cdot h - X_2^{13}X_3^9 \cdot q.$$

Daher ist

$$(f, g, h, q) = (X_1^2 + X_2^{12}X_3^{18}, X_1X_2^8 + X_2^7X_3^9, X_1X_2^7X_3^9 - X_2^{20}X_3^{18}, X_2^{21}X_3^{18} + X_2^7X_3^{18})$$

eine Gröbnerbasis des von  $f, g$  erzeugten Ideals. Wir überzeugen uns leicht davon, dass diese sogar reduziert ist.

**Aufgabe** 2/5/090

(S: Varianten)

Gröbnerbasen (6)

**Index:** reduzierte Gröbnerbasis, lexikographische Ordnung, Ideal

**Stoffeinheiten:** 2/5/28 - 2/5/31 Reduzierte Gröbnerbasen

Bestimmen Sie (bezüglich der lexikographischen Ordnung) die reduzierte Gröbnerbasis für das Ideal in  $\mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ , das durch die folgenden Polynome  $f$  und  $g$  erzeugt wird,

$$f = X_1^2 + X_2^9X_3^{10}, \quad g = X_1X_2^{17} + X_2^8X_3^5.$$

**Lösung.** Wir gehen im Wesentlichen so vor wie beim Buchberger-Algorithmus und bestimmen

$$S(f, g) = X_2^{17} \cdot f - X_1 \cdot g = -X_1 X_2^8 X_3^5 + X_2^{26} X_3^{10}.$$

Wir setzen  $h := X_1 X_2^8 X_3^5 - X_2^{26} X_3^{10}$  und erhalten

$$S(f, h) = X_2^8 X_3^5 \cdot f - X_1 \cdot h = X_2^9 X_3^{10} \cdot g,$$

$$S(g, h) = X_3^5 \cdot g - X_2^9 \cdot h = X_2^{35} X_3^{10} + X_2^8 X_3^{10}.$$

Mit  $q := X_2^{35} X_3^{10} + X_2^8 X_3^{10}$  ergibt sich, dass  $S(f, q)$  bezüglich  $(f, q)$  speziell erzeugbar ist (vgl. Lemma 2/5/27). Wir berechnen  $S(g, q)$  wie oben und sehen, dass dieses Polynom bei Division durch  $(h, g, q)$  den Rest 0 hat, denn

$$S(g, q) = X_2^{18} X_3^{10} \cdot g - X_1 \cdot q = -X_3^5 \cdot h.$$

Offensichtlich ist

$$\begin{aligned} S(h, q) &= X_2^{27} X_3^5 \cdot h - X_1 \cdot q = -X_1 X_2^8 X_3^{10} - X_2^{53} X_3^{15} \\ &= -X_3^5 \cdot h - X_2^{18} X_3^5 \cdot q \end{aligned}$$

speziell erzeugt bezüglich  $(h, q)$ . Daher erhalten wir

$$(f, g, h, q) =$$

$$(X_1^2 + X_2^9 X_3^{10}, X_1 X_2^{17} + X_2^8 X_3^5, X_1 X_2^8 X_3^5 - X_2^{26} X_3^{10}, X_2^{35} X_3^{10} + X_2^8 X_3^{10})$$

als Gröbnerbasis des von  $f, g$  erzeugten Ideals. Diese ist offensichtlich reduziert.

## Aufgaben zum Kapitel 3

### Aufgabe 3/1/010

Beispiele für Unterräume

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Unterraumkriterium

**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 Untervektorräume

Im Vektorraum  $V = \mathbb{R}^3$  über den reellen Zahlen betrachten wir die folgenden Teilmengen; entscheiden Sie in jedem Fall, ob ein Untervektorraum vorliegt.

- (1)  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$
- (2)  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 3 \text{ oder } x = y\}$
- (3)  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0 \text{ oder } x = y\}$
- (4)  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = n, y = 2n, z = 3n, \text{ mit } n \in \mathbb{Z}\}$
- (5)  $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0 \text{ oder } y = 0 \text{ oder } z = 0\}$

### Aufgabe 3/1/020

Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme als Unterräume

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Unterraumkriterium

**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 Untervektorräume

- (1) Im reellen Standardvektorraum  $\mathbb{R}^3$  bezeichne  $U$  die Menge aller  $(x, y, z)$  mit

$$\begin{aligned} x - 3y + 2z &= 0 \\ x + y - z &= 0. \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass  $U$  ein Unterraum ist.

- (2)  $W$  sei die Menge aller  $(x, y, z)$  mit

$$\begin{aligned} x - 3y + 2z &= 1 \\ x + y - z &= 0. \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass  $W$  kein Unterraum ist!

- (3)  $L \subseteq K^n$  sei die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

über dem Körper  $K$ . Zeigen Sie, dass  $L$  genau dann ein Unterraum des Standardraumes  $K^n$  über  $K$  ist, wenn das obige System homogen ist (d.h.  $b_1 = \dots = b_m = 0$ ).

### Aufgabe 3/1/030

Zahlenfolgen als Unterräume

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Unterraumkriterium

**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 Untervektorräume

Wir betrachten den  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $V$  aller Folgen  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  reeller Zahlen  $a_n$ . Entscheiden Sie in jedem der folgenden Fälle, ob die betreffende Teilmenge einen Unterraum bildet.

- (1)  $U_1 := \{(a_n) \in V \mid \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = 0\}$
- (2)  $U_2 := \{(a_n) \in V \mid \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) = 1\}$
- (3)  $U_3 := \{(a_n) \in V \mid \forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq 1\}$
- (4)  $U_4 := \{(a_n) \in V \mid (a_n) \text{ konvergiert}\}$
- (5)  $U_5 := \{(a_n) \in V \mid \exists n_0 \in \mathbb{N} : a_n = a_{n+1} \text{ für } n \geq n_0\}$ .

**Aufgabe 3/1/040**

Summe zweier Unterräume

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Summe zweier Unterräume**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 UntervektorräumeIm Standardvektorraum  $V = K^3$  über dem Körper  $K$  betrachten wir die Unterräume

$$U_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in K^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = 0\},$$

$$U_2 = K \cdot (1, 1, 1) := \{t \cdot (1, 1, 1) \mid t \in K\}.$$

Zeigen Sie: Für  $K = \mathbb{R}$  ist  $U_1 + U_2 = V$ . Gilt dies auch im Falle  $K = \mathbb{F}_3$ ?**Aufgabe 3/1/050**

Ist die Vereinigung zweier Unterräume ein Unterraum?

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Unterraumkriterium, Summe zweier Unterräume**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 UntervektorräumeGeben Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür an, dass die Vereinigung zweier Unterräume eines  $K$ -Vektorraumes  $V$  wieder ein Unterraum von  $V$  ist.**Aufgabe 3/1/060**

Beispiele für Homomorphismen (1)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Erzeugendensystem eines Vektorraumes, Homomorphismus von Vektorräumen**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 Untervektorräume $V$  sei ein  $K$ -Vektorraum und  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n \in V$ . Wir definieren eine Abbildung  $f : K^n \rightarrow V$  durch

$$f(x_1, \dots, x_n) := x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n.$$

Zeigen Sie:

- (1)  $f$  ist eine lineare Abbildung von  $K$ -Vektorräumen.
- (2)  $f$  ist genau dann surjektiv, wenn  $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$  ein Erzeugendensystem von  $V$  bildet.

**Aufgabe 3/1/070**

Beispiele für Homomorphismen (2)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Homomorphismus von Vektorräumen, Bild und Kern einer linearen Abbildung**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 Untervektorräume

Es sei  $V$  der reelle Vektorraum der beliebig oft differenzierbaren Abbildungen  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  sowie  $d : V \rightarrow V$  derjenige Homomorphismus, der der Abbildung  $f$  ihre Ableitung  $\frac{df}{dx}$  zuordnet.

- (1) Ist  $d$  injektiv?
- (2)\* Geben Sie  $\text{im}(d)$  und  $\text{ker}(d)$  an!

### Aufgabe 3/1/080

Rechnen mit Unterräumen

**Index:** Vektorraum, Unterraum

**Stoffeinheiten:** 3/1/12 - 3/1/23 [Untervektorräume](#)

$U_1, U_2$  und  $U_3$  seien Unterräume des  $K$ -Vektorraumes  $V$ . Für Teilmengen  $M, M' \subseteq V$  wird mit  $M + M'$  die Menge

$$\{m + m' \mid m \in M, m' \in M'\}$$

bezeichnet. Zeigen Sie:

- (1)  $U_1 + U_1 = U_1$ ,
- (2)  $U_1 + U_2 = U_2 + U_1$ ,
- (3)  $(U_1 + U_2) + U_3 = U_1 + (U_2 + U_3)$ ,
- (4)  $(U_1 \cap U_2) + (U_1 \cap U_3) \subseteq U_1 \cap (U_2 + U_3)$ ,
- (5)  $U_1 + (U_2 \cap U_3) \subseteq (U_1 + U_2) \cap (U_1 + U_3)$ ,
- (6)  $U_1 \subseteq U_3 \Rightarrow U_1 + (U_2 \cap U_3) = (U_1 + U_2) \cap U_3$ .

### Aufgabe 3/2/010

Innere direkte Summen (1)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, direkte Summe von Unterräumen, innere direkte Summe

**Stoffeinheiten:** 3/2/1 - 3/2/5 [Innere direkte Summe](#)

Im Standardraum  $\mathbb{R}^4$  betrachten wir die Vektoren  $\mathbf{x} = (1, 1, 1, 0)$ ,  $\mathbf{y} = (1, 2, 1, 1)$ ,  $\mathbf{z} = (1, 3, 1, 2)$ . Mit  $U := \mathbb{R}\mathbf{x} + \mathbb{R}\mathbf{y} + \mathbb{R}\mathbf{z}$  bezeichnen wir den von ihnen erzeugte Unterraum und setzen weiter  $V := \mathbb{R}\mathbf{x} + \mathbb{R}\mathbf{y}$ .

- (1) Entscheiden Sie, welche der folgenden Beziehungen gilt:
  - a)  $U = \mathbb{R}\mathbf{x} \oplus \mathbb{R}\mathbf{y}$
  - b)  $U = \mathbb{R}\mathbf{x} \oplus \mathbb{R}\mathbf{z}$
  - c)  $U = V \oplus \mathbb{R}\mathbf{z}$
- (2) Finden Sie einen Unterraum  $W$  mit der Eigenschaft, dass  $\mathbb{R}^4 = U \oplus W$  ist!

### Aufgabe 3/2/020

Innere direkte Summen (2)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, direkte Summe von Unterräumen, innere direkte Summe

**Stoffeinheiten:** 3/2/1 - 3/2/5 Innere direkte Summe

Wir betrachten den  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $V = M(n; \mathbb{R})$  quadratischer Matrizen. Mit  $U_1, U_2$  bezeichnen wir die folgenden Teilmengen:

$$U_1 := \{(a_{ij}) \in V \mid a_{ij} = 0 \text{ für } i \neq j\},$$

$$U_2 := \{(a_{ij}) \mid a_{ij} = 0 \text{ für } i + j \neq n + 1\}.$$

- (1) Zeigen Sie, dass für  $n \geq 2$  die Mengen  $U_1, U_2$  Unterräume von  $V$  sind.
- (2) Zeigen Sie, dass für  $n = 2$  gilt:  $V = U_1 \oplus U_2$ .
- (3)\* Geben Sie eine Verallgemeinerung für (2) an!

**Aufgabe** 3/2/040

(S: Varianten)

Lineare Codes, Decodierung (1)

**Index:** Vektorraum, Code, Maximum-Likelihood Decodierung**Stoffeinheiten:** 3/2/12 - 3/2/16 Der Homomorphiesatz für Vektorräume

$C$  sei der lineare Code im 8-dimensionalen Standardraum über  $\mathbb{F}_2$ , der als Lösungsmenge von  $A \cdot {}^t x = 0$  in  $\mathbb{F}_2^8$  gegeben ist, wobei  $A$  die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

bezeichnet. Decodieren Sie die Wörter

$$\mathbf{u}_1 = (0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1), \quad \mathbf{u}_2 = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1), \quad \mathbf{u}_3 = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0).$$

**Lösung.** Wir finden leicht eine Basis von  $C$ , die durch die Wörter

$$\mathbf{v}_1 = (0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1), \quad \mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0),$$

$$\mathbf{v}_3 = (1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0), \quad \mathbf{v}_4 = (0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0)$$

gegeben ist. Die Wörter

$$\mathbf{a}_1 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0), \quad \mathbf{a}_2 = (0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0),$$

$$\mathbf{a}_3 = (0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0), \quad \mathbf{a}_4 = (0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0)$$

erzeugen in  $\mathbb{F}_2^8$  einen linearen Unterraum  $L$  mit  $L \oplus C = \mathbb{F}_2^8$ . Dann ist  $\mathbb{F}_2^8$  Vereinigung von Klassen der folgenden Vektoren modulo  $C$ :

$$\mathbf{0}, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4,$$

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4.$$

Wir setzen

$$\mathbf{a}_5 = (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1), \quad \mathbf{a}_6 = (0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0),$$

$$\mathbf{a}_7 = (1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), \quad \mathbf{a}_8 = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0)$$

und bemerken, dass

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_8 + \mathbf{v}_4, \quad \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_6 + \mathbf{v}_2,$$

$$\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_1, \quad \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_7 + \mathbf{v}_3,$$

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_1.$$

Die Vektoren  $\mathbf{a}_i$  auf den rechten Seiten haben jeweils ein kleineres Gewicht. Nun ist  $\mathbb{F}_2^8$  die Vereinigung von Klassen der folgenden Vektoren modulo  $C$ :

$$0, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_4, \\ \mathbf{a}_5, \mathbf{a}_6, \mathbf{a}_7, \mathbf{a}_8, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_5.$$

Offensichtlich haben diese Wörter minimales Gewicht. Wir sehen, dass

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3 + \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_3 = \mathbf{a}_4 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4$$

ist. Daher sind  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$  bzw.  $\mathbf{u}_3$  durch

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1), \\ \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 = (1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1), \\ \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4 = (1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0)$$

decodiert.

### Aufgabe 3/2/041

(S: Varianten)

Lineare Codes, Decodierung (2)

**Index:** Vektorraum, Code, Maximum-Likelihood Decodierung

**Stoffeinheiten:** 3/2/12 - 3/2/16 Der Homomorphiesatz für Vektorräume

$C$  sei der lineare Code im 6-dimensionalen Standardraum über  $\mathbb{F}_2$ , der als Lösungsmenge von  $A \cdot {}^t x = 0$  in  $\mathbb{F}_2^6$  gegeben ist, wobei  $A$  die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

bezeichnet. Decodieren Sie die Wörter

$$\mathbf{u}_1 = (1, 0, 1, 0, 1, 0), \mathbf{u}_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 1), \mathbf{u}_3 = (0, 1, 1, 0, 0, 1).$$

**Lösung.** Eine Basis von  $C$  ist durch

$$\mathbf{v}_1 = (1, 0, 1, 0, 0, 1), \mathbf{v}_2 = (1, 0, 0, 1, 1, 0), \mathbf{v}_3 = (0, 1, 1, 1, 0, 0)$$

gegeben. Die Wörter

$$\mathbf{a}_1 = (0, 0, 1, 0, 0, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 0, 0, 0, 0, 0), \mathbf{a}_3 = (0, 0, 0, 1, 0, 0)$$

erzeugen in  $\mathbb{F}_2^6$  einen linearen Unterraum  $L$  mit  $L \oplus C = \mathbb{F}_2^6$ . Dann ist  $\mathbb{F}_2^6$  Vereinigung von Klassen der folgenden Vektoren modulo  $C$ :

$$0, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3.$$

Wir setzen

$$\mathbf{a}_4 = (0, 0, 0, 0, 0, 1), \mathbf{a}_5 = (0, 0, 0, 0, 1, 0), \mathbf{a}_6 = (0, 1, 0, 0, 0, 0)$$

und bemerken, dass

$$\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \mathbf{a}_4 + \mathbf{v}_1, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_6 + \mathbf{v}_3, \\ \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_2, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_2.$$

$\mathbb{F}_2^6$  ist nun Vereinigung von Klassen der folgenden Vektoren modulo  $C$ :

$$0, \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_6, \mathbf{a}_5, \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_5.$$

Offensichtlich haben diese Wörter minimales Gewicht. Wir sehen, dass

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{a}_6 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_2 = \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_3 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_5 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1$$

ist. Damit werden  $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$  bzw.  $\mathbf{u}_3$  durch

$$\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 = (1, 1, 1, 0, 1, 0),$$

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1, 1, 1),$$

$$\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1 = (0, 1, 0, 0, 1, 1)$$

decodiert.

### Aufgabe 3/2/050

Schnitt eines Homomorphismus

**Index:** Vektorraum, Homomorphismus von Vektorräumen, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Homomorphiesatz für Vektorräume

**Stoffeinheiten:** [3/2/17 - 3/2/24 Exakte Folgen](#)

Wir betrachten einen Homomorphismus  $f : V \rightarrow W$  von  $K$ -Vektorräumen. Zeigen Sie: Es existiert genau dann eine lineare Abbildung  $g : W \rightarrow V$  mit  $g \cdot f = \text{id}_V$ , wenn  $\ker(f) = \{0\}$ .

### Aufgabe 3/2/060

$\text{Hom}(V, W)$  als Vektorraum

**Index:** Vektorraum, Homomorphismus von Vektorräumen, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Mengen von Vektorraumhomomorphismen

**Stoffeinheiten:** [3/2/17 - 3/2/24 Exakte Folgen](#)

$\varphi : V \rightarrow W$  sei ein surjektiver Homomorphismus von  $K$ -Vektorräumen. Wir definieren für beliebige  $K$ -Vektorräume  $Z$  eine Abbildung

$$\Phi_Z : \text{Hom}_K(Z, V) \rightarrow \text{Hom}_K(Z, W)$$

durch  $\Phi_Z(\sigma) := \varphi \cdot \sigma$ . Zeigen Sie, dass dann auch  $\Phi_Z$  ein surjektiver Homomorphismus von  $K$ -Vektorräumen ist.

### Aufgabe 3/2/070

Exakte Folgen zerfallen

**Index:** Vektorraum, exakte Folge von Vektorräumen, Isomorphismus von Vektorräumen, direkte Summe von Vektorräumen, Komplementärraum

**Stoffeinheiten:** [3/2/17 - 3/2/24 Exakte Folgen](#)

Wir betrachten eine Folge

$$0 \longrightarrow V' \longrightarrow V \longrightarrow V'' \longrightarrow 0$$

linearer Abbildungen von  $K$ -Vektorräumen mit der Eigenschaft, dass das Bild jedes auftretenden Homomorphismus gleich dem Kern des nachfolgenden ist (d.h. es liegt eine *exakte Folge* vor). Beweisen Sie, dass  $V$  zu  $V' \oplus V''$  isomorph ist.

### Aufgabe 3/2/080

Faktorräume und Isomorphie (1)

**Index:** Vektorraum, Isomorphismus von Vektorräumen, Unterraum, Faktorraum

**Stoffeinheiten:** 3/2/17 - 3/2/24 Exakte Folgen

$U$ ,  $U_1$  und  $U_2$  seien Unterräume des Vektorraumes  $V$  und  $U_1 \subseteq U_2$ . Beweisen Sie:

- (1)  $(U_2 \cap U)/(U_1 \cap U)$  ist isomorph zu einem Unterraum von  $U_2/U_1$ .
- (2)  $(U_2 + U)/(U_1 + U)$  ist isomorph zu einem Faktorraum von  $U_2/U_1$ .

**Aufgabe** 3/2/090

Faktorräume und Isomorphie (2)

**Index:** Vektorraum, Isomorphismus von Vektorräumen, Unterraum

**Stoffeinheiten:** 3/2/17 - 3/2/24 Exakte Folgen

Beweisen Sie: Sind  $U_1$  und  $U_2$  Unterräume des Vektorraumes  $U_3$  und  $U_1 \subseteq U_2$ , so ist  $U_2/U_1$  Kern eines kanonischen Homomorphismus

$$U_3/U_1 \rightarrow U_3/U_2, \quad \mathbf{v} + U_1 \mapsto \mathbf{v} + U_2,$$

der einen Isomorphismus  $(U_3/U_1)/(U_2/U_1) \cong U_3/U_2$  induziert.

**Aufgabe** 3/3/010

(S: Varianten)

Lineare Unabhängigkeit von Vektoren und Erzeugendensysteme

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, Erzeugendensystem eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare Unabhängigkeit

Wir betrachten die Vektoren

- (1)  $(-1, -2, -2)$ ,  $(2, 0, -2)$ ,  $(2, -2, 1)$  im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}^3$ ,
- (2)  $(0, 1, 0)$ ,  $(1, 1, -1)$ ,  $(1, 1, 0)$  im  $\mathbb{F}_3$ -Vektorraum  $\mathbb{F}_3^3$ ,
- (3)  $(0, 0, -2, 0)$ ,  $(-2, 0, 2, 0)$ ,  $(2, -2, 1, 0)$  im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}^4$ ,
- (4)  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{7}{11}$  im  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}$ ,
- (5)  $(0, -(i+2))$ ,  $(-(i-2), -i)$  im  $\mathbb{C}$ -Vektorraum  $\mathbb{C}^2$ ,
- (6)\*  $\ln(2)$ ,  $\ln(3)$  im  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}$ .

Stellen Sie in jedem Fall fest, ob die angegebenen Vektoren ein Erzeugendensystem bzw. ein linear unabhängiges System bilden.

**Ergebnis.** Die angegebenen Vektoren sind

- (1) linear unabhängig und ein Erzeugendensystem,
- (2) linear unabhängig und ein Erzeugendensystem,
- (3) linear unabhängig, kein Erzeugendensystem,
- (4) linear abhängig, kein Erzeugendensystem,
- (5) linear unabhängig und Erzeugendensystem,
- (6) linear unabhängig, aber kein Erzeugendensystem.

**Aufgabe 3/3/020**

(S: Varianten)

Linear unabhängige Vektoren in  $\mathbb{C}^2$ **Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, komplexe Zahlen**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare UnabhängigkeitPrüfen Sie, ob die Vektoren  $(2i, (i-2)), ((4i-1), -5) \in \mathbb{C}^2$  linear unabhängig sind, wenn

- (1)  $\mathbb{C}^2$  als Standardvektorraum über  $\mathbb{C}$  bzw.
- (2)  $\mathbb{C}^2$  mittels der Inklusion  $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$  als Vektorraum über  $\mathbb{R}$

betrachtet wird.

**Ergebnis.**

- (1) Die Vektoren sind linear unabhängig.
- (2) Die Zerlegung in Real- und Imaginärteil induziert einen Isomorphismus von  $\mathbb{C}^2$  und  $\mathbb{R}^4$ . Wir ordnen beispielsweise  $\mathbf{v} = (\alpha, \beta) \in \mathbb{C}^2$  den Vektor  $(\operatorname{Re}(\alpha), \operatorname{Im}(\alpha), \operatorname{Re}(\beta), \operatorname{Im}(\beta)) \in \mathbb{R}^4$  zu. Dann entsprechen die gegebenen Vektoren

$$(0, 2, -2, 1), (-1, 4, -5, 0) \in \mathbb{R}^4$$

und sind daher linear unabhängig.

**Aufgabe 3/3/030**

(S: Varianten)

Lineare Codes, Fehlerkorrektur (1)

**Index:** Vektorraum, Code, fehlerkorrigierender Code, lineare Unabhängigkeit**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare Unabhängigkeit $C$  sei der lineare Code im 9-dimensionalen Standardraum über  $\mathbb{F}_2$ , der als Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems  $A \cdot x = 0$  gegeben ist, wobei  $A$  die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

bezeichnet. Ist  $C$  ein 1-Fehler-korrigierender Code?**Lösung.** Die Spalten der Matrix  $A$  sind alle von der Nullspalte verschieden. Über dem Grundkörper  $\mathbb{F}_2$  bedeutet dies, dass ein Paar solcher Spalten genau dann linear abhängig ist, wenn beide übereinstimmen.Wir sehen, dass  $A$  zwei gleiche Spalten besitzt. Damit ist das minimale Gewicht von  $C$  gleich 2 (vgl. 3/3/2 Beispiel 10) und  $C$  ist kein 1-Fehler-korrigierender Code.**Aufgabe 3/3/031**

(S: Varianten)

Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2)

**Index:** Vektorraum, Code, fehlerkorrigierender Code, Gewicht eines Codewortes, Informationsrate eines Codes, lineare Unabhängigkeit**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare Unabhängigkeit

$C$  sei der lineare Code im 8-dimensionalen Standardraum über  $\mathbb{F}_2$ , der als Lösungsmenge von  $A \cdot x = 0$  gegeben ist,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Berechnen Sie das minimale Gewicht von  $C$ .
- (2) Ist  $C$  ein 2-Fehler-korrigierender Code?
- (3) Welche Informationsrate hat  $C$ ?

**Lösung.** Die Spalten der Matrix  $A$  sind alle von der Nullspalte verschieden. Über dem Grundkörper  $\mathbb{F}_2$  bedeutet dies, dass ein Paar solcher Spalten genau dann linear abhängig ist, wenn beide übereinstimmen.

Wir bemerken, dass  $A$  keine zwei übereinstimmenden Spalten besitzt. Dann ist das minimale Gewicht von  $C$  größer 2 (vgl. 3/3/2, Beispiel 10). Es ist auch nicht schwer zu sehen, dass keine Spalte von  $A$  Summe zweier anderer Spalten ist. Darüber hinaus gibt es vier linear abhängige Spalten. Es folgt, dass das minimale Gewicht von  $C$  gleich 4 ist;  $C$  muss daher ein 1-Fehler-korrigierender Code sein.

Die Informationsrate von  $C$  ist  $\frac{1}{2}$ .

### Aufgabe 3/3/032

(S: Varianten)

Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3)

**Index:** Vektorraum, Code, fehlerkorrigierender Code, Gewicht eines Codewortes, Informationsrate eines Codes, lineare Unabhängigkeit

**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare Unabhängigkeit

$C$  sei der lineare Code im 8-dimensionalen Standardraum über  $\mathbb{F}_2$ , der als Lösungsmenge von  $A \cdot x = 0$  gegeben ist, wobei  $A$  die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

bezeichnet.

- (1) Berechnen Sie das minimale Gewicht von  $C$ .
- (2) Ist  $C$  ein 2-Fehler-korrigierender Code?
- (3) Welche Informationsrate hat  $C$ ?

**Lösung.** Die Spalten der Matrix  $A$  sind alle von der Nullspalte verschieden. Über dem Grundkörper  $\mathbb{F}_2$  bedeutet dies, dass ein Paar solcher Spalten genau dann linear abhängig ist, wenn beide übereinstimmen.

Wir bemerken, dass  $A$  keine zwei übereinstimmenden Spalten besitzt. Dann ist das minimale Gewicht von  $C$  größer 2 (vgl. 3/3/2, Beispiel 10).

Wir bemerken weiter, dass die Spalte 1 Summe der Spalten 8 und 4 von  $A$  ist. Es folgt, dass das minimale Gewicht von  $C$  gleich 3 ist und daher  $C$  ein 1-Fehler-korrigierender Code.

Die Informationsrate von  $C$  ist  $\frac{1}{2}$ .

### Aufgabe 3/3/040

Lineare Unabhängigkeit Eigenschaften (1)

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, Körper der reellen Zahlen als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum

**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 [Lineare Unabhängigkeit](#)

Wir betrachten den Körper  $\mathbb{R}$  der reellen Zahlen als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum;  $(1, a)$  mit  $a \in \mathbb{R}$  sei ein Zahlenpaar. Zeigen Sie:  $(1, a)$  ist genau dann linear abhängig, wenn  $a \in \mathbb{Q}$ .

### Aufgabe 3/3/050

Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (2)

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, Unterraum

**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 [Lineare Unabhängigkeit](#)

$U_1, U_2$  seien Unterräume des  $K$ -Vektorraumes  $V$  und  $\mathbf{v}_i \in U_i \setminus \{\mathbf{0}\}$  Vektoren ( $i = 1, 2$ ). Zeigen Sie:

- (1) Das Paar  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  ist linear unabhängig, falls  $U_1 \cap U_2 = \mathbf{0}$  ist.
- (2) Die beiden Bedingungen unter (1) sind äquivalent, sofern überdies  $U_1 = K \cdot \mathbf{v}_1$  und  $U_2 = K \cdot \mathbf{v}_2$  vorausgesetzt wird.

### Aufgabe 3/3/060

Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (3)

**Index:** Vektorraum, linear abhängige Vektoren, Linearkombination

**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 [Lineare Unabhängigkeit](#)

Es sei  $(\mathbf{v}_i)_{i \in I}$  eine linear abhängige Familie von Vektoren  $\mathbf{v}_i$  des  $K$ -Vektorraumes  $V$ . Wir setzen voraus, dass die Indexmenge  $I$  mindestens zwei Elemente hat. Beweisen Sie die folgende Behauptung.

Es existieren ein  $i \in I$  sowie Zahlen  $a_j \in K$ ,  $a_j = 0$  für fast alle  $j \in I$ , so dass  $\mathbf{v}_i = \sum_{j \in I - \{i\}} a_j \mathbf{v}_j$  ist.

### Aufgabe 3/3/070

Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (4)

**Index:** Vektorraum, linear abhängige Vektoren, Linearkombination

**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 [Lineare Unabhängigkeit](#)

Geben Sie ein konkretes Beispiel für die folgende Situation an:

$V$  ist ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum, die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in V$  sind linear abhängig, aber  $\mathbf{v}_1$  ist nicht Summe von Vielfachen der übrigen Vektoren  $\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k$ .

**Aufgabe 3/3/080**

Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (5)

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren**Stoffeinheiten:** 3/3/1 - 3/3/4 Lineare Unabhängigkeit

Im  $K$ -Vektorraum  $V$  fixieren wir Vektoren  $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ ,  $n \geq 2$ . Zeigen Sie: Das  $(n-1)$ -Tupel  $(\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_n, \dots, \mathbf{a}_{n-1} - \mathbf{a}_n)$  ist genau dann linear unabhängig, wenn  $(\mathbf{a}_2 - \mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n - \mathbf{a}_1)$  linear unabhängig ist.

**Aufgabe 3/3/090**

(S: Varianten)

Basen und Koordinaten (1)

**Index:** Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, Koordinaten**Stoffeinheiten:** 3/3/5 - 3/3/16 Basen von Vektorräumen

Nachfolgend ist in jedem Fall ein Vektorraum  $V$  mit einer Familie  $\mathcal{B}$  von Vektoren gegeben. Prüfen sie jeweils, ob  $\mathcal{B}$  eine Basis ist und bestimmen Sie in diesem Fall die Koordinaten von  $\mathbf{x} \in V$  bezüglich  $\mathcal{B}$ .

- (1)  $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  mit  $\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$ ,  $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$ ,  $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$  im Standardraum  $V = \mathbb{R}^3$  sowie  $\mathbf{x} = (1, -3, 1)$ .
- (2)  $V$  sei der  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathcal{B} := (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  mit  $\mathbf{v}_1 = (1, -1, 1)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (-1, -1, -1)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (-1, 0, 1)$  und  $\mathbf{x} = (1, -1, -1)$ .
- (3)  $V$  sei der  $\mathbb{F}_2$ -Vektorraum  $\mathbb{F}_2^3$ , sowie  $\mathcal{B} = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 0))$ ,  $\mathbf{x} = (0, 1, 1)$ .
- (4)  $V = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{2}$  sei der von  $\{1, \sqrt{2}\}$  erzeugte  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum und  $\mathcal{B} := (3, \sqrt{2})$  sowie  $\mathbf{x} = (1 + \sqrt{8})^2$ .

**Ergebnis.**

- (1)  $\mathcal{B}$  ist eine Basis (kanonische Basis des gegebenen Standardraumes). Die gesuchten Koordinaten sind  $(1, -3, 1)$ .
- (2)  $\mathcal{B}$  ist eine Basis. Die Koordinaten von  $\mathbf{x}$  sind  $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1)$ .
- (3)  $\mathcal{B}$  ist eine Basis. Die Koordinaten von  $\mathbf{x}$  sind  $(0, 1, 0)$ .
- (4)  $\mathcal{B}$  ist eine Basis. Die Koordinaten von  $\mathbf{x}$  sind  $(3, 4)$ .

**Aufgabe 3/3/100**

(S: Varianten)

Basen und Koordinaten (2)

**Index:** Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, Koordinaten**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Zeigen Sie, dass die folgenden Vektoren  $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_4$  eine Basis des Standardvektorraumes  $\mathbb{R}^4$  bilden und geben Sie die Koordinaten von  $\mathbf{v} = (-2, -3, -1, -8)$  bezüglich  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4)$  an.

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= (0, -1, 1, -1), & \mathbf{b}_2 &= (-2, -1, 1, 2), \\ \mathbf{b}_3 &= (-1, 0, 1, -2), & \mathbf{b}_4 &= (-1, -2, -1, -1) \end{aligned}$$

**Lösung.** Wir bilden zunächst die Matrix  $A \in M(4; \mathbb{R})$  aus den Spalten  ${}^t\mathbf{b}_i$  sowie daraus die Matrix  $B \in M(4, 5; \mathbb{R})$ , indem wir als letzte Spalte das Quadrupel  ${}^t\mathbf{v}$  hinzufügen.  $B$  ist erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems; durch Zeilentransformationen erhalten wir die erweiterte Koeffizientenmatrix eines äquivalenten Systems in Stufenform:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & -1 & -2 \\ -1 & -1 & 0 & -2 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -2 & -1 & -8 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Wir sehen insbesondere, dass die aus den ersten 4 Spalten gebildeten Teilmatrix und daher auch  $A$  den Rang 4 hat, d.h.  $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_4)$  ist eine Basis von  $\mathbb{R}^4$ .

Schrittweises Einsetzen ergibt nun als Lösung des Systems  $Ax = {}^t\mathbf{v}$  die gesuchten Zahlen  $x_i$  mit  $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3 + x_4\mathbf{b}_4 = \mathbf{v}$ .

$\mathbf{v}$  hat die Koordinaten  $(0, -1, 2, 2)$  bezüglich der Basis  $\mathcal{B}$ .

### Aufgabe 3/3/110

(S: Varianten)

Rechenbeispiele zur Basisauswahl

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Basis eines Vektorraumes, lineare Hülle

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Im Vektorraum  $\mathbb{R}^5$  wird durch  $U := \mathbb{R}\mathbf{a} + \mathbb{R}\mathbf{b} + \mathbb{R}\mathbf{c} + \mathbb{R}\mathbf{d} + \mathbb{R}\mathbf{e}$  ein Unterraum gegeben, wobei

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (1, 0, 1, -2), \quad \mathbf{b} = (0, 1, -1, -2), \quad \mathbf{c} = (2, 1, 1, -6), \\ \mathbf{d} &= (2, 1, -2, -2), \quad \mathbf{e} = (1, -1, 2, 0). \end{aligned}$$

Wählen Sie aus der Menge  $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}, \mathbf{e}\}$  der Erzeugenden von  $U$  eine Basis aus!

**Ergebnis.** Die Vektoren  $(1, 0, 1, -2)$ ,  $(0, 1, -1, -2)$ ,  $(2, 1, -2, -2)$  bilden eine Basis von  $U$ .

### Aufgabe 3/3/120

(S: Varianten)

Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (1)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Basis eines Vektorraumes, Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 3/3/5 - 3/3/16 Basen von Vektorräumen

Wir betrachten den Untervektorraum  $P_2 \subseteq \mathbb{R}[X]$  des  $\mathbb{R}$ -Vektorraumes aller Polynome über dem Körper der reellen Zahlen, der durch die Polynome vom Grad  $\leq 2$  gebildet wird. Zeigen Sie, dass  $(-2, X+1, X^2-X-2)$  eine Basis von  $P_2$  ist und bestimmen Sie die Koordinaten des Polynoms  $f = 3X^2 - 2X - 2$  bezüglich dieser Basis.

**Ergebnis.** Die Darstellung von  $f$  als Vielfachensumme der gegebenen Polynome führt nach Koeffizientenvergleich auf ein leicht zu lösendes lineares Gleichungssystem. Wir erhalten die Koordinaten  $(-\frac{3}{2}, 1, 3)$ .

### Aufgabe 3/3/130

(S: Varianten)

Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (2)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Basis eines Vektorraumes, Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 3/3/5 - 3/3/16 Basen von Vektorräumen

Wir bezeichnen mit  $P_3$  die Menge aller Polynome vom Grad  $\leq 3$  im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}[X]$ .

- (1) Zeigen Sie:  $P_3$  ist ein Unterraum von  $\mathbb{R}[X]$ .
- (2) Beweisen Sie, dass  $\mathcal{B} = (g_0, g_1, g_2, g_3)$  mit  $g_i := (1 - X)^i$  eine Basis für  $P_3$  bildet.
- (3) Bestimmen Sie die Koordinaten von  $h := X^2 - X$  bezüglich dieser Basis.

**Ergebnis für (3).** Das Polynom  $h$  hat die Koordinaten  $(0, -1, 1, 0)$  bezüglich der Basis  $\mathcal{B}$ .

**Aufgabe** 3/3/140

(S: Varianten)

Basisergänzung im  $\mathbb{R}^5$

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, Basisergänzungssatz

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}^5$  betrachten wir die Vektoren

$$(1, -1, -1, 0, -1), (0, 2, -1, 1, -1), (-2, 2, -2, 0, -2).$$

Wählen Sie ein maximales System linear unabhängiger Vektoren aus und ergänzen Sie dieses zu einer Basis von  $\mathbb{R}^5$ .

**Ergebnis.** Die Vektoren

$$(1, -1, -1, 0, -1), (0, 2, -1, 1, -1), (-2, 2, -2, 0, -2), \\ (1, 0, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0)$$

bilden eine Basis des Standardraumes  $\mathbb{R}^5$ .

**Aufgabe** 3/3/150

(S: Varianten)

Austauschverfahren

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, Basis eines Vektorraumes, Austauschverfahren

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Im Standardvektorraum  $\mathbb{R}^4$  über  $\mathbb{R}$  betrachten wir die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = (1, -1, 1, -2), \quad \mathbf{v}_2 = (2, 0, -2, 0), \\ \mathbf{v}_3 = (0, 0, -2, -1), \quad \mathbf{v}_4 = (1, -1, 1, 0) \quad \text{und} \\ \mathbf{w}_1 = (-2, 0, -2, 0), \quad \mathbf{w}_2 = (-1, 0, -7, -2).$$

- (1) Überprüfen Sie, dass  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$  eine Basis bilden und  $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2$  linear unabhängig sind.
- (2) Verwenden Sie das Austauschverfahren zur Bestimmung einer Basis der Gestalt  $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{v}_{i_1}, \mathbf{v}_{i_2})$ .

**Lösung.** Mit  $A$  bezeichnen wir die Matrix, deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_i$  gebildet werden,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Durch Zeilenoperationen wird diese leicht in die Matrix

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

überführt, die offensichtlich 4 Stufen und daher den vollen Rang  $4 = \text{rang}(A') = \text{rang}(A)$  hat. Daher ist  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$  eine Basis von  $\mathbb{R}^4$ .

Nun fügen wir zu  $A$  auf der linken Seite die durch  $\mathbf{w}_1$  und  $\mathbf{w}_2$  gebildeten Spalten hinzu und führen wiederum Zeilenoperationen aus, die diese Matrix in Zeilenstufenform transformieren,

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & -7 & 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & -2 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -2 & -1 & 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Dann bilden die Spalten der ersten Matrix, deren Positionen durch die Stufenindizes der zweiten gegeben sind, eine Familie linear unabhängiger Vektoren. Insbesondere bilden die ersten beiden Spalten und damit  $(\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2)$  ein linear unabhängiges Paar. Wir erhalten die Basis

$$((-2, 0, -2, 0), (-1, 0, -7, -2), (1, -1, 1, -2), (2, 0, -2, 0)).$$

### Aufgabe 3/3/160

(S: Varianten)

Basen von Komplementärräumen

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Basis eines Vektorraumes, linear unabhängige Vektoren, Komplementärraum

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Bestimmen Sie im reellen Standardraum  $\mathbb{R}^5$  einen Komplementärraum zum Unterraum

$$U := \mathbb{R} \cdot (0, 0, 1, 0, 1) + \mathbb{R} \cdot (0, -1, 0, 1, 0) + \mathbb{R} \cdot (0, -1, 0, 0, -1)$$

und beschreiben Sie ihn durch eine Basis.

**Ergebnis.** Wir wenden eine Variante des Austauschverfahrens an, indem wir die gegebenen Erzeugenden  $\mathbf{w}_1 = (0, 0, 1, 0, 1)$ ,  $\mathbf{w}_2 = (0, -1, 0, 1, 0)$  und  $\mathbf{w}_3 = (0, -1, 0, 0, -1)$  als Spalten einer Matrix  $A$  anordnen und die Matrix

$$B := (A, E_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

mit Zeilenoperationen in eine Stufenmatrix

$$B := \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

überführen. Durch die Positionen der Stufenindizes wird aus dem Erzeugendensystem  $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_5\}$  eine Basis des Raumes  $\mathbb{R}^5$  ausgewählt, die eine Basis von  $U$  enthält (wir mussten auf diese Weise nicht voraussetzen, dass die Vektoren  $\mathbf{w}_i$  linear unabhängig sind).

Die Vektoren  $\mathbf{e}_i$  zu den verbleibenden Stufenpositionen erzeugen einen Komplementärraum für  $U$ , dieser besitzt damit eine Basis

$$((1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0)).$$

### Aufgabe 3/3/170

Eine Eigenschaft von Basen

**Index:** Vektorraum, linear unabhängige Vektoren, Basis eines Vektorraumes, Dimension eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/3/17 - 3/3/21 Dimension

$V$  sei ein 2-dimensionaler reeller Vektorraum,  $\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in V$  Vektoren sowie  $\mathbf{x} + \mathbf{y} + \mathbf{z} = \mathbf{0}$ . Wir setzen voraus, dass das Paar  $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  linear unabhängig ist. Zeigen Sie: Je zwei dieser Vektoren bilden eine Basis.

### Aufgabe 3/3/180

(S: Varianten)

Existenz der linearen Fortsetzung von Abbildungen

**Index:** Vektorraum, lineare Fortsetzung, lineare Abbildung

**Stoffeinheiten:** 3/3/17 - 3/3/21 Dimension

$V$  bezeichnet den reellen Standardvektorraum  $\mathbb{R}^3$  und  $W$  den reellen Standardraum  $\mathbb{R}^2$ .

(1) Existiert eine lineare Abbildung  $f : V \rightarrow W$  mit der Eigenschaft

$$f(0, 0, -2) = (-3, 2)$$

$$f(-1, 2, -2) = (-2, -3)$$

$$f(1, -2, -2) = (-2, 5) ?$$

(2) Existiert eine lineare Abbildung  $f : V \rightarrow W$  mit der Eigenschaft

$$f(-1, -1, 2) = (-2, -1)$$

$$f(-1, 1, 1) = (-2, 2)$$

$$f(-2, 1, -1) = (-4, -1) ?$$

(3) Geben Sie eine Verallgemeinerung Ihres Resultats an!

### Lösung zu (1), (2).

(1) Offenbar ist

$$(1, -2, -2) = 2 \cdot (0, 0, -2) - 1 \cdot (-1, 2, -2);$$

wäre  $f$  linear, so hätten wir

$$f(1, -2, -2) = 2 \cdot f(0, 0, -2) - 1 \cdot f(-1, 2, -2) = (-4, 7) \neq (-2, 5).$$

Folglich kann  $f$  nicht linear sein.

$$(2) \quad f(x, y, z) = (2x, x + 2y + z).$$

**Aufgabe 3/3/190**

(S: Varianten)

Basen in Faktorräumen

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Faktorraum, Basis eines Vektorraumes**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Im Standardvektorraum  $V = \mathbb{R}^4$  sei durch  $U := \mathbb{R} \cdot \mathbf{a} + \mathbb{R} \cdot \mathbf{b}$  ein Unterraum gegeben mit  $\mathbf{a} = (2, -1, 0, 2)$ ,  $\mathbf{b} = (-1, 1, 2, -2)$ .

(1) Zeigen Sie, dass die Vektoren

$$\mathbf{v}_1 = (1, 2, -1, -1) \text{ und } \mathbf{v}_2 = (1, 1, -5, 1)$$

dieselbe Klasse im Faktorraum  $V/U$  haben.(2) Geben Sie eine Basis für  $V/U$  an.(3) Geben Sie die Klasse des Vektors von  $\mathbf{v} = (2, 1, -2, -1)$  als Vielfachensumme der Vektoren der unter (2) gefundenen Basis an!**Ergebnis.**(1) Es ist  $\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1 = (0, -1, -4, 2) = -1 \cdot (2, -1, 0, 2) - 2 \cdot (-1, 1, 2, -2) \in U$ , daher  $\bar{\mathbf{v}}_1 = \bar{\mathbf{v}}_2 \in V/U$ .(2) Die Klassen der Vektoren:  $\mathbf{c} = (1, 0, 0, 0)$  und  $\mathbf{d} = (0, 1, 0, 0)$  bilden eine Basis  $(\bar{\mathbf{c}}, \bar{\mathbf{d}})$  in  $V/U$ .(3) Es gilt  $\bar{\mathbf{v}} = 4 \cdot \bar{\mathbf{c}} + \frac{1}{2} \cdot \bar{\mathbf{d}}$ .**Aufgabe 3/3/200**

(S: Varianten)

Dimension von Bild und Kern einer linearen Abbildung

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Dimension eines Vektorraumes, lineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Bestimmen Sie die Dimension des Bildes und des Kerns der linearen Abbildung  $\varphi : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & -2 & 4 \\ 2 & -2 & 0 & 1 & -3 \\ -6 & 6 & -4 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

gegeben ist.

**Lösung.** Es ist  $\text{rang}(A) = \dim(\text{im}(\varphi)) = 5 - \dim(\text{ker}(\varphi))$ . Wir bestimmen den Rang der Matrix  $A$ , indem wir sie (beispielsweise mit dem gaußschen Algorithmus) in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix überführen. Es ergibt sich

$$\text{rang}(A) = \text{rang} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2,$$

daher  $\dim(\ker(\varphi)) = 3$  und  $\dim(\text{im}(\varphi)) = 2$ .

### Aufgabe 3/3/202

(S: Varianten)

Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 2

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Dimension eines Vektorraumes, lineare Abbildung

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Bestimmen Sie die Dimension des Bildes und des Kerns der linearen Abbildung  $\varphi : \mathbb{F}_2^5 \rightarrow \mathbb{F}_2^5$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gegeben ist.

**Lösung.** Es ist  $\text{rang}(A) = \dim(\text{im}(\varphi)) = 5 - \dim(\ker(\varphi))$ . Wir bestimmen den Rang der Matrix  $A$ , indem wir sie (beispielsweise mit dem gaußschen Algorithmus) in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix überführen. Es ergibt sich

$$\text{rang}(A) = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2,$$

daher  $\dim(\ker(\varphi)) = 3$  und  $\dim(\text{im}(\varphi)) = 2$ .

### Aufgabe 3/3/203

(S: Varianten)

Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 3

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Dimension eines Vektorraumes, lineare Abbildung

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Bestimmen Sie die Dimension des Bildes und des Kerns der linearen Abbildung  $\varphi : \mathbb{F}_3^5 \rightarrow \mathbb{F}_3^5$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

gegeben ist.

**Lösung.** Es ist  $\text{rang}(A) = \dim(\text{im}(\varphi)) = 5 - \dim(\text{ker}(\varphi))$ . Wir bestimmen den Rang der Matrix  $A$ , indem wir sie (beispielsweise mit dem gaußschen Algorithmus) in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix überführen. Es ergibt sich

$$\text{rang}(A) = \text{rang} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3,$$

daher  $\dim(\text{ker}(\varphi)) = 2$  und  $\dim(\text{im}(\varphi)) = 3$ .

### Aufgabe 3/3/205

(S: Varianten)

Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 5

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Dimension eines Vektorraumes, lineare Abbildung

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Bestimmen Sie die Dimension des Bildes und des Kerns der linearen Abbildung  $\varphi : \mathbb{F}_5^5 \rightarrow \mathbb{F}_5^5$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 & 2 & 2 \\ -2 & -1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

gegeben ist.

**Lösung.** Es ist  $\text{rang}(A) = \dim(\text{im}(\varphi)) = 5 - \dim(\text{ker}(\varphi))$ . Wir bestimmen den Rang der Matrix  $A$ , indem wir sie (beispielsweise mit dem gaußschen Algorithmus) in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix überführen. Es ergibt sich

$$\text{rang}(A) = \text{rang} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2,$$

daher  $\dim(\text{ker}(\varphi)) = 3$  und  $\dim(\text{im}(\varphi)) = 2$ .

### Aufgabe 3/3/210

Dimensionen der Vektorräume in exakten Folgen

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, exakte Folge, Dimension eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/3/17 - 3/3/21 Dimension

Wir betrachten eine Folge endlichdimensionaler  $K$ -Vektorräume  $V_i$  und linearer Abbildungen

$$\mathbf{0} \xrightarrow{f_0} V_1 \xrightarrow{f_1} V_2 \xrightarrow{f_2} \dots \xrightarrow{f_{n-1}} V_n \xrightarrow{f_n} \mathbf{0},$$

für die  $\text{im}(f_i) = \ker(f_{i+1})$  gilt,  $i = 0, \dots, n-1$ . Beweisen Sie

$$\sum_{i=1}^n (-1)^i \cdot \dim_K(V_i) = 0.$$

### Aufgabe 3/3/220

Anzahl der Elemente eines endlichen Körpers

**Index:** Vektorraum, Charakteristik eines Körpers, Primkörper, Dimension

**Stoffeinheiten:** [3/3/17 - 3/3/21 Dimension](#)

$F$  sei ein endlicher Körper; beweisen Sie:

Es existieren eine Primzahl  $p$  sowie eine natürliche Zahl  $n \geq 1$ , für die  $|F| = p^n$  die Anzahl der Elemente von  $F$  ist.

### Aufgabe 3/3/230

Ein Gruppenisomorphismus\*

**Index:** Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, Kardinalzahl

**Stoffeinheiten:** [3/3/5 - 3/3/16 Basen von Vektorräumen](#)

\* Wir betrachten die abelsche Gruppe  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$  der von 0 verschiedenen komplexen Zahlen und die Untergruppe  $S^1 := \{x \in \mathbb{C} \mid |x| = 1\}$ ; Gruppenoperation ist in beiden Fällen die Multiplikation komplexer Zahlen. Beweisen Sie: Die Gruppen  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$  und  $(S^1, \cdot)$  sind isomorph.

**Anleitung zum Beweis.** Ein Isomorphismus  $\mathbb{R} \cong_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  lässt sich so wählen, dass  $1 \in \mathbb{R}$  auf  $(0, 1) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  abgebildet wird. Wir vergessen die Vektorraumstrukturen und erhalten ein kommutatives Diagramm von Gruppenhomomorphismen:

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{Z} & \xrightarrow{\subseteq} & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}/\mathbb{Z} \\ \mathbb{R} \downarrow & & \cong \downarrow & & \\ \{0\} \times \mathbb{Z} & \xrightarrow{\subseteq} & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \end{array}$$

Nach dem Homomorphieprinzip für Gruppen gibt es daher einen Isomorphismus  $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong (\mathbb{R} \times \mathbb{R}) / (\{0\} \times \mathbb{Z}) \cong \mathbb{R} \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ , und die additiven Gruppen in diesem Produkt sind isomorph zu den multiplikativen Gruppen  $S^1$  bzw.  $\mathbb{R}^{>0} \times S^1$  (wenden Sie den Homomorphiesatz auf  $\mathbb{R} \rightarrow S^1$  mit  $x \mapsto e^{2\pi i x}$  an bzw. verwenden Sie den Isomorphismus  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0} := \{a \in \mathbb{R} \mid a > 0\}$ , der durch  $x \mapsto e^x$  gegeben ist).

### Aufgabe 3/3/240

(S: Varianten)

Hill-Ciphern (3)

**Index:** Vektorraum, lineare Abbildung, Hill-Ciphern, Entschlüsselung durch lineare Fortsetzung, lineare Fortsetzung

**Stoffeinheiten:** [3/3/29 Beispiel: Entschlüsselung von Hill - Ciphern](#)

Eine Nachricht wird in der folgenden Weise verschlüsselt, indem zunächst Buchstaben auf Elemente des Primkörpers  $\mathbb{F}_{29}$  abgebildet werden.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	-	,	
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Die entstandenen Ziffern werden als Folge von Zahlenpaaren angeordnet (wobei ggf. am Ende der Nachricht ein Leerzeichen einzufügen ist, damit eine gerade Anzahl von Buchstaben entsteht).

Nun bezeichne  $A$  eine reguläre Matrix aus  $M(2; \mathbb{F}_{29})$ ; die zugehörige lineare Abbildung  $\mathbb{F}_{29}^2 \rightarrow \mathbb{F}_{29}^2$  der Standardräume bildet die Paare der Folge auf neue Paare ab.

Als verschlüsselte Nachricht bezeichnen wir denjenigen Text, der der Folge der Bilder der Zahlenpaare entspricht.

HANS hat eine Nachricht unter Verwendung der Matrix  $A \in M(2, \mathbb{F}_{29})$  nach obiger Methode verschlüsselt; diese lautet nun

„CEIRWGBKBLHZ“.

Wir nehmen an, dass HANS in der Nachricht eine gerade Anzahl von Zeichen verwendet und der Brief mit dem Vornamen HANS endet.

Entschlüsseln Sie die Nachricht.

**Lösung.** Zunächst stellen wir die Zuordnung der Buchstaben zu den Elementen von  $\mathbb{F}_{29}$  her und erhalten die folgende Liste von Paaren

$$(2, 4), (8, 17), (22, 6), (1, 10), (1, 11), (7, 25).$$

Wir haben die Matrix  $A$  zu finden. Nun sind „HA“ und „NS“ die letzten beiden Buchstabenpaare der Nachricht. Offensichtlich entsprechen diese gerade den Zahlenpaaren  $w_1 = (7, 0)$  und  $w_2 = (13, -11)$ . Durch Multiplikation ihrer Transponierten mit der Matrix  $A$  erhalten wir die letzten zwei Paare der obigen Liste, d.h.  $u_1 = (1, 11)$   $u_2 = (7, -4)$ . Es folgt  $A \cdot W = U$  mit

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 11 & -4 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 7 & 13 \\ 0 & -11 \end{pmatrix}.$$

Daraus ergibt sich

$$A = U \cdot W^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & -8 \\ 14 & 9 \end{pmatrix}.$$

Durch Multiplikation der Transponierten der Paare  $u$  mit der Matrix

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -14 & -6 \\ -4 & 3 \end{pmatrix},$$

d.h. durch  ${}^t u \mapsto A^{-1} \cdot {}^t u$  erhalten wir die gesuchten Urbilder; das erste entsteht beispielsweise durch

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \mapsto A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Die Resultate werden wiederum als Liste von Paaren aus  $\mathbb{F}_{29}^2$  angeordnet; es ergibt sich

$$(6, 4), (18, 19), (4, 17), (13, 26), (7, 0), (13, 18).$$

Wir stellen gemäß der Tabelle die Zuordnung zu den Buchstaben her und erhalten die unverschlüsselte Nachricht

„GESTERN-HANS“.

**Aufgabe 3/3/250**

(S: Varianten)

Bild und Kern einer linearen Abbildung (1)

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Basis eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Wir betrachten die Standardvektorräume  $V := \mathbb{R}^3$  und  $W := \mathbb{R}^2$  über  $\mathbb{R}$ . Bestimmen Sie für die lineare Abbildung  $g : V \rightarrow W$ , die durch

$$g(x, y, z) := (y - 2z, x - y + 2z)$$

definiert wird, die Vektorräume  $\ker(g)$  und  $\operatorname{im}(g)$  durch Angabe jeweils einer Basis.

**Ergebnis.**  $((0, 2, 1))$  ist eine Basis für  $\ker(g)$ .

$((0, 1), (1, -1))$  ist eine Basis für  $\operatorname{im}(g)$ .

**Aufgabe 3/3/260**

(S: Varianten)

Bild und Kern einer linearen Abbildung (2)

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Basis eines Vektorraumes, Basisergänzungssatz

**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit Basen

Wir untersuchen die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -1 & -2 & -2 \\ 1 & -5 & 4 & -10 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \in M_{\mathbb{R}}(4, 5).$$

- (1) Welchen Rang hat  $A$ ?
- (2)  $\varphi$  sei der Homomorphismus von  $\mathbb{R}^5$  nach  $\mathbb{R}^4$ , der durch  $A$  definiert wird. Bestimmen Sie jeweils eine Basis von  $\operatorname{im}(\varphi)$  und  $\ker(\varphi)$ .
- (3) Ergänzen Sie die gefundene Basis von  $\operatorname{im}(\varphi)$  zu einer Basis von  $\mathbb{R}^4$ .

**Ergebnis.**

- (1) Die Matrix  $A$  hat den Rang 3.
- (2) Eine Basis für  $\ker(\varphi)$  ist
 
$$((7, 1, -5, 0, 9), (4, -2, 4, 3, 0)),$$
 eine Basis für  $\operatorname{im}(\varphi)$  ergibt sich als
 
$$((-1, 2, 1, 1), (-1, -1, -5, 2), (2, -1, 4, 0)).$$
- (3) Die zuvor gefundene Basis für  $\operatorname{im}(\varphi)$  lässt sich folgendermaßen zu einer Basis von  $\mathbb{R}^4$  ergänzen:
 
$$((-1, 2, 1, 1), (-1, -1, -5, 2), (2, -1, 4, 0), (1, 0, 0, 0))$$

**Aufgabe 3/3/270**

(S: Varianten)

Bild und Kern eines Endomorphismus

**Index:** Vektorraum, Bild und Kern einer linearen Abbildung, Basis eines Vektorraumes**Stoffeinheiten:** 3/3/22 - 3/3/26 Rechnen mit BasenIm  $K$ -Vektorraum  $V := M(n; K)$  wählen wir eine Matrix  $A$ .

- (1) Zeigen Sie, dass die durch  $\Psi(X) := X \cdot A - A \cdot X$  definierte Abbildung  $\Psi : V \rightarrow V$  linear ist.
- (2) Wir wählen  $K = \mathbb{R}$ ,  $n = 2$  und

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie eine Basis für  $\ker(\Psi)$  an.**Lösung.** Wir bestimmen das Resultat zu (2). Dazu schreiben wir die Bedingung

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix}, \quad X \cdot A - A \cdot X = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

als lineares Gleichungssystem für die Zahlen  $x_1, \dots, x_4$  auf und erhalten:

$$x_2 - x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 - x_4 = 0$$

$$-x_1 - 3x_3 + x_4 = 0$$

$$-x_2 + x_3 = 0$$

Das übliche Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme liefert nun die Menge aller Lösungen; insbesondere hat  $\ker(\Psi)$  die Basis

$$\left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

**Aufgabe 3/4/010**

(S: Varianten)

Koordinaten und Übergangsmatrizen

**Index:** Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, Übergangsmatrix, Transformationsformel für Koordinaten, Koordinaten**Stoffeinheiten:** 3/4/1 - 3/4/8 Die Matrix einer linearen AbbildungIm  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}^3$  betrachten wir die kanonische Basis  $\mathcal{B} := (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  und das Tripel  $\mathcal{B}' := (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$  mit

$$\mathbf{b}_1 := (1, -1, 2), \quad \mathbf{b}_2 := (-1, 2, 1), \quad \mathbf{b}_3 := (1, -1, 0).$$

Zeigen Sie, dass  $\mathcal{B}'$  eine Basis ist und geben Sie beide Übergangsmatrizen zwischen den Basen  $\mathcal{B}$  und  $\mathcal{B}'$  an. Stellen Sie fest, welche Koordinaten der Vektor  $\mathbf{x} = (2, 3, -1)$  bezüglich  $\mathcal{B}'$  hat. Wie würden Sie diese Aufgabe lösen, wenn die betreffende Übergangsmatrix nicht gefragt wäre?**Ergebnis.** Wir erhalten die Übergangsmatrizen

$$M_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 5 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{x}$  hat die Koordinaten  $(-3, 5, 10)$  bezüglich  $\mathcal{B}'$ .

### Aufgabe 3/4/020

Matrix der Transposition

**Index:** Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, Matrix einer linearen Abbildung

**Stoffeinheiten:** 3/4/1 - 3/4/8 Die Matrix einer linearen Abbildung

Im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $M := M(2; \mathbb{R})$  der reellen  $2 \times 2$ -Matrizen werden mit  $E_{ij}$  diejenigen Matrizen bezeichnet, die an der  $(i, j)$ -ten Position den Wert 1 haben und an den übrigen den Wert 0.

- (1) Beweisen Sie, dass die Matrizen  $(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})$  eine Basis von  $M$  bilden.
- (2) Bestimmen Sie die Matrix der linearen Abbildung  $\varphi : M \rightarrow M$ , die durch  $\varphi(X) := {}^tX$  definiert ist.

### Aufgabe 3/4/030

(S: Varianten)

Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel

**Index:** Vektorraum, Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel für lineare Abbildungen, Übergangsmatrix, Transformationsformel für Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 3/4/9 - 3/4/12 Variation der Basen

Wir betrachten die lineare Abbildung  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ , die durch

$$\varphi(x, y) := (-2x + 2y, y, y)$$

gegeben ist.

- (1) Bestimmen Sie die Matrix von  $\varphi$  bezüglich der kanonischen Basen.
- (2) Zeigen Sie, dass  $\mathcal{B} := ((2, 2), (-1, 1))$  Basis des Vektorraumes  $\mathbb{R}^2$  ist und dass  $\mathcal{B}' := ((-2, 2, -1), (-1, -1, 2), (1, -1, 2))$  Basis für  $\mathbb{R}^3$  ist.
- (3) Bestimmen Sie die Übergangsmatrizen  $M_{\mathcal{B}, \mathcal{K}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2})$  und  $M_{\mathcal{K}', \mathcal{B}'}(\text{id}_{\mathbb{R}^3})$ , wobei  $\mathcal{K}, \mathcal{K}'$  die kanonischen Basen bezeichnen.
- (4) Bestimmen Sie die Matrix von  $\varphi$  bezüglich  $\mathcal{B}$  und  $\mathcal{B}'$ .

**Ergebnis.** Die gesuchten Matrizen sind

$$(1) \quad M_{\mathcal{K}, \mathcal{K}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$(3) \quad M_{\mathcal{B}, \mathcal{K}}(\text{id}_{\mathbb{R}^2}) = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{\mathcal{K}', \mathcal{B}'}(\text{id}_{\mathbb{R}^3}) = \frac{1}{6} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 \\ -3 & -3 & 0 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix},$$

$$(4) \quad M_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}(\varphi) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -2 & -5 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 3/4/040**

(S: Varianten)

Matrix eines Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , Basiswechsel**Index:** Vektorraum, Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel für lineare Abbildungen, Übergangsmatrix, Transformationsformel für Koordinaten**Stoffeinheiten:** 3/4/1 - 3/4/8 Die Matrix einer linearen Abbildung

$P_2$  sei der Unterraum der Polynome vom Grad  $\leq 2$  im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}[X]$  der Polynome in einer Unbestimmten über  $\mathbb{R}$ . Wir betrachten die lineare Abbildung  $\varphi : V \rightarrow V$ , die bezüglich der Basis  $\mathcal{B} := (1, X, X^2)$  durch die folgende Matrix

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

beschrieben wird.

- (1) Zeigen Sie, dass  $\mathcal{B}' := (2X + 2, -X^2 - X - 2, -2X^2 + 2X - 1)$  eine Basis von  $P_2$  ist.
- (2) Bestimmen Sie  $M_{\mathcal{B}'}(\varphi)$ .

**Ergebnis (2).** Es ist

$$M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -4 \\ -2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 3/4/050**

(S: Varianten)

Matrix eines Endomorphismus eines Unterraumes von  $\mathbb{R}[X]$ , Basiswechsel**Index:** Vektorraum, Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel für lineare Abbildungen, Übergangsmatrix, Transformationsformel für Koordinaten**Stoffeinheiten:** 3/4/1 - 3/4/8 Die Matrix einer linearen Abbildung

$P_2$  sei der Unterraum der Polynome vom Grad  $\leq 2$  im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{R}[X]$  der Polynome in einer Unbestimmten über  $\mathbb{R}$ . Das Tripel  $\mathcal{B} := (1, X, X^2)$  ist offensichtlich eine Basis von  $P_2$ . Nach dem Prinzip der linearen Fortsetzung ist nun durch

$$1 \mapsto X^2, \quad X \mapsto 1, \quad X^2 \mapsto X$$

eine lineare Abbildung  $\varphi : V \rightarrow V$  definiert.

- (1) Zeigen Sie, dass  $\mathcal{B}' := (-2X^2 + 2X + 1, 2X^2 + 2, X^2 + 2X + 2)$  eine Basis von  $P_2$  ist.
- (2) Bestimmen Sie  $M_{\mathcal{B}}(\varphi)$  und  $M_{\mathcal{B}'}(\varphi)$ .

**Ergebnis (2).** Es ist

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \frac{1}{8} \cdot \begin{pmatrix} -18 & 4 & -8 \\ -21 & 2 & -8 \\ 22 & 4 & 16 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 3/5/010**

(S: Varianten)

Duale Basen (1)

**Index:** Vektorraum, dualer Vektorraum, Basis eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

Stellen Sie fest, ob die Linearformen  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$ ,  $\mathbf{w}$  eine Basis des dualen Vektorraumes des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  bilden, wenn  $\mathbf{u}(x, y, z) = 4x - 4y$ ,  $\mathbf{v}(x, y, z) = -x - y + 3z$ ,  $\mathbf{w}(x, y, z) = 3x - 3y + 2z$  ist.

**Lösung.** Es genügt zu prüfen, ob die Matrix  $A$  aus den (hier als Spalten angeordneten) Koordinaten der Vektoren  $\mathbf{u}$ ,  $\mathbf{v}$ ,  $\mathbf{w}$  bezüglich der Basis  $(\mathbf{e}_1^*, \mathbf{e}_2^*, \mathbf{e}_3^*)$  die Eigenschaft  $\text{rang}(A) = 3$  hat. Dazu überführen wir  $A$  durch Zeilenoperationen in eine Stufenmatrix und erhalten

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ -4 & -1 & -3 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$  ist eine Basis des Raumes der Linearformen auf  $\mathbb{R}^3$ .

**Aufgabe** 3/5/020

(S: Varianten)

Duale Basen (2)

**Index:** Vektorraum, dualer Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, duale Basis**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

Überprüfen Sie, dass die angegebenen Tupel von Vektoren Basen sind und bestimmen Sie die dualen Basen für

- (1)  $((-2, 1, 1), (-2, 0, -2), (2, -1, 0))$   
im Standardvektorraum  $\mathbb{R}^3$  über  $\mathbb{R}$ , sowie für
- (2)  $((-1, -1), (0, 1))$   
im Standardvektorraum  $\mathbb{F}_3^2$  über  $\mathbb{F}_3$ .

**Ergebnis.**

- (1) Die duale Basis ist durch  $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$  gegeben, wobei

$$\mathbf{u}(x, y, z) = -x - 2y + z$$

$$\mathbf{v}(x, y, z) = -\frac{1}{2}x - y$$

$$\mathbf{w}(x, y, z) = -x - 3y + z.$$

- (2) Die duale Basis ist durch  $(\mathbf{u}, \mathbf{v})$  gegeben, wobei

$$\mathbf{u}(x, y) = -x$$

$$\mathbf{v}(x, y) = -x + y.$$

**Aufgabe** 3/5/030

Linearformen und Unterräume

**Index:** Vektorraum, dualer Vektorraum, Basis eines Vektorraumes, duale Basis**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

$V$  sei ein  $K$ -Vektorraum,  $U$  ein Unterraum, für den  $t := \dim_K(V/U)$  endlich ist. Beweisen Sie: Es existieren Linearformen  $\varphi_1, \dots, \varphi_t$  auf  $V$  mit der Eigenschaft  $U = \ker(\varphi_1) \cap \dots \cap \ker(\varphi_t)$ .

**Aufgabe 3/5/040**

(S: Varianten)

Gleichungen für Unterräume im  $\mathbb{R}^3$ **Index:** Vektorraum, Unterraum, Gleichungssystem für einen Unterraum**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische PaarungBestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem, das den durch  $(3, 3, 3)$  erzeugten Unterraum  $U$  des Standardvektorraumes  $\mathbb{R}^3$  als Lösungsmenge besitzt.**Lösung.** Wir bezeichnen mit  $f = ae_1^* + be_2^* + ce_3^*$  ( $a, b, c \in \mathbb{R}$ ) eine Linearform auf  $\mathbb{R}^3$ . Dann ist durch die Bedingung

$$0 = \langle f, (3, 3, 3) \rangle = 3a + 3b + 3c$$

eine lineare Gleichung gegeben, deren Lösungsraum durch

$$(-1, 0, 1), (-1, 1, 0)$$

erzeugt wird. Wählen wir diese Tripel als Zeilen der Koeffizientenmatrix eines homogenen linearen Gleichungssystems für Zahlen  $x, y, z$ , so erhalten wir eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür, dass  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  in  $U$  liegt (denn  $(U^\perp)^\perp = U$ ). Das System

$$-x + z = 0$$

$$-x + y = 0$$

hat daher den angegebenen Unterraum  $U$  als Lösungsmenge.**Aufgabe 3/5/041**

(S: Varianten)

Gleichungen für Unterräume im  $\mathbb{R}^4$ **Index:** Vektorraum, Unterraum, Gleichungssystem für einen Unterraum**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung $U := \mathbb{R}\mathbf{v} + \mathbb{R}\mathbf{w} \subseteq \mathbb{R}^4$  sei der Unterraum im 4-dimensionalen Standardvektorraum, der durch

$$\mathbf{v} = (-2, 3, 3, 1), \quad \mathbf{w} = (2, -2, 1, 0)$$

gegeben wird. Bestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem mit der Lösungsmenge  $U$ !**Lösung.**  $W$  bezeichne den Raum der Linearformen auf  $\mathbb{R}^4$ , die auf  $U$  verschwinden. Dann gilt mit  $W = U^\perp$ 

$$W = \{\mathbf{u} \in (\mathbb{R}^4)^* \mid \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = 0\}.$$

Ist  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  das Koordinatenquadrupel eines Vektors  $\mathbf{u} \in (\mathbb{R}^4)^*$  bezüglich der dualen Basis  $(\mathbf{e}_1^*, \mathbf{e}_2^*, \mathbf{e}_3^*, \mathbf{e}_4^*)$  der kanonischen, so ist die Bedingung  $\mathbf{u} \in W$  äquivalent dazu, dass das homogene lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

erfüllt ist. Eine zeilenäquivalente Umformung der Koeffizientenmatrix ergibt die Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} -2 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

aus der sich eine Basis  $((-9, -8, 2, 0), (-1, -1, 0, 1))$  der Lösungsmenge ablesen lässt. Bezeichnet  $A$  die Matrix mit diesen Zeilen, so ist  $Ax = 0$  ein Gleichungssystem für  $W^\perp$ , wir erhalten daher

$$-9x_1 - 8x_2 + 2x_3 = 0$$

$$-x_1 - x_2 + x_4 = 0$$

als lineares Gleichungssystem mit der Nullstellenmenge  $U$ .

### Aufgabe 3/5/042

(S: Varianten)

Gleichungen für Unterräume der Standardräume  $\mathbb{R}^4$  und  $\mathbb{C}^3$

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Gleichungssystem für einen Unterraum

**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

In Standardräumen  $V = \mathbb{K}^n$  über dem Körper  $\mathbb{K}$  wird nachfolgend jeweils ein Unterraum  $U$  durch Erzeugende vorgegeben. Finden Sie in beiden Fällen ein homogenes lineares Gleichungssystem, dessen Lösungsmenge genau der Unterraum  $U$  ist.

$$(1) \quad \mathbb{K} = \mathbb{R}, V = \mathbb{R}^4 \\ U = L_{\mathbb{R}}((-1, 0, 0, 0), (0, 1, -1, -3), (2, 1, -2, 1))$$

$$(2) \quad \mathbb{K} = \mathbb{C}, V = \mathbb{C}^3 \\ U = L_{\mathbb{C}}(((i-2), (i+2), (i+2)), (-3, 1, -(2i+3)))$$

### Ergebnis.

$$(1) \quad 7x_2 + 4x_3 + x_4 = 0$$

$$(2) \quad -(i+7)x_1 + (5i-9)x_2 + 4x_3 = 0$$

### Aufgabe 3/5/050

(S: Varianten)

Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (1)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Gleichungssystem für einen Unterraum, Basis eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

Es sei  $U$  der Unterraum des reellen Standardvektorraumes  $V = \mathbb{R}^4$ , der durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  erzeugt wird,  $\mathbf{v}_1 = (-2, -2, 0, 0)$ ,  $\mathbf{v}_2 = (2, 2, 0, 0)$ ,  $\mathbf{v}_3 = (-2, 1, -2, 1)$ . Weiter wird durch

$$U' = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in V \mid -x_1 + x_4 = 0\}$$

ein Unterraum von  $V$  gegeben. Bestimmen Sie eine Basis des Unterraumes  $U \cap U'$  von  $V$ .

**Ergebnis.**  $U \cap U'$  ist Lösungsmenge des folgenden Systems:

$$x_1 - x_2 + 3x_4 = 0$$

$$2x_1 - 2x_2 - 3x_3 = 0$$

$$x_1 - x_4 = 0$$

Daraus erhalten wir für  $U \cap U'$  als Basis

$$((1, 4, -2, 1)).$$

**Aufgabe 3/5/051**

(S: Varianten)

Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (2)

**Index:** Vektorraum, Unterraum, Gleichungssystem für einen Unterraum, Basis eines Vektorraumes, Dimension eines Vektorraumes

**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

$V$  bezeichne den reellen Standardraum  $\mathbb{R}^4$ .

- (1)  $V_1 \subseteq V$  sei der durch die Gleichung  $x_1 + x_2 + x_4 = 0$  definierte Unterraum. Geben Sie ein Erzeugendensystem für  $V_1$  an.
- (2) Bestimmen Sie ein Erzeugendensystem für  $V_1 \cap V_2$ ,  
 $V_2 := \mathbb{R} \cdot (-2, -2, -2, 2) + \mathbb{R} \cdot (0, 0, -2, 0)$ .
- (3) Welche Dimensionen haben die Vektorräume  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_1 \cap V_2$  und  $V_1 + V_2$ ?

**Ergebnis.**

- (1)  $V_1$  wird von den Vektoren aus  
 $((-1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 0))$   
erzeugt.
- (2)  $V_1 \cap V_2$  ist Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems  

$$x_1 + x_4 = 0$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_4 = 0$$
und  

$$((0, 0, 1, 0))$$
eine Basis von  $V_1 \cap V_2$ .
- (3) Es ist  $\dim V_1 = 3$ ,  $\dim V_2 = 2$ ,  $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$  und  
 $\dim(V_1 + V_2) = 4$ .

**Aufgabe 3/5/060**

Ein Vektorraum, der nicht zu seinem dualen isomorph ist

**Index:** Vektorraum, dualer Vektorraum, Isomorphismus von Vektorräumen

**Stoffeinheiten:** 3/5/1 - 3/5/11 Dualer Vektorraum und kanonische Paarung

$V$  sei ein unendlichdimensionaler Vektorraum über dem zweielementigen Körper  $\mathbb{F}_2$ . Beweisen Sie, dass  $V$  nicht zu seinem dualen Vektorraum  $V^*$  isomorph ist.

**Anmerkung.** Die Behauptung ist im angegebenen Spezialfall leicht aus Mächtigkeitsaussagen über die Menge gewisser Teilmengen einer Menge zu gewinnen.

**Anleitung zum Beweis.** Wählen Sie eine Basis  $\mathcal{B}$  von  $V$  und zeigen Sie, dass  $V$  zu  $\mathcal{B}$  gleichmächtig ist, nicht aber  $V^*$ .

## Aufgaben zum Kapitel 4

### Aufgabe 4/2/009

(S: Varianten)

Erste Schritte mit Determinanten

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/1 - 4/2/9 Der Hauptsatz der Determinantentheorie

Berechnen Sie die Determinante der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 & 2 \\ -2 & -1 & -4 & -6 \\ -5 & 4 & -5 & 2 \end{pmatrix}$$

unter Verwendung geeigneter Zeilentransformationen für  $A$ .**Lösung.**  $a_{11} = 0$ , daher wird – wie beim gaußschen Algorithmus – zunächst die erste Zeile mit der zweiten vertauscht. Dabei ändert sich das Vorzeichen der Determinante, d.h.

$$-\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ -2 & -1 & -4 & -6 \\ -5 & 4 & -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nun können Vielfache der ersten Zeile von den folgenden subtrahiert werden, so dass die Einträge  $a_{i1}$  verschwinden. Wir erhalten eine neue Matrix mit derselben Determinante, und entsprechend wird mit der zweiten Zeile verfahren, d.h.

$$-\det(A) = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 & -2 \\ 0 & 4 & 15 & 12 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 19 & 0 \end{pmatrix}.$$

Da wir ungern mit Brüchen rechnen, werden die 3. und 4. Zeile der zuletzt aufgetretenen Matrix mit 19 bzw. 3 multipliziert; entsprechend erhält die Determinante den Faktor  $\frac{1}{19} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{57}$ . Es ergibt sich

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 19 & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{57} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 57 & 19 \\ 0 & 0 & 57 & 0 \end{pmatrix},$$

daher nach Subtraktion der dritten Zeile von der vierten

$$\begin{aligned} -\det(A) &= \frac{1}{57} \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 57 & 19 \\ 0 & 0 & 0 & -19 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{57} \cdot 1 \cdot 1 \cdot 57 \cdot (-19) = -19. \end{aligned}$$

Wir erhalten  $\det(A) = 19$ .

Das hier verwendete Verfahren zur Bestimmung der Determinante ist eine Variante des gaußschen Algorithmus. Es ist allgemein ausführbar und beruht auf den folgenden Eigenschaften.

- (1) Bei Addition des Vielfachen einer Zeile zu einer anderen bleibt die Determinante einer Matrix unverändert.
- (2) Bei Multiplikation einer Zeile der Matrix  $A$  mit einer Zahl  $c$  wird  $\det(A)$  in  $c \cdot \det(A)$  überführt.
- (3) Durch Vertauschen zweier Zeilen der Matrix  $A$  wird  $\det(A)$  in  $-\det(A)$  überführt.
- (4) Die Determinante einer (z.B. oberen) Dreiecksmatrix ist das Produkt der Einträge ihrer Hauptdiagonale.

**Aufgabe 4/2/010**

Rechenregeln für Determinanten (1)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/1 - 4/2/9 Der Hauptsatz der Determinantentheorie

$K$  sei ein Körper. Geben Sie jeweils einen Beweis oder ein Gegenbeispiel für die angegebenen Determinantenformeln.

- (1) Sind  $A, B \in M(n; K)$ , so ist  $|A + B| = |A| + |B|$ .
- (2) Ist  $A \in M(n; K)$ ,  $\alpha \in K$ , so gilt  $|\alpha A| = \alpha |A|$ .
- (3) Ist  $A \in M(n; K)$ ,  $\alpha \in K$ , so gilt  $|\alpha A| = \alpha^n |A|$ .

**Aufgabe 4/2/025**

Rechenregeln für Determinanten (2)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/1 - 4/2/9 Der Hauptsatz der Determinantentheorie

Wir wählen Matrizen  $A = (a_{ij})$ ,  $B = (b_{ij}) \in M(2; K)$ .

- (1) Drücken Sie die Determinante  $\det(A + B)$  als Summe von Determinanten aus, in denen die Zahlen  $a_{ij}$  (keine Summen!) als Einträge auftreten.
- (2) Sehen Sie eine Verallgemeinerung für den Fall  $A, B \in M(n; K)$  mit  $n > 2$ ?

**Aufgabe 4/2/030****(S: Varianten)**

Bestimmung von Determinanten (1)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden Matrizen  $A$ ,  $B$  und  $C$ .

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

**Lösung.**

(1) Wir erhalten

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 0 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -4 & 6 & -2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ 2 & -4 \end{vmatrix} = 4. \end{aligned}$$

(2) Es ist

$$\begin{aligned} \det(B) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 2. \end{aligned}$$

(3) Die Determinante ergibt sich als

$$\det(C) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

(Die Spalten 1 und 2 sind proportional.)

**Aufgabe 4/2/032**

(S: Varianten)

Bestimmung von Determinanten (2)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 [Rechnen mit Determinanten](#)

Bestimmen Sie die Determinanten der Matrizen

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

über  $\mathbb{F}_5$  und

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

über dem Körper  $\mathbb{F}_2$ .

### Lösung.

(1) Es ist

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

(2) Wir erhalten

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

**Aufgabe 4/2/034**

(S: Varianten)

Bestimmung von Determinanten (3)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

Bestimmen Sie die Determinanten der folgenden komplexen Matrizen:

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} (i-2) & 1 & (2i+1) \\ -2 & (2i-1) & 1 \\ 2 & (i+2) & 2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & i & 1 & 2i \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2i & -1 \end{pmatrix}$$

**Lösung.**

(1) Wir erhalten

$$\begin{aligned} \det(A) &= \begin{vmatrix} (i-2) & 1 & (2i+1) \\ -2 & (2i-1) & 1 \\ 2 & (i+2) & 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ (5i-2) & (2i-1) & 6 \\ 7 & (i+2) & -(5i-2) \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} (5i-2) & 6 \\ 7 & -(5i-2) \end{vmatrix} = -(20i - 21). \end{aligned}$$

(2) Es ist  $\det(B) = (5i - 2)$ .**Aufgabe 4/2/040**

(S: Varianten)

Determinanten mit Parametern (1)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit DeterminantenBestimmen Sie für alle  $t \in \mathbb{R}$  die Determinante der Matrix

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & t & 3t & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2t & t & 0 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Es ist

$$\det(A(t)) = \begin{vmatrix} 0 & t & 3t & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & 2t & t & 0 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{vmatrix} 0 & t & 3t \\ 2 & -1 & 1 \\ -2 & 2t & t \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 2t & t & 4t \\ 0 & -1 & 0 \\ 4t - 2 & 2t & 3t \end{vmatrix} \\
&= - \begin{vmatrix} 2t & 4t \\ 4t - 2 & 3t \end{vmatrix} = 10t^2 - 8t.
\end{aligned}$$

**Aufgabe** 4/2/050

(S: Varianten)

Determinanten mit Parametern (2)

**Index:** Determinante eines Endomorphismus, multilineare Abbildung, Automorphismus**Stoffeinheiten:** 4/2/21 - 4/2/25 Die Determinante eines EndomorphismusWelcher der folgenden Endomorphismen  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  ist ein Automorphismus?

- (1)  $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1, -x_2, 2x_1 + 2x_2 + x_3)$ .
- (2)  $f_t(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_3, -x_1 - x_2 + 3x_3, tx_3 + 3x_1 + 3x_2)$   
(für eine gegebene Zahl  $t \in \mathbb{R}$ ).

**Lösung.**

- (1) Die Matrix von
- $f$
- ist

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

sie hat die Determinante

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \\
&= 2 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2.
\end{aligned}$$

Daher ist  $f$  ein Automorphismus.

- (2) Die Matrix von
- $f_t$
- ist

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & t \end{pmatrix},$$

für ihre Determinante ergibt sich

$$\begin{aligned}
&\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & t \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & t \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$= \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 3 & t \end{vmatrix} = -t - 9.$$

Daher ist  $f_t$  genau dann ein Automorphismus, wenn  $t \neq -9$ .

### Aufgabe 4/2/090

Determinanten und Kettenbrüche

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Entwicklung einer Determinante nach der  $i$ -ten Spalte, Entwicklung einer Determinante nach der  $i$ -ten Zeile

**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

$K$  sei ein Körper. Für  $a_1, \dots, a_n \in K$  setzen wir

$$(a_1, \dots, a_n) := \det \begin{pmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdot & 0 \\ -1 & a_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & \cdot & 0 \\ 0 & -1 & a_3 & 1 & 0 & 0 & \cdot & 0 \\ 0 & 0 & -1 & a_4 & 1 & 0 & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & -1 & a_n \end{pmatrix}.$$

Beweisen Sie:

$$(1) (a_1, \dots, a_n) = a_n \cdot (a_1, \dots, a_{n-1}) + (a_1, \dots, a_{n-2})$$

$$(2) \frac{(a_1, \dots, a_n)}{(a_2, \dots, a_n)} = a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \dots + \frac{1}{a_n}}}$$

### Aufgabe 4/2/100

(S: Varianten)

Determinanten mit Parametern (3)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Rangbestimmung mit Unterdeterminanten

**Stoffeinheiten:** 4/2/19 - 4/2/20 Rangbestimmung mit Unterdeterminanten

Bestimmen Sie den Rang der folgenden Matrix  $A$  in Abhängigkeit von den Parametern  $s, t$  aus dem Körper  $K$ .

$$A = \begin{pmatrix} t - 7s & 3t + 5s & -2t + 8s \\ 6s & -4t - 5s & -3s \\ -t + 5s & 3t - 8s & 2t - 7s \end{pmatrix}$$

**Lösung.** Eine prinzipielle Möglichkeit zur Behandlung solcher Aufgaben ist durch das Determinantenkriterium gegeben; dazu sind die Nullstellen aller Determinanten quadratischer Teilmatrizen zu untersuchen. Wir gehen hier anders vor, dabei werden die folgenden Fälle unterschieden.

$$(1) s = t = 0, \text{ dann ist } A = 0 \text{ und folglich } \text{rang}(A) = 0.$$

(2)  $s = 0$  und  $t \neq 0$ ; dann ergibt sich

$$A = \begin{pmatrix} t & 3t & -2t \\ 0 & -4t & 0 \\ -t & 3t & 2t \end{pmatrix}.$$

Wegen  $t \neq 0$  ist  $\text{rang}(A) = \text{rang}\left(\frac{1}{t} \cdot A\right)$ ,

$$\frac{1}{t} \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & -4 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix},$$

also  $\text{rang}(A) = 2$ .

(3)  $s \neq 0$ , so ist  $\text{rang}(A) = \text{rang}\left(\frac{1}{s} \cdot A\right)$ . Setzen wir  $u = \frac{t}{s}$ , so ist

$$\frac{1}{s} \cdot A = \begin{pmatrix} u-7 & 3u+5 & -2u+8 \\ 6 & -4u-5 & -3 \\ -u+5 & 3u-8 & 2u-7 \end{pmatrix}.$$

Wir berechnen die Determinante

$$\begin{vmatrix} u-7 & 3u+5 & -2u+8 \\ 6 & -4u-5 & -3 \\ -u+5 & 3u-8 & 2u-7 \end{vmatrix} = -42u^2 + 168u - 126$$

und erhalten für  $u \neq 1, 3$  (i.e.  $t \neq s, 3s$ ) einen von 0 verschiedenen Wert, also  $\text{rang}(A) = 3$ . Für  $u = 1$  ist

$$\frac{1}{s} \cdot A = \begin{pmatrix} -6 & 8 & 6 \\ 6 & -9 & -3 \\ 4 & -5 & -5 \end{pmatrix},$$

also  $\text{rang}(A) = 2$ . Für  $u = 3$  ist

$$\frac{1}{s} \cdot A = \begin{pmatrix} -4 & 14 & 2 \\ 6 & -17 & -3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

folglich  $\text{rang}(A) = 2$ .

### Aufgabe 4/2/110

(S: Varianten)

Kofaktoren von Determinanten

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Kofaktoren einer quadratischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

Bestimmen Sie den Kofaktor  $A_{23}$  der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

an der Position  $(2, 3)$ .

**Lösung.**

$$\begin{aligned}
 A_{23} &= (-1)^{2+3} \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{pmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & -3 & 3 \\ -1 & -1 & 0 \\ 3 & -2 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 1 \end{vmatrix} \\
 &= - \begin{vmatrix} -2 & 3 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} = -13.
 \end{aligned}$$

**Aufgabe** 4/2/120

(S: Varianten)

Die adjungierte Matrix (1)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Kofaktoren einer quadratischen Matrix, adjungierte Matrix, inverse Matrix (Determinantenformel)**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

Wir betrachten die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Berechnen Sie  $\text{adj}(A)$  und  $\det(A)$ .
- (2) Geben Sie die inverse Matrix für  $A$  an.

**Lösung.**Es ist  $\text{adj}(A) = {}^t(A_{ij})$  mit

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = -10,$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 3,$$

$$A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 0,$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 6,$$

$$A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -8,$$

$$A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3,$$

also

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -10 & 6 & -8 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Jetzt berechnen wir die Determinante

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ -3 & 0 & 1 \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = 6.$$

Für die inverse Matrix ergibt sich

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -10 & 6 & -8 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

#### Aufgabe 4/2/130

Rechenregeln für Determinanten (3)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Kofaktoren einer quadratischen Matrix, adjungierte Matrix, inverse Matrix (Determinantenformel)

**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 [Rechnen mit Determinanten](#)

Beweisen Sie die folgenden Formeln für die Adjungierte einer Matrix  $A \in M(n; K)$ .

- (1)  $\det(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-1}$ .
- (2)  $\text{adj}(\text{adj}(A)) = A$ , falls  $n = 2$ .
- (3)  $\text{adj}(\text{adj}(A)) = \det(A)^{n-2} \cdot A$ , falls  $n > 2$ .

#### Aufgabe 4/2/140

(S: Varianten)

Die adjungierte Matrix (2)

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Kofaktoren einer quadratischen Matrix, adjungierte Matrix, inverse Matrix (Determinantenformel)

**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 [Rechnen mit Determinanten](#)

Berechnen Sie unter Verwendung der adjungierten Matrix die Inverse zu

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{Q}).$$

**Lösung.** Es ist einfach zu sehen, dass

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -27.$$

Zur Berechnung der Adjungierten sind nur zwei Arten von Minoren zu bestimmen, nämlich

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{und} \quad \begin{vmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -9.$$

Wir erhalten daher

$$\text{adj}(A) = \begin{pmatrix} 0 & 9 & 9 & 9 \\ 9 & 0 & 9 & 9 \\ 9 & 9 & 0 & 9 \\ 9 & 9 & 9 & 0 \end{pmatrix},$$

und für die Inverse ergibt sich

$$A^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 4/2/150

(S: Varianten)

Cramersche Regel

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, Cramersche Regel

**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

Lösen Sie unter Verwendung von Determinanten die folgenden Gleichungssysteme.

$$(1) \quad \begin{cases} 2x + y = 2 \\ -2x + y = -3 \end{cases}$$

$$(2) \quad \begin{cases} x + y = -2y + 2z + 1 \\ -x - z = -2y + z - 1 \\ y - z = -y + 2z \end{cases}$$

### Lösung.

(1) Es ist

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = 4.$$

Daher folgt

$$x = \frac{1}{4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} = \frac{5}{4}.$$

Entsprechend gilt

$$y = \frac{1}{4} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = -\frac{2}{4} = -\frac{1}{2}.$$

(2) Wir schreiben das System in der üblichen Form:

$$\begin{aligned} x + 3y - 2z &= 1 \\ -x + 2y - 2z &= -1 \\ 2y - 3z &= 0 \end{aligned}$$

Für die Determinante der Koeffizientenmatrix ergibt sich

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 5 & -4 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 5 & -4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = -7. \end{aligned}$$

Also ist

$$\begin{aligned} x &= -\frac{1}{7} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} = \frac{7}{7} = 1, \\ y &= -\frac{1}{7} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = \frac{0}{7} = 0, \\ z &= -\frac{1}{7} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{0}{7} = 0, \end{aligned}$$

womit wir die gesuchte Lösung  $(x, y, z)$  erhalten haben.

### Aufgabe 4/2/180

(S: Varianten)

Endomorphismen und Determinanten (1)

**Index:** Determinante eines Endomorphismus, multilineare Abbildung

**Stoffeinheiten:** 4/2/21 - 4/2/25 Die Determinante eines Endomorphismus

Nachfolgend sind lineare Endomorphismen endlichdimensionaler Vektorräume angegeben. Bestimmen Sie in jedem Fall die Determinante.

- (1)  $\varphi: K^n \rightarrow K^n$ , wobei  $\varphi(x_1, \dots, x_n) := (x_1, x_2, 0, \dots, 0)$  ist und  $n \geq 2$ ,
- (2)  $\varphi: V \rightarrow V$ , wobei  $\varphi(v) := 2v$  ist,
- (3)  $K = \mathbb{R}$ ,  $\varphi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  mit
 
$$\varphi(x_1, x_2, x_3) := (x_3, x_1 + x_3, -x_2 + x_3).$$

### Lösung.

- (1) Der Endomorphismus hat bezüglich der Standardbasis die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Die Determinante ist 1 für  $n = 2$  und 0 sonst.

(2) Die Matrix des Endomorphismus bezüglich der Standardbasis ist

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 2 \end{pmatrix},$$

seine Determinante daher  $2^{\dim(V)}$ .

(3) Die Matrix des Endomorphismus  $\varphi$  bezüglich der Standardbasis ist

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

denn  ${}^tS_j(A) = \varphi(e_j)$ . Es folgt

$$\begin{aligned} \det(\varphi) &= \det(A) = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = -1. \end{aligned}$$

### Aufgabe 4/2/190

(S: Varianten)

Endomorphismen und Determinanten (2)

**Index:** Determinante eines Endomorphismus, multilineare Abbildung

**Stoffeinheiten:** 4/2/21 - 4/2/25 Die Determinante eines Endomorphismus

Wir untersuchen Determinanten von Endomorphismen eines endlichdimensionalen  $K$ -Vektorraumes  $V$ .

(1) Es sei  $V = \mathbb{R}^3$  und  $\varphi$  definiert durch

$$\varphi(x, y, z) := (x, x + y - z, x + y).$$

Bestimmen Sie  $\det(\varphi)$ .

(2)  $U$  und  $W$  seien Unterräume, für die  $V = U \oplus W$  gilt. Durch die folgenden Vorschriften sind auf eindeutige Weise lineare Endomorphismen von  $V$  definiert.

$$\psi_1(\mathbf{x} + \mathbf{y}) := \mathbf{x}, \quad \mathbf{x} \in U, \mathbf{y} \in W$$

$$\psi_2(\mathbf{x} + \mathbf{y}) := 2\mathbf{x} - 3\mathbf{y}, \quad \mathbf{x} \in U, \mathbf{y} \in W$$

Bestimmen Sie die Determinanten von  $\psi_1$  und  $\psi_2$ .

(3) Zeigen Sie, dass für jede Zahl  $\alpha \in K$  ein Endomorphismus des Vektorraumes  $V \neq \mathbf{0}$  existiert, dessen Determinante  $\alpha$  ist.

**Lösung.** Wir führen die Rechnungen zu (1) und (2) aus.

(1) Die Matrix des Endomorphismus bezüglich der Standardbasis  $\mathcal{B}$  ist

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daher folgt

$$\det(\varphi) = \det(M_{\mathcal{B}}(\varphi)) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1.$$

- (2) Wir wählen Basen  $\mathcal{B}_U = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r\}$  in  $U$  und  $\mathcal{B}_W = \{\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$  in  $W$ , dann ist  $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_r, \mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_s\}$  eine Basis in  $V$ . Bezüglich  $\mathcal{B}$  haben  $\psi_1$  bzw.  $\psi_2$  die Matrizen

$$M_{\mathcal{B}}(\psi_1) = \begin{pmatrix} 1 & & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

und

$$M_{\mathcal{B}}(\psi_2) = \begin{pmatrix} 2 & & 0 & 0 & \dots & 0 \\ & \ddots & & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & -3 & & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & & -3 \end{pmatrix}$$

Folglich ist  $\det(\psi_1) = 0$  und  $\det(\psi_2) = 2^r \cdot (-3)^s$ .

### Aufgabe 4/2/200

(S: Varianten)

Komplexität der Bestimmung von Determinanten

**Index:** Determinante einer Matrix, multilineare Abbildung, leibnizsche Formel, laplace-scher Entwicklungssatz

**Stoffeinheiten:** 4/2/10 - 4/2/18 Rechnen mit Determinanten

Wir betrachten die reellen Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ -5 & 4 & -3 & 4 \\ -4 & -5 & -4 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \\ -5 & -4 & -3 & 3 \\ -5 & -3 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$$

Benutzen Sie jede der folgenden Methoden zur Berechnung wenigstens einer der Determinanten  $\det(A)$ ,  $\det(B)$ .

- (1) Gaußscher Algorithmus unter Berücksichtigung der Anzahl der auftretenden Permutationen von Zeilen.
- (2) Laplacescher Entwicklungssatz.
- (3) Leibnizsche Formel.

Welches Verfahren ist das einfachste, welches das schnellste?

**Lösung.**

- (1) Mit dem Gaußschen Algorithmus erhalten wir eine zu  $A$  zeilenäquivalente Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 5 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & -\frac{59}{5} & \frac{41}{5} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{474}{59} \end{pmatrix}.$$

$\det(A)$  ist bis auf das Vorzeichen Produkt der Diagonaleinträge dieser Matrix. Die Anzahl der bei den Umformungen aufgetretenen Zeilenpermutationen ist gerade. Daher folgt  $\det(A) = 474$ . Entsprechend ergibt sich  $\det(B) = -198$ .

- (2) Wir entwickeln  $A$  nach der ersten Zeile und erhalten

$$\begin{aligned} \det(A) &= 1 \cdot (-1)^{(1+1)} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 4 & -3 & 4 \\ -5 & -4 & -4 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{(1+2)} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 2 & -2 \\ -5 & -3 & 4 \\ -4 & -4 & -4 \end{vmatrix} + (-5) \cdot (-1)^{(1+3)} \cdot \\ &\begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 \\ -5 & 4 & 4 \\ -4 & -5 & -4 \end{vmatrix} + (-4) \cdot (-1)^{(1+4)} \cdot \begin{vmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -5 & 4 & -3 \\ -4 & -5 & -4 \end{vmatrix} = \\ &= 1 \cdot 138 + 1 \cdot (-32) + (-2) \cdot (-182) + (-1) \cdot (-4) = 474. \end{aligned}$$

Für die zweite Matrix lässt sich  $\det(B)$  durch Entwicklung nach der dritten Spalte schnell bestimmen; es ist

$$\begin{aligned} \det(B) &= \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \\ -5 & -4 & -3 & 3 \\ -5 & -3 & 0 & -4 \end{vmatrix} \\ &= -3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & -1 \\ -5 & -3 & -4 \end{vmatrix} \\ &= -9 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -198. \end{aligned}$$

- (3) Die Leibniz-Formel ist schwer anzuwenden und die Rechnung zeitaufwändig. In unserem Fall müssen wir 24 Terme bestimmen (es gibt  $4! = 24$  Permutationen von 4 Indizes). Die Entwicklung für  $A$  ist

$$\begin{aligned} \det(A) &= \\ &(1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &+ (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &+ (1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &+ (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &+ (-1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &+ (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot (-1) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &+ (-1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (-1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) + (1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot (-5) \cdot (-4)) \\ &= 474. \end{aligned}$$

**Bemerkung.** Wir kennen kein allgemeines Verfahren, mit dem sich Determinanten optimal berechnen lassen. Sinnvoll ist eine Kombination verschiedener Methoden.

In der technischen Ausführung auf dem Computer ist die Zahl der erforderlichen Additionen (Subtraktionen) von eher geringer Bedeutung, aufwändig dagegen das Multiplizieren. Mit dem gaußschen Algorithmus ergibt sich ein Verfahren, bei dem die Determinante einer Matrix vom Typ  $(n, n)$  mit  $O(n^3)$  Multiplikationen bestimmt werden kann.

Das Rechnen mit der Leibniz-Formel ist wesentlich komplexer (wir brauchen  $O((n-1) \cdot n!)$  Multiplikationen, falls die Zwischenergebnisse nicht gespeichert werden).

Hier folgt eine eher „menschliche“ Lösung.

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 & -2 \\ -5 & 4 & -3 & 4 \\ -4 & -5 & -4 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 6 & -4 \\ -5 & -1 & -13 & 9 \\ -4 & -9 & -12 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & 6 & -4 \\ -1 & -13 & 9 \\ -9 & -12 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 5 & -59 & 41 \\ -1 & 0 & 0 \\ -9 & 105 & -81 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} -59 & 41 \\ 105 & -81 \end{vmatrix} = 474.$$

Im zweiten Fall erhalten wir

$$\det(B) = \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & 0 & -1 \\ -5 & -4 & -3 & 3 \\ -5 & -3 & 0 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 0 & -5 \\ 4 & 0 & -1 \\ -5 & -3 & -4 \end{vmatrix}$$

$$= -9 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -5 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -198.$$

### Aufgabe 4/3/010

(S: Varianten)

Beispiele für Bilinearformen (1)

**Index:** multilineare Abbildung, Bilinearform

**Stoffeinheiten:** 4/3/1 - 4/3/4 Die Matrix einer Bilinearform

$\mathbf{x} = (x_1, x_2)$  und  $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$  bezeichnen Vektoren aus  $\mathbb{R}^2$ . Welche der folgenden Abbildungen  $f : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  sind Bilinearformen?

- (1)  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := x_2y_1 - x_2y_2$
- (2)  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 - x_2y_2 + 1$
- (3)  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2$
- (4)  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := 4x_1 + 8x_2 + 5y_1 - 4y_2$
- (5)  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := 2x_1x_2y_1 + 2x_1y_1 + x_2^2y_2 + x_2y_2$

### Ergebnis.

- (1)  $f$  ist Bilinearform.
- (2)  $f$  ist keine Bilinearform.
- (3)  $f$  ist keine Bilinearform.
- (4)  $f$  ist keine Bilinearform.
- (5)  $f$  ist keine Bilinearform.

### Aufgabe 4/3/020

Beispiele für Bilinearformen (2)

**Index:** multilineare Abbildung, Bilinearform, Determinante einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 4/3/1 - 4/3/4 Die Matrix einer Bilinearform

Wir untersuchen Abbildungen  $V \times V \rightarrow K$  für  $K$ -Vektorräume  $V$ . Entscheiden Sie, in welchem Fall Bilinearität vorliegt.

- (1)  $f(x, y) := x \cdot {}^t y$  für den Standardvektorraum  $V = K^n$ ,
- (2)  $g(A, B) := \text{tr}(A \cdot B)$  für den  $K$ -Vektorraum  $V = M(n; K)$ ,
- (3)  $h(A, B) := \det(A \cdot B)$  für den  $K$ -Vektorraum  $V = M(n; K)$ .

### Aufgabe 4/3/030

(S: Varianten)

Bilinearformen und Basiswechsel

**Index:** multilineare Abbildung, Bilinearform, Basiswechsel für Bilinearformen

**Stoffeinheiten:** 4/3/1 - 4/3/4 Die Matrix einer Bilinearform

$f$  sei die Bilinearform auf  $\mathbb{R}^2$ , die durch

$$f((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = 3x_1y_2 - 2x_2y_1 - 2x_2y_2$$

definiert wird.

- (1) Geben Sie die Matrix  $A = M_{\mathcal{B}}(f)$  von  $f$  bezüglich der Basis  $\mathcal{B} = ((2, -1), (-2, -1))$  an.
- (2) Geben Sie die Matrix  $B = M_{\mathcal{B}'}(f)$  von  $f$  bezüglich der Basis  $\mathcal{B}' = ((-1, 1), (-1, -2))$  an.
- (3) Geben Sie die Übergangsmatrix  $U := U_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$  von  $\mathcal{B}'$  zu  $\mathcal{B}$  an und überzeugen Sie sich davon, dass  $B = {}^t U \cdot A \cdot U$  ist.

**Lösung.**

(1) Offensichtlich ist

$$f((2, -1), (2, -1)) = -4$$

$$f((2, -1), (-2, -1)) = -12$$

$$f((-2, -1), (2, -1)) = 8$$

$$f((-2, -1), (-2, -1)) = 0;$$

wir erhalten

$$A = \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) Entsprechend finden wir

$$B = \begin{pmatrix} -3 & 12 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}.$$

(3) Die Übergangsmatrix ist

$$U_{B',B} = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

und

$$\begin{pmatrix} -3 & 12 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -4 & -12 \\ 8 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 4/3/040**

(S: Varianten)

Die symmetrische Matrix einer quadratischen Form

**Index:** quadratische Form, symmetrische Matrix einer quadratischen Form**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische FormenGeben Sie für jede der nachfolgend aufgeführten quadratischen Formen  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  bzw.  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  die zugehörige symmetrische Matrix an.

(1)  $f(x, y) = 2x^2 - 4xy - y^2$

(2)  $f(x, y) = x^2 - 2xy + 2y^2$

(3)  $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 4yz + z^2$

(4)  $f(x, y, z) = -xy - 3xz - y^2 + z^2$

**Ergebnis.**

(1)  $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$

(2)  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$

(3)  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$(4) \quad \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & -3 \\ -1 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 4/3/050****(S: Varianten)**

Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form

**Index:** quadratische Form, symmetrische Bilinearform, Diagonalisierung, quadratische Ergänzung, Rang einer quadratischen Form, Signatur einer symmetrischen Bilinearform**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische FormenGeben Sie für jede der folgenden reellen Matrizen  $A$  eine invertierbare Matrix  $U$  an, für die  ${}^tU \cdot A \cdot U$  diagonal ist.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Welchen Rang und welche Signatur haben die entsprechenden quadratischen Formen?

**Ergebnis.**

$$(1) \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$${}^tU \cdot A \cdot U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -8 \end{pmatrix}.$$

Es folgt  $\text{rang}(A) = 2$ , und  $A$  hat die Signatur 0.

$$(2) \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix},$$

$${}^tU \cdot A \cdot U = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -21 \end{pmatrix},$$

 $\text{rang}(A) = 3$  und  $A$  hat die Signatur  $-1$ .

$$(3) \quad U = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$${}^tU \cdot A \cdot U = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$\text{rang}(A) = 4$  und  $A$  hat die Signatur 0.

### Aufgabe 4/3/060

(S: Varianten)

Diagonalisierung einer quadratischen Form

**Index:** quadratische Form, symmetrische Matrix einer quadratischen Form, symmetrische Diagonalform, Diagonalisierung

**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische Formen

Es sei  $A \in M(n; \mathbb{R})$ , sowie  $\mathbf{q} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  die durch  $\mathbf{q}(\mathbf{x}) := \mathbf{x} \cdot A \cdot {}^t\mathbf{x}$  definierte quadratische Form.

- (1) Zeigen Sie, dass der Wert von  $\mathbf{q}$  nur von  $A + {}^tA$  abhängt. Folgern Sie, dass  $A$  stets durch eine eindeutig bestimmte symmetrische Matrix  $B$  ersetzt werden kann, ohne dass sich dabei die Abbildung  $\mathbf{q}$  ändert.
- (2) Es sei  $n = 3$ ,
 
$$\mathbf{q}(x_1, x_2, x_3) := -3x_1^2 + 6x_1x_2 - 4x_1x_3 - 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 2x_3^2.$$
 Bestimmen Sie die gemäß (1) existierende symmetrische Matrix  $B$  mit der Eigenschaft  $\mathbf{q}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot B \cdot {}^t\mathbf{x}$  für  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ .
- (3) Geben Sie eine Basis des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  an, bezüglich der die unter (2) definierte Form  $\mathbf{q}$  eine Diagonalmatrix besitzt.

### Ergebnis.

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 3 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

- (3) Wir verwenden den symmetrischen gaußschen Algorithmus oder (ganz naiv) die Methode der quadratischen Ergänzung. So ergibt sich eine Basis

$$\mathcal{B} = ((1, 0, 0), (-1, -1, 0), (2, 0, -3)),$$

bezüglich der  $\mathbf{q}$  die Diagonalmatrix

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{q}) = \text{diag}(-3, 1, 30)$$

hat, d.h.  $\mathbf{q}$  ist äquivalent zur quadratischen Form

$$-3x_1^2 + x_2^2 + 30x_3^2.$$

Wer Lust dazu hat, kann durch Multiplikation der Basisvektoren mit Konstanten nun noch erreichen, dass die quadratische Form in die äquivalente Gestalt  $-x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$  transformiert wird.

### Aufgabe 4/3/070

(S: Varianten)

Rechenaufgaben zur positiven Definitheit

**Index:** quadratische Form, symmetrische Matrix einer quadratischen Form, positive Definitheit, Determinantenkriterium

**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische Formen

Stellen Sie fest, welche der folgenden quadratischen Formen  $\mathbf{q} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  positiv definit ist.

- (1)  $\mathbf{q}(x, y, z) = 4xy - 4xz - y^2 - 2yz + z^2$
- (2)  $\mathbf{q}(x, y, z) = x^2 + 4xy + 4yz + 2z^2$
- (3)  $\mathbf{q}(x, y, z) = x^2 + y^2 - 2yz + 2z^2$

**Lösung.** Zunächst werden die zugehörigen symmetrischen Matrizen bestimmt. Wir erhalten in der Reihenfolge der angegebenen Fälle

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Nun wird geprüft, ob alle Hauptminoren positiv definit sind. Sobald ein Hauptminor  $\leq 0$  gefunden wird, ist  $\mathbf{q}$  nicht positiv definit und die jeweilige Rechnung kann abgebrochen werden.

- (1) Für die Matrix  $A$  ergibt sich

$$|0| = 0,$$

$\mathbf{q}$  ist daher nicht positiv definit.

- (2) Wir erhalten für die Matrix  $B$

$$|1| = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -4,$$

also ist  $\mathbf{q}$  nicht positiv definit.

- (3) Entsprechend ergibt sich für  $C$

$$|1| = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1,$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 1,$$

d.h.  $\mathbf{q}$  ist positiv definit.

### Aufgabe 4/3/080

Notwendige Bedingung für positive Definitheit

**Index:** quadratische Form, positive definite quadratische Form

**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische Formen

Es sei  $\mathbf{q} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $\mathbf{q}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j$  eine quadratische Form.

- (1) Zeigen Sie: Falls  $\mathbf{q}$  positiv definit ist, so gilt  $a_{ii} > 0$  für  $i = 1, \dots, n$ .
- (2) Geben Sie ein Beispiel dafür an, dass die Bedingung unter (1) für die positive Definitheit von  $\mathbf{q}$  nicht hinreichend ist.

**Aufgabe 4/3/110**

Ein Gegenbeispiel zur positiven Definitheit

**Index:** quadratische Form, positive definite quadratische Form

**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische Formen

Geben sie einen reellen Vektorraum  $V$  und eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n)$  an sowie eine quadratische Form  $\mathbf{q} : V \rightarrow \mathbb{R}$ , für die beide der folgenden Eigenschaften erfüllt sind.

- a)  $\mathbf{q}(\mathbf{b}_i) > 0$  für  $i = 1, \dots, n$ .
- b)  $\mathbf{q}$  ist nicht positiv definit.

**Aufgabe 4/3/120**

Quadratische Form eines Graphen\*

**Index:** quadratische Form, negativ definite quadratische Form, Determinantenkriterium für positive Definitheit


**Stoffeinheiten:** 4/3/5 - 4/3/16 Quadratische Formen

\* Ein Graph  $\Gamma := (\mathcal{E}, \mathcal{K})$  besteht aus einer (hier endlichen) Menge  $\mathcal{E}$  von *Ecken* und einer Menge  $\mathcal{K}$  zweielementiger Teilmengen von  $\mathcal{E}$ , den *Kanten*. Wir zeichnen ihn durch Angabe von Punkten (Ecken) und Verbindungslinien von Punkten (Kanten). Verwenden wir die Notation  $\mathcal{E} = \{1, \dots, n\}$ , so lässt sich  $\Gamma$  eine quadratische Form  $\mathbf{q}_\Gamma$  auf  $\mathbb{R}^n$  zuordnen durch die Vorschrift

$$\mathbf{q}_\Gamma(x_1, \dots, x_n) := \sum_{i,j \in \{1, \dots, n\}} a_{ij} x_i x_j$$

mit  $a_{ii} := -2$  und  $a_{ij} = a_{ji} := 1$  falls  $\{i, j\} \in \mathcal{K}$ ; anderenfalls setzen wir  $a_{ij} = a_{ji} := 0$ .

- (1) Zeigen Sie, dass für die folgenden beiden Graphen mit jeweils  $n$  Ecken die quadratische Form  $\mathbf{q}_\Gamma$  negativ definit ist (wobei im ersten Fall  $n \geq 1$  und im zweiten  $n \geq 4$  zu wählen ist).



- (2)  $\Gamma$  heißt zusammenhängend, falls sich zwei beliebige Ecken durch eine Folge von Kanten verbinden lassen.  
Finden Sie alle zusammenhängenden Graphen  $\Gamma$ , für die  $\mathbf{q}_\Gamma$  negativ definit ist.

**Aufgabe** 4/3/130

(S: Varianten)

Bestimmung symplektischer Basen

**Index:** alternierende Bilinearform, symplektische Basis**Stoffeinheiten:** 4/3/17 - 4/3/20 Alternierende Bilinearformen

Bestimmen Sie für die nichtausgeartete alternierende Bilinearform  $\mathbf{b}$  auf dem Standardraum  $\mathbb{R}^4$ , die durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 2 & -2 \\ -4 & 0 & -1 & -3 \\ -2 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

definiert wird, eine symplektische Basis.

**Lösung.** Definitionsgemäß ist  $\mathbf{b}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{x} \cdot A \cdot {}^t\mathbf{y}$  die durch  $A$  definierte alternierende Form. Unter den Vektoren  $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_4$  der kanonischen Basis suchen wir zunächst ein Paar, für das  $\mathbf{b}(\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j) \neq 0$  ist. Offenbar ist dies bereits für  $\mathbf{b}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = 4$  erfüllt. Wir setzen

$$\mathbf{b}_1 := \frac{1}{\mathbf{b}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)} \cdot \mathbf{e}_1 = \frac{1}{4}(1, 0, 0, 0),$$

$$\mathbf{b}_2 := \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, 0).$$

Es ergibt sich eine Basis  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$  des von  $\mathbf{e}_1$  und  $\mathbf{e}_2$  erzeugten Unterraumes, bezüglich der die Einschränkung von  $\mathbf{b}$  die Matrix  $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  besitzt. Nun wird als Komplementärraum zu  $\mathbb{R}\mathbf{b}_1 + \mathbb{R}\mathbf{b}_2$  der Unterraum  $W$  aller Vektoren  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$  bestimmt, für die  $\mathbf{b}(\mathbf{b}_1, \mathbf{x}) = \mathbf{b}(\mathbf{b}_2, \mathbf{x}) = 0$  ist.  $W$  ist in unserem Fall die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems, dessen Koeffizientenmatrix aus den ersten beiden Zeilen von  $A$  besteht. Wir erhalten als Erzeugendensystem die Vektoren

$$\mathbf{v}_3 = (-3, 2, 0, 4),$$

$$\mathbf{v}_4 = (-1, -2, 4, 0).$$

Entsprechend wird nun

$$\mathbf{b}_3 := \frac{1}{\mathbf{b}(\mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)} \cdot \mathbf{v}_3 = \frac{1}{16}(3, -2, 0, -4),$$

$$\mathbf{b}_4 := \mathbf{v}_4 = (-1, -2, 4, 0)$$

gesetzt. Wir erhalten eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_4)$ , für die  $\mathbf{b}$  die Matrix

$$M_{\mathcal{B}}(\mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 0 & \mathbf{E}_2 \\ -\mathbf{E}_2 & 0 \end{pmatrix}$$

besitzt, d.h.  $\mathcal{B}$  ist symplektisch.**Aufgabe** 4/4/010

(S: Varianten)

Rechnen mit Basen von Tensorprodukten

**Index:** Tensorprodukt, Rechenregeln für Tensoren, Basis eines Tensorprodukts**Stoffeinheiten:** 4/4/1 - 4/4/8 Das klassifizierende Objekt bilinearer Abbildungen

$V = \mathbb{R}^2$  und  $W = \mathbb{R}^3$  bezeichnen die reellen Standardräume mit den kanonischen Basen  $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ , bzw.  $\mathcal{B}' = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$ . Zerlegen Sie die Tensoren  $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} \in V \otimes_{\mathbb{R}} W$  in Vielfachensummen der Basisvektoren aus  $\mathcal{B} \otimes \mathcal{B}'$ , wobei

- (1)  $\mathbf{v} = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ ,  $\mathbf{w} = 3\mathbf{e}'_1 + \mathbf{e}'_2$ ,  
 (2)  $\mathbf{v} = (-3, -2)$ ,  $\mathbf{w} = (0, 2, -2)$ .

**Ergebnis.**

- (1)  $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} = 3\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_1 + \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_2 + 3\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_1 + \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_2$ .  
 (2) Es ist

$$\mathbf{v} = -3\mathbf{e}_1 - 2\mathbf{e}_2 \text{ und } \mathbf{w} = 2\mathbf{e}'_2 - 2\mathbf{e}'_3,$$

wir erhalten folglich

$$\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} = -6\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_2 + 6\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_3 - 4\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_2 + 4\mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_3.$$

**Aufgabe 4/4/020**

Eigenschaften des Tensorprodukts (1)

**Index:** Tensorprodukt, Rechenregeln für Tensoren, Basis eines Tensorprodukts, Dimension eines Tensorprodukts

**Stoffeinheiten:** [4/4/1 - 4/4/8 Das klassifizierende Objekt bilinearer Abbildungen](#)

Zeigen Sie: Sind  $V$ ,  $W$  und  $P$  Vektorräume, so existieren Isomorphismen (1) bzw. (2), die durch die angegebenen Bedingungen eindeutig bestimmt sind.

- (1)  $V \otimes_K W \cong W \otimes_K V$ ,  $\mathbf{v} \otimes \mathbf{w} \mapsto \mathbf{w} \otimes \mathbf{v}$   
 (2)  $(V \otimes_K W) \otimes_K P \cong V \otimes_K (W \otimes_K P)$ ,  $(\mathbf{v} \otimes \mathbf{w}) \otimes \mathbf{p} \mapsto \mathbf{v} \otimes (\mathbf{w} \otimes \mathbf{p})$

**Aufgabe 4/4/030**

Eigenschaften des Tensorprodukts (2)

**Index:** Tensorprodukt, Rechenregeln für Tensoren, Basis eines Tensorprodukts, Dimension eines Tensorprodukts

**Stoffeinheiten:** [4/4/1 - 4/4/8 Das klassifizierende Objekt bilinearer Abbildungen](#)

Zeigen Sie: Sind  $V$ ,  $W$  und  $P$  Vektorräume, so existieren Isomorphismen (1) bzw. (2), die durch die angegebenen Bedingungen eindeutig bestimmt sind.

- (1)  $(V \oplus W) \otimes_K P \cong (V \otimes_K P) \oplus (W \otimes_K P)$ ,  $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \otimes \mathbf{p} \mapsto (\mathbf{v} \otimes \mathbf{p}, \mathbf{w} \otimes \mathbf{p})$   
 (2)  $\text{Hom}_K(V, \text{Hom}_K(W, P)) \cong \text{Hom}(V \otimes_K W, P)$ ;  
 dabei wird  $\psi \in \text{Hom}_K(V, \text{Hom}_K(W, P))$  die eindeutig bestimmte lineare Abbildung  $V \otimes_K W \rightarrow P$  zugeordnet, die mittels der Tensorabbildung der bilinearen Abbildung  $V \times W \rightarrow P$ ,  $(\mathbf{v}, \mathbf{w}) \mapsto (\psi(\mathbf{v}))(\mathbf{w})$  entspricht.

**Aufgabe 4/4/040**

Eigenschaften des Tensorprodukts (3)

**Index:** Tensorprodukt, Rechenregeln für Tensoren, Basis eines Tensorprodukts, Dimension eines Tensorprodukts, Bifunktorialität des Tensorprodukts

**Stoffeinheiten:** [4/4/1 - 4/4/8 Das klassifizierende Objekt bilinearer Abbildungen](#)

Zeigen Sie: Sind  $V$ ,  $W$ ,  $P$  und  $Q$  Vektorräume sowie  $\varphi_1 : V \rightarrow W$ ,  $\varphi_2 : V \rightarrow W$  und  $\psi : P \rightarrow Q$  lineare Abbildungen, dann gilt

$$(\varphi_1 + \varphi_2) \otimes_K \psi = \varphi_1 \otimes_K \psi + \varphi_2 \otimes_K \psi.$$

**Aufgabe 4/4/060**

(S: Varianten)

Das Kroneckerprodukt (1)

**Index:** Kroneckerprodukt, Tensorprodukt von Matrizen

**Stoffeinheiten:** 4/4/11 - 4/4/12 Kroneckerprodukt von Matrizen

Bestimmen Sie das Kroneckerprodukt  $A \otimes B$  der Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 4 & 6 \\ -4 & -6 & 4 & 6 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ -2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 4/4/070**

(S: Varianten)

Das Kroneckerprodukt (2)

**Index:** Kroneckerprodukt, Tensorprodukt von Matrizen, Basis eines Tensorprodukts

**Stoffeinheiten:** 4/4/11 - 4/4/12 Kroneckerprodukt von Matrizen

Es seien  $\varphi : V \rightarrow W$  und  $\varphi' : V' \rightarrow W'$  lineare Abbildungen der reellen Standardräume  $V = \mathbb{R}^2$ ,  $V' = \mathbb{R}^3$ ,  $W = \mathbb{R}^2$  bzw.  $W' = \mathbb{R}^2$ . Die Homomorphismen  $\varphi$ ,  $\varphi'$  werden durch

$$\varphi(x, y) = (2y, x + y),$$

$$\varphi'(x, y, z) = (2y + 2z, 2x - y)$$

definiert. Geben Sie die Tensorprodukte der Standardbasen für  $V \otimes V'$  sowie  $W \otimes W'$  an und bestimmen Sie die Matrix der linearen Abbildung  $\varphi \otimes \varphi' : V \otimes V' \rightarrow W \otimes W'$  bezüglich dieser Basen.

**Ergebnis.** Mit  $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ ,  $(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$ ,  $(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2)$  bzw.  $(\mathbf{f}'_1, \mathbf{f}'_2)$  bezeichnen wir die Standardbasen für  $V$ ,  $V'$ ,  $W$  bzw.  $W'$ . Dann erhalten wir als Tensorprodukte die Basen

$$(\mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}_1 \otimes \mathbf{e}'_3, \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}_2 \otimes \mathbf{e}'_3) \quad \text{und}$$

$$(\mathbf{f}_1 \otimes \mathbf{f}'_1, \mathbf{f}_1 \otimes \mathbf{f}'_2, \mathbf{f}_2 \otimes \mathbf{f}'_1, \mathbf{f}_2 \otimes \mathbf{f}'_2)$$

für  $V \otimes V'$  bzw.  $W \otimes W'$ . Der Homomorphismus  $\varphi \otimes \varphi'$  hat bezüglich dieser Basen die Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix};$$

wir erhalten sie durch direkte Rechnung oder als Kroneckerprodukt der Matrizen von  $\varphi$  und  $\varphi'$  bezüglich der kanonischen Basen.

### Aufgabe 4/5/005

Eigenschaften des äußeren Produkts

**Index:** Tensorprodukt, äußere Potenz eines Vektorraumes, exakte Folge von Vektorräumen

**Stoffeinheiten:** 4/5/6 - 4/5/8 Symmetrische und äußere Potenzen

Mit  $U$ ,  $V$  und  $W$  werden endlichdimensionale  $K$ -Vektorräume der Dimensionen  $p$ ,  $n$  bzw.  $q$  bezeichnet. Weiter sei

$$\mathbf{0} \longrightarrow U \xrightarrow{\varphi} V \xrightarrow{\psi} W \longrightarrow \mathbf{0}$$

eine exakte Folge. Beweisen Sie:

- (1) Es existiert eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung

$$\Gamma : \Lambda^p(U) \otimes_K \Lambda^q(W) \rightarrow \Lambda^n(V), \text{ für die}$$

$$\Gamma((\mathbf{u}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{u}_p) \otimes (\mathbf{w}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{w}_q)) = \varphi(\mathbf{u}_1) \wedge \dots \wedge \varphi(\mathbf{u}_p) \wedge \mathbf{w}'_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{w}'_q$$

ist, wenn  $\mathbf{u}_i \in U$  und  $\mathbf{w}_j \in W$  sind sowie  $\mathbf{w}'_j \in V$  Vektoren bezeichnen, so dass  $\psi(\mathbf{w}'_j) = \mathbf{w}_j$  gilt.

- (2) Der unter (1) gefundene Homomorphismus  $\Gamma$  ist ein Isomorphismus.

### Aufgabe 4/5/010

(S: Varianten)

Basen äußerer Potenzen

**Index:** äußere Potenz eines Vektorraumes, Basis einer äußeren Potenz von Vektorräumen, Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 4/5/9 - 4/5/18 Symmetrische Algebra und äußere Algebra

Wir betrachten den reellen Standardraum  $V = \mathbb{R}^3$  mit der kanonischen Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ .

- (1) Geben Sie die Basen  $\Lambda^1\mathcal{B}$ ,  $\Lambda^2\mathcal{B}$  und  $\Lambda^3\mathcal{B}$  für die Vektorräume  $\Lambda^1(V)$ ,  $\Lambda^2(V)$  bzw.  $\Lambda^3(V)$  an.
- (2) Bestimmen Sie die Koordinaten der folgenden Vektoren bezüglich der Basen  $\Lambda^i\mathcal{B}$ , und zwar für
- a)  $\mathbf{x}_1 \wedge \mathbf{x}_2$ , wobei  $\mathbf{x}_1 = \mathbf{e}_1 + 2 \cdot \mathbf{e}_3$  und  $\mathbf{x}_2 = 2 \cdot \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - 2 \cdot \mathbf{e}_3$ ,
- und für
- b)  $\mathbf{x}_1 \wedge \mathbf{x}_2 \wedge \mathbf{x}_3$ , wobei  $\mathbf{x}_1 = -2 \cdot \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ ,  $\mathbf{x}_2 = -2 \cdot \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$  und  $\mathbf{x}_3 = -2 \cdot \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$ .

**Ergebnis.**

- (1)  $\Lambda^1\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$   
 $\Lambda^2\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3)$   
 $\Lambda^3\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3).$

(2) Wir erhalten durch Ausmultiplizieren

$$\begin{aligned}
 \text{a) } \mathbf{x}_1 \wedge \mathbf{x}_2 &= 2 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 2 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + 4 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 + 2 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 - 4 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_3 \\
 &= 0 + \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 2 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + 4 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 + 2 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 + 0 \\
 &= \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 2 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 + 4 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_1 + 2 \cdot \mathbf{e}_3 \wedge \mathbf{e}_2 \\
 &= \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 2 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 - 4 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 - 2 \cdot \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3 \\
 &= \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_2 - 6 \cdot \mathbf{e}_1 \wedge \mathbf{e}_3 - 2 \cdot \mathbf{e}_2 \wedge \mathbf{e}_3, \\
 \text{b) } \mathbf{x}_1 \wedge \mathbf{x}_2 \wedge \mathbf{x}_3 &= \mathbf{0},
 \end{aligned}$$

womit in jedem Fall das Koordinatentupel aus den entsprechenden Koeffizienten der Basisvektoren abgelesen werden kann.

**Aufgabe** 4/5/020

(S: Varianten)

Äußere Potenz einer Matrix

**Index:** äußere Potenz einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 4/5/9 - 4/5/18 Symmetrische Algebra und äußere Algebra

Bestimmen Sie die folgenden äußeren Potenzen, und zwar

(1)  $A^2(A)$  für die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \text{ sowie}$$

(2)  $A^3(B)$  für die Matrix

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

**Ergebnis.**

$$(1) \quad A^2(A) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 0 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad A^3(B) = (-8 \ 1 \ 13 \ -10)$$

**Aufgabe** 4/5/030

Beispiel für den Strukturtensor einer Algebra

**Index:** Strukturtensor einer Algebra, gemischter Tensor

**Stoffeinheiten:** 4/5/19 - 4/5/23 Klassische Tensorrechnung

Gegeben sind die Matrizen

$$I := \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad J := \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

als Elemente der  $\mathbb{R}$ -Algebra  $M(2; \mathbb{C})$ . Beweisen Sie, dass  $\mathcal{B} = (E_2, I, J, K)$  mit  $K := I \cdot J$  eine Basis des reellen Vektorraumes  $\mathbb{R}[I, J]$  ist und geben Sie den Strukturtensor der  $\mathbb{R}$ -Algebra  $\mathbb{R}[I, J]$  in Koordinaten bezüglich  $\mathcal{B}$  an.

## Aufgaben zum Kapitel 5

### Aufgabe 5/1/005

(S: Varianten)

Eigenwerte einer reellen Matrix

**Index:** Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches PolynomBestimmen Sie die (reellen!) Eigenwerte der Matrix  $A \in M(4, \mathbb{R})$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -4 & 4 \\ 1 & -1 & -5 & 5 \\ -3 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst das charakteristische Polynom  $f = \chi_A(X) \in \mathbb{R}[X]$  und erhalten

$$\begin{aligned} f = \det(X \cdot E_4 - A) &= \det \begin{pmatrix} X & 1 & 4 & -4 \\ -1 & X+1 & 5 & -5 \\ 3 & -1 & X-1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & X-2 \end{pmatrix} \\ &= X^4 - 2X^3 + 2X^2 - 4X. \end{aligned}$$

Eigenwerte der gegebenen Matrix sind die Nullstellen von  $f$ . Offensichtlich ist  $X$  ein Faktor von  $f$ , es verbleibt nur die Bestimmung der Nullstellen von  $g = X^3 - 2X^2 + 2X - 4$ . Eine können wir erraten: Einsetzen einiger ganzer Zahlen für  $X$  ergibt insbesondere  $g(2) = 0$ ,  $g$  ist daher durch den Linearfaktor  $X - 2$  teilbar. Wir erhalten

$$f = X \cdot (X - 2) \cdot (X^2 + 2).$$

Da der letzte Faktor keine Nullstelle im Grundkörper  $\mathbb{R}$  besitzt, ergeben sich für die Matrix  $A$  genau zwei Eigenwerte 0 und 2.

### Aufgabe 5/1/010

(S: Varianten)

Charakteristische Polynome reeller Matrizen

**Index:** charakteristisches Polynom einer Matrix, Begleitmatrix**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

Bestimmen Sie das charakteristische Polynom der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & -8 & 9 & 5 & 9 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Das charakteristische Polynom  $\chi_A$  ist gleich der Determinante

$$\det(X \cdot E_5 - A) \in \mathbb{R}[X].$$

Die Determinante der charakteristischen Matrix  $B = X \cdot E_5 - A$  wird nach der letzten Zeile mit den Adjunkten  $B'_{5i}$  ( $i = 1, \dots, 5$ ) entwickelt, das sind die folgenden Matrizen:

$$\begin{aligned}
 B'_{51} &= \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ X & -1 & 0 & 0 \\ 0 & X & -1 & 0 \\ 0 & 0 & X & -1 \end{pmatrix}, & B'_{52} &= \begin{pmatrix} X & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & X & -1 & 0 \\ 0 & 0 & X & -1 \end{pmatrix} \\
 B'_{53} &= \begin{pmatrix} X & -1 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & X & -1 \end{pmatrix}, & B'_{54} &= \begin{pmatrix} X & -1 & 0 & 0 \\ 0 & X & -1 & 0 \\ 0 & 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \\
 B'_{55} &= \begin{pmatrix} X & -1 & 0 & 0 \\ 0 & X & -1 & 0 \\ 0 & 0 & X & -1 \\ 0 & 0 & 0 & X \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Die Adjunkten sind entweder obere oder untere Dreiecksmatrizen oder aus solchen block-diagonal zusammengesetzt. Mit den Diagonalelementen  $b_{kk}^{(i)}$  der Adjunkten gilt daher

$$\det(B'_{5i}) = \prod_{k=1}^4 b_{kk}^{(i)}.$$

Es folgt

$$\chi_A = X^5 - 9X^4 - 5X^3 - 9X^2 + 8X + 2.$$

### Aufgabe 5/1/020

Eigenwerte einer Matrix über dem Grundkörper  $\mathbb{F}_2$

**Index:** Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

Wir betrachten die folgenden Matrizen über den Körper  $\mathbb{F}_3$ .

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 (2) \quad & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Geben Sie in jedem Fall die Eigenwerte an!

### Aufgabe 5/1/030

Eigenwerte einer komplexen Matrix

**Index:** Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

Welche Eigenwerte hat die folgende komplexe Matrix?

$$\begin{pmatrix} 1 & i & 1+i \\ 1+i & -1+i & 2i \\ -1 & -i & -1-i \end{pmatrix}$$

**Aufgabe** 5/1/040

Reelle und komplexe Eigenwerte einer reellen Matrix

**Index:** Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

Es seien

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie alle Eigenwerte von  $A$  und  $B$  an, wenn diese

- (1) als Matrizen aus  $M(2; \mathbb{R})$  bzw.
- (2) als Matrizen aus  $M(2; \mathbb{C})$  betrachtet werden.

**Aufgabe** 5/1/050

Eigenwerte und Eigenräume von Matrizen

**Index:** Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

Bestimmen Sie für folgende Matrizen die Eigenwerte und zugehörigen Eigenräume (jeweils durch Angabe einer Basis).

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R})$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{pmatrix} \in M(2; \mathbb{C})$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{F}_2)$$

**Aufgabe** 5/1/060

Eigenwerte symmetrischer Matrizen

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren

Es sei  $A \in M(n; \mathbb{R})$  eine symmetrische Matrix (d.h.  $A = {}^tA$ ). Beweisen Sie, dass alle komplexen Eigenwerte von  $A$  reell sind.

**Aufgabe** 5/1/070

Eigenwerte von Quadraten

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren

$A$  sei eine quadratische Matrix über  $\mathbb{C}$ . Beweisen Sie: Die Eigenwerte der Matrix  $A^2$  sind genau die Quadrate der Eigenwerte von  $A$ .

**Aufgabe 5/1/080**

Eigenwerte, Eigenschaften

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren](#) $A \in M(n; \mathbb{C})$  sei eine komplexe Matrix. Beweisen Sie:

- (1) Falls  $A$  den Rang  $r$  hat, so besitzt  $A$  höchstens  $r$  von 0 verschiedene Eigenwerte (die mit der jeweiligen algebraischen Multiplizität gezählt werden).
- (2) Ist  $r = 1$ , so gilt: Der einzige eventuell von 0 verschiedene Eigenwert von  $A$  ist die Spur  $\text{tr}(A)$  der Matrix  $A$ .

**Aufgabe 5/1/090**

Potenzen von Eigenwerten

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren](#) $\varphi : V \rightarrow V$  sei Endomorphismus des  $K$ -Vektorraumes  $V$  und  $k \geq 1$  eine natürliche Zahl. Zeigen Sie:

- (1) Ist  $\lambda \in K$  Eigenwert von  $\varphi$ , so ist  $\lambda^k$  Eigenwert des Endomorphismus  $\varphi^k$ .
- (2) Ist  $\mathbf{x} \in V$  Eigenvektor von  $\varphi$  zum Eigenwert  $\lambda$ , so ist  $\mathbf{x} \in V$  Eigenvektor von  $\varphi^k$  zum Eigenwert  $\lambda^k$ .

**Aufgabe 5/1/100**

Eigenwerte von Dreiecksmatrizen

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren](#) $A = (a_{ij}) \in M(n; K)$  sei eine obere Dreiecksmatrix. Zeigen Sie, dass  $\{a_{11}, \dots, a_{nn}\}$  die Menge der Eigenwerte von  $A$  ist.**Aufgabe 5/1/110**

Eigenwerte und Regularität

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/1/1 - 5/1/3 Eigenwerte und Eigenvektoren](#)Zeigen Sie:  $A \in M(n; K)$  ist genau dann regulär, wenn 0 kein Eigenwert der Matrix  $A$  ist.**Aufgabe 5/1/120**

Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (1)

**Index:** Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom](#)

$A \in M(n; \mathbb{R})$  sei eine Matrix und  $\lambda \geq 0$  Eigenwert der Matrix  $A^2$ . Beweisen Sie, dass dann eine der Zahlen  $\sqrt{\lambda}$  oder  $-\sqrt{\lambda}$  Eigenwert von  $A$  ist.

### Aufgabe 5/1/130

Gemeinsame Basen aus Eigenvektoren

**Index:** Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom

Beweisen Sie: Ist  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$  eine Basis des Standardraumes  $K^n$  und sind die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$  Eigenvektoren sowohl der Matrix  $A \in M(n; K)$  als auch der Matrix  $B \in M(n; K)$ , dann gilt  $A \cdot B = B \cdot A$ .

### Aufgabe 5/2/010

(S: Varianten)

Diagonalisierbarkeit einer Matrix über den reellen Zahlen

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

Zeigen Sie, dass die reelle Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -5 & -8 & 0 \\ 4 & 7 & 0 \\ 20 & 40 & -1 \end{pmatrix}$$

diagonalisierbar ist und geben Sie eine Diagonalmatrix  $D$  sowie eine reguläre Matrix  $U$  mit der Eigenschaft  $D = U^{-1} \cdot A \cdot U$  an.

**Lösung.** Zunächst wird das charakteristische Polynom der gegebenen Matrix bestimmt.  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A)$  ist z.B. durch Entwicklung nach der letzten Spalte zu ermitteln.

$$\begin{aligned} \chi_A &= \det \begin{pmatrix} X+5 & 8 & 0 \\ -4 & X-7 & 0 \\ -20 & -40 & X+1 \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} X+5 & 8 \\ -4 & X-7 \end{pmatrix} \cdot (X+1) \\ &= (X-3) \cdot (X+1)^2 \end{aligned}$$

Nullstellen sind die Eigenwerte 3 und  $-1$  der Matrix  $A$ .

Zur Bestimmung des Eigenraumes zum Eigenwert  $\lambda = 3$  haben wir das homogene lineare Gleichungssystem mit der Koeffizientenmatrix  $\lambda \cdot E_3 - A$ , d.h. das System

$$\begin{aligned} 8x_1 + 8x_2 &= 0 \\ -4x_1 - 4x_2 &= 0 \\ -20x_1 - 40x_2 + 4x_3 &= 0 \end{aligned}$$

zu lösen. Eine Basis seines eindimensionalen Lösungsraumes ist der Vektor  $\mathbf{v}_1 = (-1, 1, 5)$ . (Es genügt hier, einen von Null verschiedenen Lösungsvektor zu erraten, da  $\dim(V_3) = 1$  von vornherein klar ist.)

Entsprechend ergibt sich zum Eigenwert  $\lambda = -1$  das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned}4x_1 + 8x_2 &= 0 \\ -4x_1 - 8x_2 &= 0 \\ -20x_1 - 40x_2 &= 0\end{aligned}$$

für den Eigenraum  $V_{-1}$ ; mit dem Gaußschen Algorithmus finden wir eine Basis  $(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = ((-2, 1, 0), (0, 0, 1))$ . Folglich hat der Eigenwert  $\lambda = -1$  die geometrische Multiplizität 2. Da für beide Eigenwerte algebraische und geometrische Multiplizität übereinstimmen, ist  $A$  diagonalisierbar. Mit der Übergangsmatrix

$$U = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

von  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  zur kanonischen Basis erhalten wir ohne weitere Rechnung die Diagonalmatrix

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = U^{-1} \cdot A \cdot U$$

in der Ähnlichkeitsklasse von  $A$ .

**Anmerkung.** Geschicktes Rechnen kann den Aufwand beträchtlich verringern. So ist es beispielsweise nach der Bestimmung von  $\chi_A$  schon klar, dass der Eigenraum  $V_{-1}$  nur die Dimension 1 oder 2 haben kann.  $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)$  ist offensichtlich ein Eigenvektor der gegebenen Matrix  $A$ . Lässt sich ein weiterer Eigenvektor zum Eigenwert  $\lambda = -1$  erraten, der kein Vielfaches von  $\mathbf{e}_3$  ist, so ist damit bereits eine Basis für  $V_{-1}$  gefunden. Im vorliegenden Beispiel wäre dies mit  $\mathbf{v}_2 = (-2, 1, 0)$  nicht besonders schwierig gewesen.

### Aufgabe 5/2/024

(S: Varianten)

Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (1)

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

Entscheiden Sie, welche der folgenden drei Matrizen  $A^{(i)}$  über dem Körper  $\mathbb{R}$  diagonalisierbar ist:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -2 \\ -2 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{pmatrix} -3 & 3 & -2 \\ -5 & 5 & -3 \\ 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad A^{(3)} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 \\ 2 & -5 & 5 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Jede der Matrizen hat die Zahl 1 als Eigenwert.

**Lösung.** Um eine Matrix auf Diagonalisierbarkeit zu untersuchen, werden zunächst ihre Eigenwerte, also die Nullstellen des charakteristischen Polynoms bestimmt.

In unserem Falle sind zunächst die drei charakteristischen Polynome  $\chi_{A^{(i)}}$  aus  $\mathbb{R}[X]$  für  $i = 1, 2, 3$  zu berechnen, d.h. die Determinanten der charakteristischen Matrizen  $B^{(i)} = X \cdot E_3 - A^{(i)}$ . Es gilt

$$\chi_{A^{(i)}} = \det(B^{(i)}).$$

Die Leibnizsche Formel (vgl. 4/2/6) führt im Falle der Dimension 3 auf die Sarrussche Regel

$$\chi_{A^{(i)}} = b_{11}^{(i)}b_{22}^{(i)}b_{33}^{(i)} + b_{12}^{(i)}b_{23}^{(i)}b_{31}^{(i)} + b_{13}^{(i)}b_{21}^{(i)}b_{32}^{(i)}$$

$$-b_{13}^{(i)}b_{22}^{(i)}b_{31}^{(i)} - b_{12}^{(i)}b_{21}^{(i)}b_{33}^{(i)} - b_{11}^{(i)}b_{23}^{(i)}b_{32}^{(i)}.$$

Für  $i = 1$  ist

$$B^{(1)} = \begin{pmatrix} X+1 & -3 & 2 \\ 2 & X-5 & 3 \\ 0 & -2 & X+1 \end{pmatrix}.$$

Die angegebenen Produkte in der sarrusschen Regel sind

$$b_{11}^{(1)}b_{22}^{(1)}b_{33}^{(1)} = X^3 - 3X^2 - 9X - 5, \quad b_{12}^{(1)}b_{23}^{(1)}b_{31}^{(1)} = 0, \quad b_{13}^{(1)}b_{21}^{(1)}b_{32}^{(1)} = -8, \\ b_{13}^{(1)}b_{22}^{(1)}b_{31}^{(1)} = 0, \quad b_{12}^{(1)}b_{21}^{(1)}b_{33}^{(1)} = -6X - 6, \quad b_{11}^{(1)}b_{23}^{(1)}b_{32}^{(1)} = -6X - 6.$$

Es folgt

$$\chi_{A^{(1)}} = X^3 - 3X^2 + 3X - 1.$$

Analog ergeben sich

$$\chi_{A^{(2)}} = X^3 + X^2 - 2,$$

$$\chi_{A^{(3)}} = X^3 + 3X^2 - X - 3.$$

Nach dem Hinweis zur Aufgabe müssen die charakteristischen Polynome durch  $X - 1$  teilbar sein, daher sind nur noch die Nullstellen der quadratischen Polynome  $\psi_{A^{(i)}} = \chi_{A^{(i)}} / (X - 1)$  zu untersuchen. Die Division ergibt

$$\psi_{A^{(1)}} = X^2 - 2X + 1,$$

$$\psi_{A^{(2)}} = X^2 + 2X + 2,$$

$$\psi_{A^{(3)}} = X^2 + 4X + 3.$$

Das Polynom  $\psi_{A^{(1)}}$  besitzt eine Doppelnullstelle mit dem Wert 1, das Polynom  $\psi_{A^{(2)}}$  keine reellen Nullstellen und das Polynom  $\psi_{A^{(3)}}$  zwei verschiedene reelle Nullstellen ungleich 1. Die Frage nach der Diagonalisierbarkeit lässt sich nun beantworten:

Nur die Matrix  $A^{(3)}$  ist diagonalisierbar.

**Begründung.** Alle Eigenwerte der Matrix  $A^{(3)}$  sind reell und haben die algebraische Vielfachheit 1.

Die übrigen können folgendermaßen ausgeschlossen werden: Aus der Diagonalisierbarkeit folgt, dass das charakteristische Polynom über  $\mathbb{R}$  in ein Produkt von Linearfaktoren zerfällt – dies ist nicht der Fall, wenn ein Paar konjugiert komplexer Nullstellen auftritt. Ist eine Matrix mit einem einzigen Eigenwert diagonalisierbar, so ist sie bereits selbst eine Diagonalmatrix – dies ist jedoch hier nicht der Fall.

### Aufgabe 5/2/025

(S: Varianten)

Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (2)

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

Entscheiden Sie, welche der folgenden Matrizen  $A^{(i)}$  über dem Körper  $\mathbb{R}$  diagonalisierbar ist:

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -5 \\ -3 & 5 & -5 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \quad A^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 2 & -5 & 4 \\ 2 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Jede der Matrizen hat die Zahl 1 als Eigenwert.

**Lösung.** Um eine Matrix auf Diagonalisierbarkeit zu untersuchen, werden zunächst ihre Eigenwerte, also die Nullstellen des charakteristischen Polynoms bestimmt.

In unserem Falle sind zunächst die beiden charakteristischen Polynome  $\chi_{A^{(i)}}$  aus  $\mathbb{R}[X]$  mit  $i = 1, 2$  zu berechnen, d.h. die Determinanten der charakteristischen Matrizen  $B^{(i)} = X \cdot E_3 - A^{(i)}$ . Es gilt

$$\chi_{A^{(i)}} = \det(B^{(i)}).$$

Die leibnizsche Formel (vgl. 4/2/6) führt im Falle der Dimension 3 auf die sarrussche Regel

$$\begin{aligned} \chi_{A^{(i)}} &= b_{11}^{(i)} b_{22}^{(i)} b_{33}^{(i)} + b_{12}^{(i)} b_{23}^{(i)} b_{31}^{(i)} + b_{13}^{(i)} b_{21}^{(i)} b_{32}^{(i)} \\ &\quad - b_{13}^{(i)} b_{22}^{(i)} b_{31}^{(i)} - b_{12}^{(i)} b_{21}^{(i)} b_{33}^{(i)} - b_{11}^{(i)} b_{23}^{(i)} b_{32}^{(i)}. \end{aligned}$$

Für  $i = 1$  ist

$$B^{(1)} = \begin{pmatrix} X+2 & -4 & 5 \\ 3 & X-5 & 5 \\ 0 & -1 & X+2 \end{pmatrix}.$$

Die angegebenen Produkte in der sarrusschen Regel sind

$$\begin{aligned} b_{11}^{(1)} b_{22}^{(1)} b_{33}^{(1)} &= X^3 - X^2 - 16X - 20, & b_{12}^{(1)} b_{23}^{(1)} b_{31}^{(1)} &= 0, & b_{13}^{(1)} b_{21}^{(1)} b_{32}^{(1)} &= -15, \\ b_{13}^{(1)} b_{22}^{(1)} b_{31}^{(1)} &= 0, & b_{12}^{(1)} b_{21}^{(1)} b_{33}^{(1)} &= -12X - 24, & b_{11}^{(1)} b_{23}^{(1)} b_{32}^{(1)} &= -5X - 10. \end{aligned}$$

Es folgt

$$\chi_{A^{(1)}} = X^3 - X^2 + X - 1.$$

Analog ergibt sich

$$\chi_{A^{(2)}} = X^3 + 3X^2 - X - 3.$$

Nach dem Hinweis zur Aufgabe müssen die charakteristischen Polynome durch  $X - 1$  teilbar sein, daher sind nur noch die Nullstellen der quadratischen Polynome  $\psi_{A^{(i)}} = \chi_{A^{(i)}} / (X - 1)$  zu untersuchen. Die Division ergibt

$$\psi_{A^{(1)}} = X^2 + 1,$$

$$\psi_{A^{(2)}} = X^2 + 4X + 3.$$

Das Polynom  $\psi_{A^{(1)}}$  besitzt keine reellen Nullstellen und das Polynom  $\psi_{A^{(2)}}$  besitzt zwei verschiedene reelle Nullstellen ungleich 1. Die Frage nach der Diagonalisierbarkeit lässt sich nun beantworten:

Nur die Matrix  $A^{(2)}$  ist diagonalisierbar.

**Begründung.** Alle Eigenwerte der Matrix  $A^{(2)}$  sind reell und haben die algebraische Vielfachheit 1.

Die andere Matrix kann folgendermaßen ausgeschlossen werden: Aus der Diagonalisierbarkeit folgt, dass das charakteristische Polynom über  $\mathbb{R}$  in ein Produkt von Linearfaktoren zerfällt – dies ist nicht der Fall, wenn ein Paar konjugiert komplexer Nullstellen auftritt.

**Aufgabe 5/2/026**

(S: Varianten)

Nichtdiagonalisierbarkeit, reelle Eigenwerte

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

Entscheiden Sie, ob die folgende Matrix  $A$  über dem Körper  $\mathbb{R}$  diagonalisierbar ist:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -4 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Die Matrix hat die Zahl 1 als Eigenwert.

**Lösung.** Um eine Matrix auf Diagonalisierbarkeit zu untersuchen, werden zunächst ihre Eigenwerte, also die Nullstellen des charakteristischen Polynoms bestimmt.

Dazu ist zunächst das charakteristische Polynom  $\chi_A$  aus  $\mathbb{R}[X]$  mit zu berechnen, d.h. die Determinante der charakteristischen Matrix  $B = X \cdot E_3 - A$ . Es gilt

$$\chi_A = \det(B).$$

Die leibnizsche Formel (vgl. 4/2/6) führt im Falle der Dimension 3 auf die sarrussche Regel

$$\begin{aligned} \chi_A &= b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} \\ &\quad - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{11}b_{23}b_{32}. \end{aligned}$$

Die charakteristische Matrix ist

$$B = \begin{pmatrix} X-5 & 4 & 2 \\ -4 & X+3 & 2 \\ -1 & 0 & X+1 \end{pmatrix}.$$

Die angegebenen Produkte in der sarrusschen Regel sind

$$\begin{aligned} b_{11}b_{22}b_{33} &= X^3 - X^2 - 17X - 15, & b_{12}b_{23}b_{31} &= -8, & b_{13}b_{21}b_{32} &= 0, \\ b_{13}b_{22}b_{31} &= -2X - 6, & b_{12}b_{21}b_{33} &= -16X - 16, & b_{11}b_{23}b_{32} &= 0. \end{aligned}$$

Es folgt

$$\chi_A = X^3 - X^2 + X - 1.$$

Nach dem Hinweis zur Aufgabe muss das charakteristische Polynom durch  $X - 1$  teilbar sein, daher sind nur noch die Nullstellen des quadratischen Polynoms  $\psi_A = \chi_A / (X - 1)$  zu untersuchen. Die Division ergibt

$$\psi_A = X^2 + 1.$$

Das Polynom  $\psi_A$  hat eine Doppelnulstelle ebenfalls mit dem Wert 1. Die Frage nach der Diagonalisierbarkeit lässt sich nun beantworten:

Die Matrix  $A$  ist nicht diagonalisierbar.

**Begründung.** Ist eine Matrix mit einem einzigen Eigenwert diagonalisierbar, so ist sie bereits selbst eine Diagonalmatrix – dies ist jedoch hier nicht der Fall.

**Aufgabe** 5/2/027

(S: Varianten)

Nichtdiagonalisierbarkeit, komplexe Eigenwerte

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

Entscheiden Sie, ob die folgende Matrix  $A$  über dem Körper  $\mathbb{R}$  diagonalisierbar ist:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & -5 \\ 3 & -1 & -5 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Die Matrix hat die Zahl 1 als Eigenwert.

**Lösung.** Um eine Matrix auf Diagonalisierbarkeit zu untersuchen, werden zunächst ihre Eigenwerte, also die Nullstellen des charakteristischen Polynoms bestimmt.

Dazu ist zunächst das charakteristische Polynom  $\chi_A$  aus  $\mathbb{R}[X]$  mit zu berechnen, d.h. die Determinante der charakteristischen Matrix  $B = X \cdot E_3 - A$ . Es gilt

$$\chi_A = \det(B).$$

Die leibnizsche Formel (vgl. 4/2/6) führt im Falle der Dimension 3 auf die sarrussche Regel

$$\begin{aligned} \chi_A &= b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} \\ &\quad - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{11}b_{23}b_{32}. \end{aligned}$$

Die charakteristische Matrix ist

$$B = \begin{pmatrix} X-5 & 1 & 5 \\ -3 & X+1 & 5 \\ -2 & 0 & X+1 \end{pmatrix}.$$

Die angegebenen Produkte in der sarrusschen Regel sind

$$\begin{aligned} b_{11}b_{22}b_{33} &= X^3 - 3X^2 - 9X - 5, & b_{12}b_{23}b_{31} &= -10, & b_{13}b_{21}b_{32} &= 0, \\ b_{13}b_{22}b_{31} &= -10X - 10, & b_{12}b_{21}b_{33} &= -3X - 3, & b_{11}b_{23}b_{32} &= 0. \end{aligned}$$

Es folgt

$$\chi_A = X^3 - 3X^2 + 4X - 2.$$

Nach dem Hinweis zur Aufgabe muss das charakteristische Polynom durch  $X - 1$  teilbar sein, daher sind nur noch die Nullstellen des quadratischen Polynoms  $\psi_A = \chi_A / (X - 1)$  zu untersuchen. Die Division ergibt

$$\psi_A = X^2 - 2X + 2.$$

Das Polynom  $\psi_A$  besitzt keine reellen Nullstellen, d.h.  $\chi_A$  ist kein Produkt von reellen Linearfaktoren. Die Frage nach der Diagonalisierbarkeit lässt sich nun beantworten:

Die Matrix  $A$  ist über  $\mathbb{R}$  nicht diagonalisierbar.

**Aufgabe** 5/2/028

(S: Varianten)

Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (3)

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus

Entscheiden Sie, ob die folgende Matrix  $A$  über dem Körper  $\mathbb{R}$  diagonalisierbar ist:

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 5 & -3 \\ -3 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Die Matrix hat die Zahl 1 als Eigenwert.

**Lösung.** Um eine Matrix auf Diagonalisierbarkeit zu untersuchen, werden zunächst ihre Eigenwerte, also die Nullstellen des charakteristischen Polynoms bestimmt.

Dazu ist zunächst das charakteristische Polynom  $\chi_A$  aus  $\mathbb{R}[X]$  mit zu berechnen, d.h. die Determinante der charakteristischen Matrix  $B = X \cdot E_3 - A$ . Es gilt

$$\chi_A = \det(B).$$

Die leibnizsche Formel (vgl. 4/2/6) führt im Falle der Dimension 3 auf die sarrussche Regel

$$\begin{aligned} \chi_A &= b_{11}b_{22}b_{33} + b_{12}b_{23}b_{31} + b_{13}b_{21}b_{32} \\ &\quad - b_{13}b_{22}b_{31} - b_{12}b_{21}b_{33} - b_{11}b_{23}b_{32}. \end{aligned}$$

Die charakteristische Matrix ist

$$B = \begin{pmatrix} X+5 & -5 & 3 \\ 3 & X-1 & -3 \\ 1 & 0 & X-2 \end{pmatrix}.$$

Die angegebenen Produkte in der sarrusschen Regel sind

$$\begin{aligned} b_{11}b_{22}b_{33} &= X^3 + 2X^2 - 13X + 10, & b_{12}b_{23}b_{31} &= 15, & b_{13}b_{21}b_{32} &= 0, \\ b_{13}b_{22}b_{31} &= 3X - 3, & b_{12}b_{21}b_{33} &= -15X + 30, & b_{11}b_{23}b_{32} &= 0. \end{aligned}$$

Es folgt

$$\chi_A = X^3 + 2X^2 - X - 2.$$

Nach dem Hinweis zur Aufgabe muss das charakteristische Polynom durch  $X - 1$  teilbar sein, daher sind nur noch die Nullstellen des quadratischen Polynoms  $\psi_A = \chi_A / (X - 1)$  zu untersuchen. Die Division ergibt

$$\psi_A = X^2 + 3X + 2.$$

Das Polynom  $\psi_A$  besitzt zwei verschiedene reelle Nullstellen ungleich 1. Die Frage nach der Diagonalisierbarkeit lässt sich nun beantworten:

Die Matrix  $A$  ist diagonalisierbar.

**Begründung.** Alle Eigenwerte der Matrix  $A$  sind reell und haben die algebraische Vielfachheit 1.

### Aufgabe 5/2/030

Diagonalisierbarkeit

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

Stellen Sie fest, welche der folgenden Matrizen sich diagonalisieren lässt.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad B = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -7 & 5 & -1 \\ -6 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/2/040**

Diagonalisierbarkeit, Eigenschaften

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)Untersuchen Sie, ob die folgende Matrix  $A \in M(4; \mathbb{F}_3)$  diagonalisierbar ist und geben Sie in diesem Fall für den Standardraum  $\mathbb{F}_3^4$  eine Basis aus Eigenvektoren an.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/2/050**

Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (1)

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)Zeigen Sie, dass die folgende Matrix  $A$  diagonalisierbar ist und bestimmen Sie eine reguläre Matrix  $U$ , für die  $U^{-1} \cdot A \cdot U$  eine Diagonalmatrix ist.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/2/060**

Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (2)

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)Wir betrachten die folgende Matrix  $A$  über dem Körper  $\mathbb{F}_2$ . Zeigen Sie, dass  $A$  diagonalisierbar ist und geben Sie eine Diagonalmatrix  $B$  an sowie eine reguläre Matrix  $U$ , für die  $B = U^{-1} \cdot A \cdot U$  ist.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/2/070**

Diagonalisierbarkeit einer Drehmatrix

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)Für welche  $\varphi \in \mathbb{R}$  ist die *Drehmatrix*

$$M(\varphi) := \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

über dem Körper  $\mathbb{R}$  diagonalisierbar?

### Aufgabe 5/2/080

Diagonalisierbarkeit in Abhängigkeit von einem Parameter

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 [Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

Für welche  $t \in \mathbb{R}$  ist die Matrix

$$A_t = \begin{pmatrix} t+1 & -t+2 & 0 \\ -t+2 & t+1 & 0 \\ -\frac{1}{2}t+2 & -\frac{1}{2}t+1 & t \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R})$$

über dem Körper  $\mathbb{C}$  diagonalisierbar?

### Aufgabe 5/2/090

Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit einer Dreiecksmatrix

**Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 [Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

Zeigen Sie: Für die Diagonalisierbarkeit einer oberen Dreiecksmatrix ist es hinreichend, dass die Diagonalelemente paarweise verschieden sind.

### Aufgabe 5/2/100

Diagonalisierbarkeit der Ableitung

**Index:** diagonalisierbarer Endomorphismus, diagonalisierbare Matrix, Eigenwert einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 [Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

$V$  sei der Unterraum des  $\mathbb{R}$ -Vektorraumes aller Abbildungen von  $\mathbb{R}$  in  $\mathbb{R}$ , der von den Abbildungen  $1$ ,  $\sin(x)$ ,  $\cos(x)$  erzeugt wird.

(1) Zeigen Sie:  $\dim_{\mathbb{R}}(V) = 3$ .

(2) Es sei  $\varphi : V \rightarrow V$  der lineare Endomorphismus  $f \mapsto \frac{d}{dx}(f)$  von  $V$ , der durch die Ableitung definiert wird. Ist  $\varphi$  diagonalisierbar?

### Aufgabe 5/2/110

Endomorphismen und charakteristische Polynome

**Index:** charakteristisches Polynom eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 5/2/1 - 5/2/7 [Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

Geben Sie für  $n \geq 2$  eine lineare Abbildung  $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  und eine lineare Abbildung  $\psi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$  an, für die  $\varphi \neq \psi$  gilt, deren charakteristische Polynome jedoch übereinstimmen.

**Aufgabe 5/2/120**

Charakteristisches Polynom und Minimalpolynom

**Index:** charakteristisches Polynom einer Matrix, Einsetzen einer Matrix in ein Polynom**Stoffeinheiten:** [5/1/4 - 5/1/9 Charakteristisches Polynom](#)

Bestimmen Sie für folgende Matrizen die charakteristischen Polynome sowie ein normiertes Polynom  $f \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\}$  minimalen Grades, für das  $f(A)$  die Nullmatrix ist.

$$(1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in M(3; \mathbb{R})$$

$$(2) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{R})$$

**Aufgabe 5/2/130**

Simultane Eigenwerte

**Index:** Eigenwert eines Endomorphismus, Eigenvektor eines Endomorphismus**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

Wir betrachten einen endlichdimensionalen Vektorraum  $V$  über den komplexen Zahlen und zwei lineare Endomorphismen  $\varphi$  und  $\psi$  von  $V$ . Beweisen Sie:

- (1)  $\varphi \cdot \psi$  und  $\psi \cdot \varphi$  besitzen einen gemeinsamen Eigenwert.
- (2) Ist  $\varphi \cdot \psi = \psi \cdot \varphi$ , so besitzen  $\varphi$  und  $\psi$  einen gemeinsamen Eigenvektor.

**Aufgabe 5/2/140**

Zerlegung eines Endomorphismus in eine Summe diagonalisierbarer Endomorphismen

**Index:** Eigenwert eines Endomorphismus, Eigenvektor eines Endomorphismus, diagonalisierbarer Endomorphismus**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

$K$  sei ein unendlicher Körper,  $V$  ein endlichdimensionaler  $K$ -Vektorraum. Zeigen Sie, dass unter dieser Voraussetzung jeder Endomorphismus von  $V$  Summe zweier diagonalisierbarer Endomorphismen ist.

**Aufgabe 5/2/150**Diagonalisierbarkeit von  $f(A)$  für  $f \in K[X]$ **Index:** diagonalisierbare Matrix, Eigenvektor einer Matrix, Einsetzen einer Matrix in ein Polynom**Stoffeinheiten:** [5/2/1 - 5/2/7 Diagonalisierbarkeit eines Endomorphismus](#)

$A \in M(n; K)$  sei eine Matrix über dem Körper  $K$  sowie  $f$  ein Polynom mit Koeffizienten aus  $K$ . Beweisen Sie: Wenn  $A$  diagonalisierbar ist, dann ist auch  $f(A)$  diagonalisierbar.

**Aufgabe** 5/2/160

Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (2)

**Index:** charakteristisches Polynom einer Matrix, Eigenwert einer Matrix, diagonalisierbare Matrix, halbeinfache Matrix, Eigenvektor einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/2/8 - 5/2/12 Halbeinfache Endomorphismen

Wir betrachten die reelle Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Zeigen Sie:

- (1) Ist  $(a - d)^2 + 4bc > 0$ , so ist  $A$  diagonalisierbar.
- (2) Ist  $(a - d)^2 + 4bc < 0$ , so ist  $A$  nicht diagonalisierbar.
- (3) Für  $(a - d)^2 + 4bc = 0$  existieren sowohl Matrizen  $A$ , die diagonalisierbar sind als auch solche, für die das nicht zutrifft.
- (4) Ist  $(a - d)^2 + 4bc \neq 0$ , so ist  $A$  halbeinfach.

**Aufgabe** 5/2/170

(S: Varianten)

Trigonalisierung

**Index:** trigonalisierbare Matrix, Fahne in einem Vektorraum, vollständige bzw. maximale Fahne**Stoffeinheiten:** 5/2/13 - 5/2/17 Trigonalisierung

Trigonalisieren Sie die reelle Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & -1 \\ 4 & -2 & 4 \end{pmatrix},$$

d.h. geben Sie eine obere Dreiecksmatrix  $B$  sowie eine reguläre Matrix  $U$  an, für die  $B = U^{-1} \cdot A \cdot U$  ist.

**Lösung.** Zur Trigonalisierung der Matrix  $A$  berechnen wir zunächst das charakteristische Polynom  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A)$ . Es ist  $\chi_A = (X - 6)^3$  (daraus folgt, dass  $A$  trigonalisierbar, nicht jedoch diagonalisierbar ist, denn die Ähnlichkeitsklasse einer Matrix  $\lambda \cdot E_n$  ist einelementig). Zur Bestimmung eines Eigenvektors zum Eigenwert  $\lambda = 6$  haben wir das homogene lineare Gleichungssystem mit der Koeffizientenmatrix  $\lambda \cdot E_3 - A$ , d.h. das System

$$\begin{aligned} -4x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 0 \\ -2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ -4x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 0 \end{aligned}$$

zu lösen. Wir finden als Basis seines eindimensionalen Lösungsraumes einen Vektor  $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 2)$ .

Wird mit  $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  der Endomorphismus des Standardraumes bezeichnet, der durch  $M(\varphi) = A$  definiert ist, so gilt zunächst  $\varphi(\mathbf{v}_1) = \lambda \cdot \mathbf{v}_1$ . Die Aufgabe ist gelöst, wenn wir  $\mathbf{v}_1$  zu einer Basis  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  ergänzen, für die die dritte Koordinate des Vektors  $\varphi(\mathbf{v}_2)$  verschwindet.

Zunächst kann einer der Vektoren der kanonischen Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$  durch den hier gefundenen Vektor  $\mathbf{v}_1$  ersetzt werden, so dass wiederum eine Basis entsteht; wir wählen  $\mathcal{B}_1 = (\mathbf{v}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ . Mit diesen Vektoren als Spalten ergibt sich eine Übergangsmatrix

$$U_1 := U_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und so eine zu  $A$  ähnliche Matrix

$$A_1 = U_1^{-1} \cdot A \cdot U_1 = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & -1 \\ 0 & 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

Die Teilmatrix

$$A' = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \in M(2; \mathbb{R})$$

der Matrix  $A$  hat als einzigen Eigenwert ebenfalls  $\lambda = 6$ . Lösen wir das lineare Gleichungssystem

$$(\lambda \cdot E_2 - A') \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

so erhalten wir für  $A'$  einen Eigenvektor  $(-1, 2) \in \mathbb{R}^2$ . Wählen wir Vektoren  $\mathbf{v}_2$  mit den Koordinaten  $(0, -1, 2)$  und  $\mathbf{v}_3$  mit Koordinaten  $(0, 0, 1)$  (bezüglich  $\mathcal{B}_1$ ), so entsteht eine neue Basis  $\mathcal{B}_2 = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , für die  $M_{\mathcal{B}_2}(\varphi)$  eine obere Dreiecksmatrix ist.

Mit der Übergangsmatrix

$$U_2 := U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

erhalten wir

$$M_{\mathcal{B}_2}(\varphi) = U_2^{-1} \cdot A_1 \cdot U_2 = \begin{pmatrix} 6 & -1 & -2 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix};$$

diese Matrix ist eine Trigonalisierung von  $A$ , d.h.

$$\begin{pmatrix} 6 & -1 & -2 \\ 0 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} = U^{-1} \cdot A \cdot U$$

mit

$$U = U_1 \cdot U_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 5/2/180

(S: Varianten)

Halbeinfachheit (1) (Grundkörper  $\mathbb{Q}$ )

**Index:** diagonalisierbare Matrix, halbeinfache Matrix, Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/8 - 5/2/12 Halbeinfache Endomorphismen

Untersuchen Sie, ob die folgende Matrix  $A \in M(4; \mathbb{Q})$  halbeinfach ist.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst das charakteristische Polynom  $f = \chi_A(X) \in \mathbb{Q}[X]$  und erhalten

$$\begin{aligned} f &= \det \begin{pmatrix} X & 1 & -1 & 1 \\ -1 & X+1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & X-2 & 2 \\ 0 & 2 & -5 & X+4 \end{pmatrix} \\ &= X^4 + 3X^3 + 4X^2 + 3X + 2. \end{aligned}$$

Um festzustellen, ob  $f$  mehrfache Nullstellen besitzt, wird der größte gemeinsame Teiler von  $f$  und der Ableitung  $f'$  von  $f$  bestimmt. Es ist

$$f' = 4X^3 + 9X^2 + 8X + 3.$$

Der euklidische Algorithmus ergibt  $\text{ggT}(f, f') = 1$ . Daher hat  $f$  keine mehrfachen komplexen Nullstellen, d.h. die Matrix  $A$  hat 4 verschiedene Eigenwerte in  $\mathbb{C}$ , ist also halbeinfach.

#### Aufgabe 5/2/190

(S: Varianten)

Halbeinfachheit (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ )

**Index:** diagonalisierbare Matrix, halbeinfache Matrix, Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/2/8 - 5/2/12 Halbeinfache Endomorphismen

Untersuchen Sie, ob die folgende Matrix  $A \in M(4; \mathbb{F}_2)$  halbeinfach ist.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst das charakteristische Polynom  $f = \chi_A(X) \in \mathbb{F}_2[X]$  und erhalten

$$\begin{aligned} f &= \det \begin{pmatrix} X+1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & X+1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & X+1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & X+1 \end{pmatrix} \\ &= X^4 + X + 1. \end{aligned}$$

Um festzustellen, ob  $f$  mehrfache Nullstellen besitzt, wird der größte gemeinsame Teiler von  $f$  und der Ableitung  $f'$  von  $f$  bestimmt. Es ist

$$f' = 1.$$

Aus  $\text{ggT}(f, f') = 1$  folgt, dass  $f$  keine mehrfachen Nullstellen in den Erweiterungskörpern von  $\mathbb{F}_2$  besitzt. In einem Zerfällungskörper des Polynoms  $f$  hat die Matrix  $A$  daher 4 verschiedene Eigenwerte, ist also halbeinfach.

**Aufgabe** 5/2/200

(S: Varianten)

Halbeinfachheit (3) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ )**Index:** diagonalisierbare Matrix, halbeinfache Matrix, Eigenwert einer Matrix, Eigenvektor einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/2/8 - 5/2/12 Halbeinfache EndomorphismenUntersuchen Sie, ob die folgende Matrix  $A \in M(4, \mathbb{F}_5)$  halbeinfach ist.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -2 & 2 \\ -2 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst das charakteristische Polynom  $f = \chi_A(X) \in \mathbb{F}_5[X]$  und erhalten

$$\begin{aligned} f &= \det \begin{pmatrix} X-2 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & X+2 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & X+2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 & X-1 \end{pmatrix} \\ &= X^4 + X^3 - 2X^2 - X - 1. \end{aligned}$$

Um festzustellen, ob  $f$  mehrfache Nullstellen besitzt, wird der größte gemeinsame Teiler von  $f$  und der Ableitung  $f'$  von  $f$  bestimmt. Es ist

$$f' = -X^3 - 2X^2 + X - 1.$$

Der euklidischen Algorithmus ergibt  $\text{ggT}(f, f') = 1$ . Daher hat  $f$  keine mehrfachen Nullstellen in den Erweiterungskörpern von  $\mathbb{F}_5$ . In einem Zerfällungskörper des Polynoms  $f$  besitzt die Matrix  $A$  daher 4 verschiedene Eigenwerte, ist also halbeinfach.**Aufgabe** 5/2/210

Fahnen

**Index:** Fahne in einem Vektorraum, vollständige bzw. maximale Fahne**Stoffeinheiten:** 5/2/13 - 5/2/17 Trigonalisierung $(U_0, U_1, \dots, U_t)$  sei eine Fahne im endlichdimensionalen  $K$ -Vektorraum  $V$ , d.h.  $U_i$  sind paarweise verschiedene Unterräume,  $U_0 = \mathbf{0}$ ,  $U_t = V$  und  $U_0 \subseteq U_1 \subseteq \dots \subseteq U_t$ .

Beweisen Sie, dass die folgenden Eigenschaften äquivalent sind.

- (1)  $t = \dim_K(V)$
- (2)  $\dim_K(U_i/U_{i-1}) = 1$  für  $1 \leq i \leq t$
- (3) Ist  $U$  Unterraum von  $V$  und  $U_{i-1} \subseteq U \subseteq U_i$  für einen Index  $i \in \{1, \dots, t\}$ , so gilt  $U = U_{i-1}$  oder  $U = U_i$  (d.h. die Fahne lässt sich nicht verlängern).

**Aufgabe** 5/3/010

(S: Varianten)

Normalformen nilpotenter Matrizen

**Index:** nilpotente Matrix, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum

**Stoffeinheiten:** 5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix

Überprüfen Sie, dass die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 5 & -2 \\ -6 & 6 & 7 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{R})$$

nilpotent ist und geben Sie ihre Normalform  $B$ , sowie eine reguläre Matrix  $U$  an, für die  $B = U^{-1} \cdot A \cdot U$  ist.

**Lösung.** Offensichtlich ist

$$A \neq 0, \quad A^2 = 0, \quad \text{rang}(A) = 2,$$

daher muss  $A$  die Normalform haben, die der Partition  $(2, 2)$  von 4 entspricht.

Zur Bestimmung der zyklischen Vektoren berechnen wir zunächst den Kern  $K = \ker(\varphi)$  der zugehörigen linearen Abbildung, der durch die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems mit der Koeffizientenmatrix  $A$  gegeben ist.  $((-1, 0, 0, 2), (1, 1, 0, 0))$  ist eine Basis von  $K$ ; diese wird durch die Vektoren  $\mathbf{w}_{11} = (1, 0, 0, 0)$ ,  $\mathbf{w}_{12} = (0, 0, 1, 0)$  der kanonischen Basis zu einer Basis von  $V$  ergänzt.

Zusammen mit  $\mathbf{w}_{21} = \varphi(\mathbf{w}_{11}) = (-4, -6, 0, -4)$  und  $\mathbf{w}_{22} = \varphi(\mathbf{w}_{12}) = (5, 7, 0, 4)$  entsteht eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{w}_{11}, \mathbf{w}_{21}, \mathbf{w}_{12}, \mathbf{w}_{22})$  von  $V$ , bezüglich der  $M_{\mathcal{B}}(\varphi)$  die gesuchte Normalform  $B$  annimmt. Werden die Vektoren aus  $\mathcal{B}$  als Spalten einer Matrix

$$U = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 & 5 \\ 0 & -6 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

angeordnet, so erhalten wir durch

$$B = U^{-1} \cdot A \cdot U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

die Normalform von  $A$ .

**Aufgabe** 5/3/020

Nilpotente Endomorphismen (1)

**Index:** nilpotente Matrix, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum, nilpotenter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix

Untersuchen Sie, welche der folgenden Matrizen nilpotent ist und geben Sie in diesem Fall die jordansche Normalform an.

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/3/030**

Nilpotente Endomorphismen (2)

**Index:** nilpotente Matrix, nilpotenter Endomorphismus, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum**Stoffeinheiten:** [5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix](#)

Es sei  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M(2; \mathbb{R})$ . Welche Bedingungen müssen  $a, b, c, d$  erfüllen, damit  $A$  nilpotent ist? Geben Sie in diesem Fall die jordansche Normalform an.

**Aufgabe 5/3/040**

Nilpotente Endomorphismen (3)

**Index:** nilpotente Matrix, nilpotenter Endomorphismus, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum, Young-Diagramm**Stoffeinheiten:** [5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix](#)

Es sei  $A \in M(7; \mathbb{C})$  und  $A^4 = 0$ ; bestimmen Sie alle möglichen jordanschen Normalformen der Matrix  $A$ .

**Aufgabe 5/3/050**

Nilpotente Endomorphismen (4)

**Index:** nilpotente Matrix, nilpotenter Endomorphismus, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum, Young-Diagramm**Stoffeinheiten:** [5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix](#)

Klassifizieren Sie alle nilpotenten Matrizen  $A \in M(6; \mathbb{C})$  mit  $\text{rang}(A) = 3$  bis auf Ähnlichkeit.

**Aufgabe 5/3/060**

Ähnlichkeit, Beispiel

**Index:** nilpotente Matrix, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum, Ähnlichkeit**Stoffeinheiten:** [5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix](#)

Zeigen Sie, dass die Matrizen

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ \mathbf{0} & & & 0 & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ 1 & 0 & & & \mathbf{0} \\ 0 & 1 & \ddots & & \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 & \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ähnlich sind.

### Aufgabe 5/3/070

Nilpotente Endomorphismen (5)

**Index:** nilpotenter Endomorphismus, nilpotente Matrix, jordanische Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum, Ähnlichkeit

**Stoffeinheiten:** [5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix](#)

Es seien  $V = \mathbb{R}^5$  und  $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$  durch

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_2 + x_3 + x_5, x_3 + x_4 + x_5, x_4 - x_5, 0, 0)$$

gegeben. Zeigen Sie, dass  $\varphi$  nilpotent ist und bestimmen Sie eine Basis in  $V$ , bezüglich der die Matrix von  $\varphi$  ihre kanonische Form annimmt.

### Aufgabe 5/3/080

Ein falsches Verfahren

**Index:** nilpotenter Endomorphismus, nilpotente Matrix, jordanische Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum, Ähnlichkeit

**Stoffeinheiten:** [5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix](#)

Wir fixieren einen endlichdimensionalen  $K$ -Vektorraum  $V$ .

- (1)  $\varphi$  sei ein nilpotenter Endomorphismus von  $V$  sowie  $(\mathbf{v}_{11}, \dots, \mathbf{v}_{1q})$  eine Basis von  $\ker(\varphi)$ . Zu jedem der Vektoren  $\mathbf{v}_{1j}$  wird für  $i = 1, 2, \dots$  eine Kette von Vektoren  $\mathbf{v}_{ij}$  gewählt, für die  $\varphi(\mathbf{v}_{i+1j}) = \mathbf{v}_{ij}$  ist (dies entspricht der Lösung eines linearen Gleichungssystems, wenn  $\varphi$  durch eine Matrix beschrieben wird).  
Zeigen Sie, dass  $(\mathbf{v}_{1j}, \dots, \mathbf{v}_{ij})$  ein linear unabhängiges System ist und das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbricht.  
Überdies ist die Familie aller so aufgefundenen Vektoren  $\mathbf{v}_{ij}$  linear unabhängig.
- (2) Wenn die unter (1) gefundene linear unabhängige Familie  $(\mathbf{v}_{ij})_{i,j}$  aus  $\dim(V)$  Vektoren besteht, d.h. eine Basis  $\mathcal{B}$  von  $V$  bildet, so erhalten wir (bei geeigneter Anordnung der Vektoren) als zugehörige Matrix  $M_{\mathcal{B}}(\varphi)$  die jordanische Normalform.
- (3) Zeigen Sie, dass die jordanische Normalform eines nilpotenten Endomorphismus nicht immer so gefunden werden kann.
- (4) Erläutern Sie, wie sich aus dem Verfahren (1) im folgenden Spezialfall dennoch eine Methode ergibt, die jordanische Normalform eines Endomorphismus zu bestimmen: Das charakteristische Polynom zerfällt in (bekannte) Linearfaktoren, und sämtliche Eigenwerte haben die geometrische Multiplizität 1.

### Aufgabe 5/4/010

Jordanische Normalform (1) (Grundkörper  $\mathbb{R}$ )

**Index:** jordansche Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, Eigenvektoren einer Matrix, Hauptraum einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Bestimmen Sie eine jordansche Normalform der reellen Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 5/4/020**

Jordansche Normalform (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ )

**Index:** jordansche Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, Eigenvektoren einer Matrix, Hauptraum, Minimalpolynom einer quadratischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Bestimmen Sie für folgende die Matrix  $A$  über dem Körper  $\mathbb{F}_5$  eine jordansche Normalform und geben Sie das Minimalpolynom an.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/4/030**

Jordansche Normalform (3) (Grundkörper  $\mathbb{C}$ )

**Index:** jordansche Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, Eigenvektoren einer Matrix, Hauptraum einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Bestimmen Sie die jordanschen Normalformen der folgenden komplexen Matrizen.

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 1 & i & -i & 1 \\ i & 1 & 1 & -i \\ -i & 1 & 1 & i \\ 1 & -i & i & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/4/035**

(S: Varianten)

Jordansche Normalform und Übergangsmatrix

**Index:** jordansche Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, Eigenvektoren einer Matrix, Hauptraum einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Bestimmen Sie die jordansche Normalform  $J$  der reellen Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & -5 & -7 \\ -7 & -7 & -9 & -15 \\ 6 & 5 & 9 & 14 \end{pmatrix}$$

sowie eine Matrix  $U \in \text{GL}(4; \mathbb{R})$  für die  $U^{-1} \cdot A \cdot U = J$  ist.

**Anmerkung.** Das charakteristische Polynom ist ein Quadrat, seine Nullstellen sind reell.

**Lösung.** Den (bezüglich der Standardbasis) zu  $A$  gehörigen Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^4$  bezeichnen wir mit  $\varphi$ .

Als Nullstellen des charakteristischen Polynoms

$$\chi_A = \det(X \cdot E_4 - A) = X^4 - 6X^3 + 13X^2 - 12X + 4 = (X^2 - 3X + 2)^2$$

erhalten wir die (sämtlich reellen) Eigenwerte  $\lambda_1 = 2$  und  $\lambda_2 = 1$  der Matrix  $A$ , die beide die algebraische Multiplizität 2 haben. Zur Bestimmung einer zyklischen Basis des Hauptraumes  $H_1 := H(\varphi, \lambda_1)$  lösen wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ -3 & -3 & -5 & -7 \\ -7 & -7 & -11 & -15 \\ 6 & 5 & 9 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

das den Unterraum  $\ker(\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id}) \subseteq H_1$  beschreibt. Er ist eindimensional und wird von dem Vektor

$$\mathbf{v}_2 = (1, 0, -2, 1)$$

erzeugt, d.h.  $\mathbf{v}_2$  ist ein Eigenvektor von  $A$  bezüglich  $\lambda_1$ . Nun muss wegen  $\dim(H_1) = 2$  jeder Urbildvektor  $\mathbf{v}_1 \in (\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id})^{-1}(\mathbf{v}_2)$  zusammen mit  $\mathbf{v}_2$  eine Kette  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  zyklischer Vektoren für  $H_1$  bilden (Beweis?). Wir finden

$$\mathbf{v}_1 = (3, 2, -3, 0)$$

als Lösung von

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ -3 & -3 & -5 & -7 \\ -7 & -7 & -11 & -15 \\ 6 & 5 & 9 & 12 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend ergeben sich zyklische Vektoren

$$\mathbf{v}_3 = (-2, 1, 1, 0)$$

$$\mathbf{v}_4 = (1, -1, -3, 2)$$

für  $H(\varphi, \lambda_2)$  als Lösungen der Gleichungssysteme  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot {}^t\mathbf{v}_4 = 0$  ( $\mathbf{v}_4 \neq \mathbf{0}$ ) und  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot {}^t\mathbf{v}_3 = {}^t\mathbf{v}_4$ . Mit der Übergangsmatrix

$$U = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  und  $\mathbf{v}_4$  gebildet werden, erhalten wir

$$J = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

mit  $U^{-1} \cdot A \cdot U = J$  als jordansche Normalform der Matrix  $A$ .

### Aufgabe 5/4/040

(S: Varianten)

Jordansche Normalform und Übergangsmatrix

**Index:** jordansche Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, Eigenvektoren einer Matrix, Hauptraum einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Bestimmen Sie eine jordansche Normalform  $J$  der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -3 & -4 & 6 \\ -1 & 0 & 1 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & -4 & -3 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & -3 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M(5; \mathbb{C})$$

und geben Sie eine Matrix  $U \in GL(5, \mathbb{C})$  an, für die  $J = U^{-1} \cdot A \cdot U$  ist.

**Lösung.** Wir bestimmen zunächst die Eigenwerte als Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Es ist

$$\begin{aligned} \chi_A &= \det(X \cdot E_5 - A) = \det \begin{pmatrix} X-1 & 3 & 3 & 4 & -6 \\ 1 & X & -1 & -3 & 3 \\ -2 & 3 & X+4 & 3 & -5 \\ -2 & 1 & 2 & X+3 & -3 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & X \end{pmatrix} \\ &= X^5 + 6X^4 + 12X^3 + 8X^2 = X^2 \cdot (X+2)^3, \end{aligned}$$

d.h.  $A$  besitzt einen Eigenwert  $\lambda_1 = 0$  der (algebraischen) Multiplizität 2 und einen Eigenwert  $\lambda_2 = -2$  der (algebraischen) Multiplizität 3.

Für die lineare Abbildung  $\varphi: \mathbb{C}^5 \rightarrow \mathbb{C}^5$  mit  $M(\varphi) = A$  erhalten wir als Haupträume

$$H_1 := H(\varphi, 0) = \ker(\varphi^2) \quad \text{und} \quad H_2 := H(\varphi, -2) = \ker((\varphi + 2 \cdot \text{id}_{\mathbb{C}^5})^3).$$

$H_1$  ist Lösungsraum des homogenen linearen Gleichungssystems mit der Koeffizientenmatrix

$$A^2 = \begin{pmatrix} -44 & 8 & 8 & -12 \\ 4 & 0 & -4 & -8 & 8 \\ -44 & 8 & 4 & -8 \\ -40 & 4 & 4 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 4 \end{pmatrix},$$

für den durch leichte Rechnung eine Basis  $((0, 1, 0, 1, 1), (1, -1, 1, 0, 0))$  gefunden wird. Nun ist die Filtrierung von  $H_1$  durch  $\mathbf{0} \subseteq \ker(\varphi) \subseteq \ker(\varphi)^2 = H_1$  zu bestimmen.  $\ker(\varphi)$  ist Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems mit der Koeffizientenmatrix  $A$ ; eine Basis ist durch den Vektor  $(1, 0, 1, 1, 1)$  gegeben. Wir ergänzen diesen zu einer Basis von  $\ker(\varphi^2)$  und erhalten  $\mathbf{w}_1 := (0, 1, 0, 1, 1)$  als zyklischen Vektor im 2-dimensionalen

Hauptraum  $H_1$ ; er bildet zusammen mit  $\mathbf{w}_2 := \varphi(\mathbf{w}_1) = (-1, 0, -1, -1, -1)$  eine zyklische Basis von  $H_1$ .

Wir untersuchen nun den Hauptraum  $H_2$ . Zur Vereinfachung der Bezeichnungen wird  $\psi := \varphi - \lambda_2 \cdot \text{id}_{\mathbb{R}^5}$  gesetzt. Wie im ersten Schritt haben wir die Filtrierung von  $H_2$  durch die Unterräume  $\ker(\psi^i)$  zu bestimmen, wobei  $\psi$  die Matrix

$$A - \lambda_2 \cdot E_4 = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 & -4 & 6 \\ -1 & 2 & 1 & 3 & -3 \\ 2 & -3 & -2 & -3 & 5 \\ 2 & -1 & -2 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

besitzt. Es ergeben sich Basen

$$((-1, 1, 0, 0, 1), (0, -1, 0, 1, 0), (1, 0, 1, 0, 0)) \text{ für } \ker(\psi^2),$$

$$((-1, 1, 0, 0, 1), (1, 0, 1, 0, 0)) \text{ für } \ker(\psi).$$

Wegen  $\dim H_2 = 3$  folgt  $\ker(\psi^2) = \ker(\psi^3) = H_2$ , und zum nilpotenten Endomorphismus  $\psi|_{H_2}$  gehört die Partition  $(2, 1)$ . Ein zyklischer Vektor der Länge 2 entsteht durch Ergänzung der Basis für  $\ker(\psi)$  zu einer Basis für  $\ker(\psi^2)$  nach dem Austauschverfahren; wir erhalten  $\mathbf{w}_3 := (0, -1, 0, 1, 0)$  und  $\mathbf{w}_4 := \psi(\mathbf{w}_3) = (-1, 1, 0, 0, 1)$ . Entsprechend wird  $\mathbf{w}_4 \in \ker(\psi)$  durch den Vektor  $\mathbf{w}_5 := (1, 0, 1, 0, 0)$  zu einer Basis von  $\ker(\psi)$  ergänzt.

Für die so erhaltene Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \mathbf{w}_3, \mathbf{w}_4, \mathbf{w}_5)$  des 5-dimensionalen Standardraumes ist  $J := M_{\mathcal{B}}(\varphi)$  jordanische Normalform von  $\varphi$ ,

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} = U^{-1} \cdot A \cdot U \text{ mit } U = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

#### Aufgabe 5/4/050

Jordanische Normalform (4), mit Parametern

**Index:** jordanische Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, Eigenvektoren einer Matrix, Hauptraum einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 [Normalform eines Endomorphismus](#)

Geben Sie eine jordanische Normalform der folgenden Matrix  $A_t$  aus  $M(3; \mathbb{R})$  in Abhängigkeit von dem Parameter  $t \in \mathbb{R}$  an.

$$A_t = \begin{pmatrix} t+1 & -t+2 & 0 \\ -t+2 & t+1 & 0 \\ -\frac{1}{2}t+2 & -\frac{1}{2}t+1 & t \end{pmatrix}$$

#### Aufgabe 5/4/060

Typen jordanischer Normalformen (1)

**Index:** jordanische Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 [Normalform eines Endomorphismus](#)

Bestimmen Sie alle möglichen jordanischen Normalformen von Matrizen mit den Eigenwerten 1, 2, 3 und den (in entsprechender Reihenfolge auftretenden) algebraischen Vielfachheiten 1, 2 bzw. 3 bis auf Permutation der Jordanblöcke.

**Aufgabe 5/4/070**

Typen jordanischer Normalformen (2)

**Index:** jordanische Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus](#)

Klassifizieren Sie alle Matrizen mit dem charakteristischen Polynom

$$\chi(X) = X \cdot (X - 1)^2 \cdot (x + 1)^3$$

bis auf Ähnlichkeit.

**Aufgabe 5/4/080**

Typen jordanischer Normalformen (3)

**Index:** jordanische Normalform einer Matrix, Eigenwerte einer Matrix, charakteristisches Polynom einer Matrix, Minimalpolynom einer quadratischen Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus](#)

Bestimmen Sie alle möglichen jordanischen Normalformen von Matrizen mit charakteristischem Polynom  $\chi(X) = X^3 \cdot (X - 1)^5$  und Minimalpolynom  $m(X) = X^2 \cdot (X - 1)^2$ .

**Aufgabe 5/4/090**

Jordanische Normalform (4)

**Index:** jordanische Normalform einer Matrix, höherer Eigenraum einer Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus](#)

Bestimmen Sie die jordanische Normalform der folgenden Matrix  $A$  unter der Voraussetzung, dass  $a_{12} \cdot a_{23} \cdot \dots \cdot a_{n-1,n} \neq 0$  ist.

$$A = \begin{pmatrix} a & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \dots & a_{1n} \\ & a & a_{23} & a_{24} & \dots & a_{2n} \\ & & a & a_{34} & \dots & a_{3n} \\ & & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & & & & & a_{n-1,n} \\ & & & & & a \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 5/4/100**

Jordanische Normalform eines Endomorphismus

**Index:** jordanische Normalform eines Endomorphismus, Eigenwerte eines Endomorphismus, Eigenvektoren eines Endomorphismus, Hauptraum eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** [5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus](#)

Bestimmen Sie eine Basis  $\mathcal{B}$  des Standardraumes  $V = \mathbb{R}^5$ , bezüglich der die Matrixdarstellung des Endomorphismus  $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$  mit

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = (x_1 - x_2, x_3 + x_4 - 2x_5, x_3 - x_2, x_1 + x_2 + x_3, x_2 + 3x_3 - x_5)$$

eine jordansche Normalform annimmt.

### Aufgabe 5/4/110

Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (1)

**Index:** jordansche Normalform eines Endomorphismus, Eigenwerte eines Endomorphismus, Eigenvektoren eines Endomorphismus, Hauptraum eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Es seien  $V$  ein endlichdimensionaler  $\mathbb{R}$ -Vektorraum und  $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$  ein Endomorphismus mit der Eigenschaft

$$\varphi(\varphi(\mathbf{x})) = 2\varphi(\mathbf{x}) - 3\mathbf{x} \quad \text{für alle } \mathbf{x} \in V.$$

Geben Sie alle möglichen jordanschen Normalformen für  $\varphi$  an!

### Aufgabe 5/4/120

Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (2)

**Index:** jordansche Normalform eines Endomorphismus, Eigenwerte eines Endomorphismus, Eigenvektoren eines Endomorphismus, Hauptraum eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

$\varphi : V \rightarrow V$  sei linearer Endomorphismus des  $K$ -Vektorraumes  $V$  mit der folgenden Eigenschaft: Jeder von  $\mathbf{0}$  verschiedene Vektor aus  $V$  ist Eigenvektor von  $\varphi$ .

Bestimmen Sie eine jordansche Normalform für  $\varphi$ .

### Aufgabe 5/4/125

(S: Varianten)

Minimalpolynom (1)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Wir betrachten die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -8 & 4 & 12 & 8 \\ 8 & 3 & -7 & -6 \\ -16 & -13 & 9 & 10 \\ 12 & 22 & 2 & -4 \end{pmatrix} \in M(4; \mathbb{R}).$$

Bestimmen Sie das Minimalpolynom  $m_A$  von  $A$ , indem Sie untersuchen, ob kleine Potenzen der Matrix linear abhängig sind.

**Lösung.** Offensichtlich ist  $m_A$  nicht linear, da  $A$  keine Diagonalmatrix ist. Nun testen wir, ob  $m_A$  quadratisch ist; dazu muss  $A^2$  plus ein (geeignetes) Vielfaches  $u \cdot A$  von  $A$  diagonal sein. Wir berechnen leicht  $A^2 = 0$ , daher ist  $f = X^2 \in \mathbb{R}[X] \setminus \{0\}$  ein Polynom mit  $f(A) = 0$ . Da  $f$  normiert ist, folgt  $f = m_A$ .

### Aufgabe 5/4/126

(S: Varianten)

Minimalpolynom (2)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Gegeben ist die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 6 & 2 \\ 2 & -4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestimmen Sie das Minimalpolynom  $m_A$  von  $A$ , indem Sie untersuchen, ob kleine Potenzen der Matrix linear abhängig sind.
- (2) Ist  $A$  halbeinfach?

**Lösung.** Offensichtlich ist  $m_A$  nicht linear ( $A$  ist keine Diagonalmatrix).

Nun testen wir, ob  $m_A$  quadratisch ist; dann muss  $A^2$  plus ein (geeignetes) Vielfaches  $u \cdot A$  von  $A$  diagonal sein.  $A^2 + u \cdot A = v \cdot E_4$  entspricht einem einfach auszuwertenden System linearer Gleichungen für  $u$  und  $v$ ; wir schreiben einzelne davon auf und testen durch Einsetzen, ob die Bedingung erfüllt ist. Leicht zeigt sich, dass dies für  $u = 2$  der Fall ist, dann ist weiter  $v = -4$ .

Wir haben so ein nichtkonstantes Polynom  $f = X^2 + 2X + 4 \in \mathbb{R}[X]$  minimalen Grades mit  $f(A) = 0$  gefunden. Da  $f$  normiert ist, folgt  $f = m_A$ ; dies ist die Antwort auf Frage (1).

Leicht ist zu sehen, dass  $m_A$  keine mehrfache Nullstelle in  $\mathbb{C}$  besitzt, daher ist  $A$  eine halbeinfache Matrix.

**Aufgabe 5/4/127**

Minimalpolynom (3)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Gegeben ist die folgende Matrix

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 0 & a \\ c & 0 & a & 0 \\ 0 & -a & a & -c \\ -a & 0 & -b & 0 \end{pmatrix}$$

mit  $a, b, c \in \mathbb{R}$  und  $a \neq 0$ .

- (1) Bestimmen Sie das Minimalpolynom  $m_A$  von  $A$ , indem Sie untersuchen, ob kleine Potenzen der Matrix linear abhängig sind.
- (2) Geben Sie eine notwendige und hinreichende Bedingung dafür an, dass  $A$  halbeinfach ist.

**Aufgabe 5/4/128**

Minimalpolynom (4)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus

Bestimmen Sie das Minimalpolynom der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} \frac{u}{(1+u^2)} & v & 0 & 1 \\ -\frac{v}{(1+u^2)} & -u & 1 & 0 \\ 0 & 1 & u & \frac{(1+u^2)}{v} \\ 1 & 0 & -v & -u \end{pmatrix}$$

für reelle Zahlen  $u, v \neq 0$ .

**Aufgabe 5/4/130**

Jordanform der Ableitung

**Index:** nilpotente Matrix, jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix, zyklischer Unterraum

**Stoffeinheiten:** 5/3/8 - 5/3/12 Bestimmung der Normalform einer nilpotenten Matrix

$P_n$  bezeichne den Unterraum des  $\mathbb{R}$ -Vektorraumes  $\mathbb{R}[X]$  der Polynome in der Unbestimmten  $X$ , deren Grad  $\leq n$  ist. Offensichtlich definiert die Ableitung

$$\frac{d}{dX} : P_n \rightarrow P_n, f \mapsto \frac{df}{dX}$$

einen Endomorphismus von  $P_n$ .

Zeigen Sie, dass  $\frac{d}{dX}$  nilpotent ist und bestimmen Sie eine jordansche Normalform.

**Aufgabe 5/4/140**

(S: Varianten)

Smithsche Normalform

**Index:** smithsche Normalform, Präsentationsmatrix einer Matrix, Determinantenteiler einer Matrix, Elementarteiler einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/4/14 - 5/4/24 Elementarteiler

Bestimmen Sie die Normalform einer Präsentationsmatrix für

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M(3; \mathbf{F}_2).$$

**Lösung.** Die charakteristische Matrix ist

$$X \cdot E_3 - A = \begin{pmatrix} X+1 & 1 & 1 \\ 1 & X & 1 \\ 0 & 1 & X+1 \end{pmatrix} \in M(3, \mathbf{F}_2[X]).$$

Nach Vertauschen der ersten beiden Zeilen entsteht eine Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & X & 1 \\ X+1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & X+1 \end{pmatrix},$$

die an der Position  $(1,1)$  einen von 0 verschiedenen Eintrag minimalen Grades besitzt. Durch Subtraktion geeigneter Vielfacher der ersten Zeile von den übrigen ergibt sich daraus eine Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & X & 1 \\ 0 & X^2 + X + 1 & X \\ 0 & 1 & X + 1 \end{pmatrix},$$

deren erste Spalte bereits die gewünschte Gestalt hat. Sie ist offensichtlich äquivalent zu

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & X^2 + X + 1 & X \\ 0 & 1 & X + 1 \end{pmatrix}.$$

Wegen  $e_1(A) = 1$  muss die Teilmatrix

$$C = \begin{pmatrix} X^2 + X + 1 & X \\ 1 & X + 1 \end{pmatrix} \text{ zur Matrix } \begin{pmatrix} e_2(A) & 0 \\ 0 & e_3(A) \end{pmatrix}$$

äquivalent sein. Anstatt den obigen Algorithmus fortzusetzen, lassen sich in diesem besonders einfachen Fall auch die größten gemeinsamen Teiler  $d_3(A)$  und  $d_2(A)$  der äußeren Potenzen  $A^i(C)$  ( $i = 2, 1$ ) schnell bestimmen: Dies sind im ersten Fall die Determinante und im zweiten der ggT aller Einträge von  $C$ . So ergeben sich

$$e_3(A) = \frac{d_3(A)}{d_2(A)} = X^3 + X + 1, \quad e_2(A) = d_2(A) = 1$$

und damit die gesuchte Normalform

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \\ 0 & 0 & X^3 + X + 1 & \end{pmatrix}$$

der Präsentationsmatrix für  $A$ .

### Aufgabe 5/4/141

(S: Varianten)

Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4

**Index:** smithsche Normalform, Präsentationsmatrix einer Matrix, Determinantenteiler einer Matrix, Elementarteiler einer Matrix, charakteristische Matrix, Äquivalenz polynomialer Matrizen

**Stoffeinheiten:** 5/4/14 - 5/4/24 Elementarteiler

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in M(4, \mathbb{Q}).$$

Bestimmen Sie für die Präsentationsmatrix  $\text{Char}_A := X \cdot E_4 - A$  von  $A$  die smithsche Normalform, d.h. eine äquivalente polynomiale Matrix  $\text{diag}(f_1, \dots, f_4)$  mit normierten Polynomen  $f_i \in \mathbb{Q}[X]$ , die der Teilbarkeitsbedingung  $f_1 | f_2 | f_3 | f_4$  genügen.

**Lösung.** Die gesuchte Matrix ist zur Matrix

$$\text{Char}_A = \begin{pmatrix} X + 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & X - 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X + 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & X - 1 \end{pmatrix}$$

äquivalent, sie kann daher durch Aufeinanderfolge von Umformungen der folgenden drei Typen gewonnen werden:

- (1) Vertauschen zweier Zeilen (bzw. Spalten),
- (2) Multiplikation einer Zeile (bzw. Spalte) mit einer Zahl aus  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ ,
- (3) Addition des  $p$ -fachen einer Zeile (bzw. Spalte) zu einer anderen, wobei  $p \in \mathbb{Q}[X]$ .

Im Algorithmus zur Berechnung der smithschen Normalform werden die Diagonalelemente schrittweise berechnet. Dabei entstehen die Matrizen

$M^{(i)} \in M(5-i, \mathbb{Q}[X])$  mit der Ausgangsmatrix  $M^{(1)} := \text{Char}_A$  und mit

$$M^{(i)} \text{ äquivalent } \begin{pmatrix} f_i & 0 \\ 0 & M^{(i+1)} \end{pmatrix}$$

für  $i = 1, 2, 3$ . Außerdem teilen die Polynome  $f_i$  alle Einträge von  $M^{(i+1)}$ . Das Polynom  $f_4$  ergibt sich aus  $\chi_A = \det(\text{Char}_A)$ :

$$f_4 = \det(\text{Char}_A) / (f_1 \cdot f_2 \cdot f_3).$$

Die oben skizzierten Hauptschritte des Algorithmus können recht komplex sein, doch solange in den Matrizen  $M^{(i)}$  Einträge existieren, die auch in  $\mathbb{Q}$  liegen, bleibt das Verfahren einfach (ein solches Element teilt alle übrigen). Wir wissen hier bereits  $f_i = 1$ .

Durch Vertauschen von Zeilen (bzw. Spalten) wird ein Element aus  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$  in die Position  $(1, 1)$  der Matrix  $M^{(i)}$  gebracht. Dann werden durch die üblichen Eliminationsschritte mittels (1), (2), (3) die von 0 verschiedenen Elemente der ersten Spalte und der ersten Zeile zu Null reduziert. So gewinnen wir  $M^{(i+1)}$ .

Wenn wir in  $M^{(1)}$  die erste Zeile mit der zweiten Zeile vertauschen, so erhalten wir

$$\begin{pmatrix} 1 & X-1 & 0 & 0 \\ X+1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X+1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & X-1 \end{pmatrix}.$$

Die Elimination der ersten Spalte liefert

$$\begin{pmatrix} 1 & X-1 & 0 & 0 \\ 0 & -X^2+2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X+1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & X-1 \end{pmatrix}.$$

Bei Elimination der ersten Zeile mittels der ersten Spalte werden die Elemente unter der ersten Zeile nicht verändert. Damit ist  $M^{(2)}$  bereits hier ablesbar, nämlich

$$M^{(2)} = \begin{pmatrix} -X^2+2 & 0 & 0 \\ 0 & X+1 & -1 \\ 0 & -1 & X-1 \end{pmatrix}.$$

Auch in dieser Matrix gibt es noch Elemente, die in  $\mathbb{Q}$  liegen, z.B. das Element  $m_{23}^{(2)}$ . Wir vertauschen so, dass dieses Element in die Position  $(1, 1)$  der Matrix gerät, und gewinnen (evtl. nach Multiplikation der ersten Zeile mit einer geeigneten Konstanten  $\neq 0$ )

$$\begin{pmatrix} 1 & -X-1 & 0 \\ 0 & 0 & -X^2+2 \\ X-1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Elimination der ersten Spalte ergibt

$$\begin{pmatrix} 1-X-1 & 0 \\ 0 & 0 & -X^2+2 \\ 0 & X^2-2 & 0 \end{pmatrix},$$

und wir finden analog zum ersten Schritt

$$M^{(3)} = \begin{pmatrix} 0 & -X^2 + 2 \\ X^2 - 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nun liegt kein Element dieser Matrix in  $\mathbb{Q} \setminus \{0\}$ . Wir verzichten hier auf eine Darstellung weiterer Einzelheiten des Verfahrens (vgl. auch 5/4/24). Das Resultat kann jetzt durch einen Kunstgriff gewonnen werden:

Mit  $q := X^2 - 2$  gilt

$$M^{(3)} = q \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daher teilt  $q$  das Polynom  $f_3$  (und damit auch  $f_4$ ) sowie  $q^2$  das Polynom  $\chi_A = \det(\text{Char}_A)$ . Wegen  $\deg(q^2) = \deg(\chi_A) = 4$  folgt  $q = f_3 = f_4$ . Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X^2 - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^2 - 2 \end{pmatrix}$$

als smithsche Normalform der gegebenen Matrix  $\text{Char}_A$ .

#### Aufgabe 5/4/142

(S: Varianten)

Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4

**Index:** smithsche Normalform, Präsentationsmatrix einer Matrix, Determinantenteiler einer Matrix, Elementarteiler einer Matrix, charakteristische Matrix, Äquivalenz polynomialer Matrizen

**Stoffeinheiten:** 5/4/14 - 5/4/24 Elementarteiler

Gegeben ist die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M(4, \mathbb{F}_5).$$

Bestimmen Sie für die Präsentationsmatrix  $\text{Char}_A := X \cdot E_4 - A$  von  $A$  die smithsche Normalform, d.h. eine äquivalente polynomiale Matrix  $\text{diag}(f_1, \dots, f_4)$  mit normierten Polynomen  $f_i \in \mathbb{F}_5[X]$ , die der Teilbarkeitsbedingung  $f_1 | f_2 | f_3 | f_4$  genügen.

**Lösung.** Die gesuchte Matrix ist zur Matrix

$$\text{Char}_A = \begin{pmatrix} X + 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & X + 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & X & 0 \\ -1 & 1 & 0 & X \end{pmatrix}$$

äquivalent, sie kann daher durch Aufeinanderfolge von Umformungen der folgenden drei Typen gewonnen werden:

- (1) Vertauschen zweier Zeilen (bzw. Spalten),
- (2) Multiplikation einer Zeile (bzw. Spalte) mit einer Zahl aus  $\mathbb{F}_5 \setminus \{0\}$ ,
- (3) Addition des  $p$ -fachen einer Zeile (bzw. Spalte) zu einer anderen, wobei  $p \in \mathbb{F}_5[X]$ .

Im Algorithmus zur Berechnung der smithschen Normalform werden die Diagonalelemente schrittweise berechnet. Dabei entstehen die Matrizen

$M^{(i)} \in M(5-i, \mathbb{F}_5[X])$  mit der Ausgangsmatrix  $M^{(1)} := \text{Char}_A$  und mit

$$M^{(i)} \text{ äquivalent } \begin{pmatrix} f_i & 0 \\ 0 & M^{(i+1)} \end{pmatrix}$$

für  $i = 1, 2, 3$ . Außerdem teilen die Polynome  $f_i$  alle Einträge von  $M^{(i+1)}$ . Das Polynom  $f_4$  ergibt sich aus  $\chi_A = \det(\text{Char}_A)$ :

$$f_4 = \det(\text{Char}_A) / (f_1 \cdot f_2 \cdot f_3).$$

Die oben skizzierten Hauptschritte des Algorithmus können recht komplex sein, doch solange in den Matrizen  $M^{(i)}$  Einträge existieren, die auch in  $\mathbb{F}_5$  liegen, bleibt das Verfahren einfach (ein solches Element teilt alle übrigen). Wir wissen hier bereits  $f_i = 1$ .

Durch Vertauschen von Zeilen (bzw. Spalten) wird ein Element aus  $\mathbb{F}_5 \setminus \{0\}$  in die Position  $(1, 1)$  der Matrix  $M^{(i)}$  gebracht. Dann werden durch die üblichen Eliminationsschritte mittels (1), (2), (3) die von 0 verschiedenen Elemente der ersten Spalte und der ersten Zeile zu Null reduziert. So gewinnen wir  $M^{(i+1)}$ .

Wenn wir in  $M^{(1)}$  die erste Zeile mit der dritten Zeile vertauschen, so erhalten wir

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & X & 0 \\ 0 & X+1 & -1 & -1 \\ X+1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & X \end{pmatrix}.$$

Die Elimination der ersten Spalte liefert

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & X & 0 \\ 0 & X+1 & -1 & -1 \\ 0 & -X-1 & -X^2-X-1 & 1 \\ 0 & 2 & X & X \end{pmatrix}.$$

Bei Elimination der ersten Zeile mittels der ersten Spalte werden die Elemente unter der ersten Zeile nicht verändert. Damit ist  $M^{(2)}$  bereits hier ablesbar, nämlich

$$M^{(2)} = \begin{pmatrix} X+1 & -1 & -1 \\ -X-1 & -X^2-X-1 & 1 \\ 2 & X & X \end{pmatrix}.$$

Auch in dieser Matrix gibt es noch Elemente, die in  $\mathbb{F}_5$  liegen, z.B. das Element  $m_{12}^{(2)}$ . Wir vertauschen so, dass dieses Element in die Position  $(1, 1)$  der Matrix gerät, und gewinnen (evtl. nach Multiplikation der ersten Zeile mit einer geeigneten Konstanten  $\neq 0$ )

$$\begin{pmatrix} 1 & -X-1 & 1 \\ -X^2-X-1 & -X-1 & 1 \\ X & 2 & X \end{pmatrix}.$$

Die Elimination der ersten Spalte ergibt

$$\begin{pmatrix} 1 & -X-1 & 1 \\ 0 & -X^3-2X^2+2X-2 & X^2+X+2 \\ 0 & X^2+X+2 & 0 \end{pmatrix},$$

und wir finden analog zum ersten Schritt

$$M^{(3)} = \begin{pmatrix} -X^3-2X^2+2X-2 & X^2+X+2 \\ X^2+X+2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nun liegt kein Element dieser Matrix in  $\mathbf{F}_5 \setminus \{0\}$ . Wir verzichten hier auf eine Darstellung weiterer Einzelheiten des Verfahrens (vgl. auch 5/4/24). Das Resultat kann jetzt durch einen Kunstgriff gewonnen werden:

Mit  $q := X^2 + X + 2$  gilt

$$M^{(3)} = q \cdot \begin{pmatrix} -X - 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daher teilt  $q$  das Polynom  $f_3$  (und damit auch  $f_4$ ) sowie  $q^2$  das Polynom  $\chi_A = \det(\text{Char}_A)$ . Wegen  $\deg(q^2) = \deg(\chi_A) = 4$  folgt  $q = f_3 = f_4$ . Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X^2 + X + 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^2 + X + 2 \end{pmatrix}$$

als smithsche Normalform der gegebenen Matrix  $\text{Char}_A$ .

### Aufgabe 5/4/143

Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante

**Index:** smithsche Normalform, Präsentationsmatrix einer Matrix, Determinantenteiler einer Matrix, Elementarteiler einer Matrix, charakteristische Matrix, Äquivalenz polynomialer Matrizen

**Stoffeinheiten:** 5/4/14 - 5/4/24 Elementarteiler

$K[X]$  sei der Polynomring über dem Körper  $K$  in einer Unbestimmten  $X$ . Für Matrizen aus  $M(n, K[X])$  wird folgende Äquivalenzrelation eingeführt. Zwei Matrizen sind äquivalent, wenn sie durch Aufeinanderfolge von Umformungen der folgenden drei Typen ineinander überführt werden können:

- (1) Vertauschen zweier Zeilen (bzw. Spalten),
- (2) Multiplikation einer Zeile (bzw. Spalte) mit einer Zahl aus  $K \setminus \{0\}$ ,
- (3) Addition des  $p$ -fachen einer Zeile (bzw. Spalte) zu einer anderen, wobei  $p \in K[X]$ .

Wir betrachten eine Matrix  $A \in M(n, K[X])$  mit der nicht konstanten Determinante  $\det(A) = d \in K[X]$ , wobei die Darstellung der Determinante als Produkt irreduzibler, nicht assoziierter Faktoren  $d_i \in K[X]$  die Eigenschaft hat, dass jeder dieser Faktoren nur in der ersten Potenz auftritt.

Zeigen Sie: Alle Matrizen  $B \in M(n, K[X])$  mit  $\det(B) = c \cdot d$  und  $c \in K^*$  sind im obigen Sinne äquivalent.

**Lösung.** Die zulässigen Umformungen innerhalb einer Äquivalenzklasse werden durch Multiplikation mit Matrizen gewonnen, deren Determinanten in  $K^*$  liegen. Folglich unterscheiden sich die Determinanten der Elemente einer Klasse nur um einen Faktor aus  $K^*$ .

Stimmen umgekehrt die Determinanten zweier Matrizen bis auf einen Faktor aus  $K^*$  überein, so folgt im Allgemeinen noch nicht, dass sie in der selben Äquivalenzklasse liegen. Um das für unseren Spezialfall zu zeigen, wird die Struktur einer solchen Äquivalenzklasse genauer beschrieben. In jeder gibt es eine Matrix  $S$  mit

- (a)  $S = \text{diag}(f_1, f_2, \dots, f_n)$ ,

- (b)  $f_i | f_{i+1}$ ,  $i = 1, \dots, n-1$ ,  
 (c)  $\text{LC}(f_i) = 1$ .

Wir finden eine solche Matrix entsprechend der smithschen Normalform. Aus (a) folgt unmittelbar

$$\det(S) = \prod_{i=1}^n f_i.$$

Aus (b) folgt:  $f_i$  ist Faktor von  $f_{i+1}$ . Damit ist  $f_i^{n-i+1}$  Faktor von  $\det(S)$ . Für unseren Spezialfall  $\det(S) = c' \cdot d$  (mit  $c' \in K^*$ ) folgt  $f_i \in K^*$  für  $i < n$  (anderenfalls treten polynomiale Faktoren höherer Potenz auf). Unter Verwendung von (c) ergibt sich

$$S = \text{diag}(1, \dots, 1, \text{LC}(d)^{-1} \cdot d),$$

wobei  $\text{LC}(d)$  den Leitkoeffizienten des Polynoms  $d$  bezeichnet. Alle Matrizen  $B \in M(n, K[X])$  mit  $\det(B) = c \cdot d$ ,  $c \in K^*$  sind zu  $S$  und damit auch untereinander äquivalent.  $\square$

### Aufgabe 5/4/150

Jordansche Normalform der transponierten Matrix

**Index:** jordansche Normalform einer Matrix, charakteristische Matrix, äquivalente polynomiale Matrizen

**Stoffeinheiten:** [5/4/25 - 5/4/28 Ähnlichkeit über dem Grundkörper](#)

Zeigen Sie, dass die jordanschen Normalformen einer komplexen Matrix  $A$  und ihrer transponierten Matrix  ${}^tA$  übereinstimmen.

### Aufgabe 5/4/160

Minimalpolynom, Eigenschaften

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus](#)

Es sei  $A \in M(n; \mathbb{C})$  eine invertierbare Matrix. Beweisen Sie, dass für jede Zahl  $m \in \mathbb{Z}$  ein Polynom  $f_m \in \mathbb{C}[X]$  existiert mit  $\deg(f_m) \leq n-1$ , so dass  $A^m = f_m(A)$  ist.

### Aufgabe 5/4/170

Einige Eigenschaften des Minimalpolynoms und des charakteristischen Polynoms einer Matrix

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, charakteristisches Polynom einer quadratischen Matrix, jordansche Normalform einer Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/4/1 - 5/4/13 Normalform eines Endomorphismus](#)

$V$  sei ein  $K$ -Vektorraum der endlichen Dimension  $n \geq 1$ ,  $\varphi : V \rightarrow V$  ein Endomorphismus und  $U_1, U_2$  zwei  $\varphi$ -invariante Unterräume, für die  $V = U_1 \oplus U_2$  gilt. Mit  $\varphi_1 : U_1 \rightarrow U_1$  und  $\varphi_2 : U_2 \rightarrow U_2$  bezeichnen wir die Einschränkungen von  $\varphi$  auf die beiden direkten Summanden,  $\chi, \chi_1$  bzw.  $\chi_2$ , bezeichnen die charakteristischen Polynome von  $\varphi, \varphi_1$  bzw.  $\varphi_2$  und  $m, m_1$  bzw.  $m_2$  die entsprechenden Minimalpolynome aus  $K[X]$ .

Entscheiden Sie für jede der folgenden Aussagen, ob sie

- a) immer richtig,  
 b) immer falsch,  
 c) in Abhängigkeit von den gegebenen Daten in gewissen Fällen richtig, in anderen falsch ist.

$$(1) \quad \chi = \chi_1 \cdot \chi_2$$

$$(2) \quad \chi = \text{kgV}(\chi_1, \chi_2)$$

$$(3) \quad \chi = \text{ggT}(\chi_1, \chi_2)$$

$$(4) \quad m = m_1 \cdot m_2$$

$$(5) \quad m = \text{kgV}(m_1, m_2)$$

$$(6) \quad m = \text{ggT}(m_1, m_2)$$

### Aufgabe 5/5/002

Jordanzerlegung (1)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, Jordanzerlegung einer Matrix, nilpotente Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/5/5 - 5/5/7 Jordanzerlegung über den reellen Zahlen](#)

Für die komplexe Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 4 & 0 \\ -9 & 8 & 0 \\ -7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

sind eine diagonalisierbare Matrix  $B$  und eine nilpotente Matrix  $C$  zu bestimmen, für die  $C \cdot B = B \cdot C$  und  $A = B + C$  ist.

### Aufgabe 5/5/003

(S: Varianten)

Jordanzerlegung (2) (Charakteristik 7)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, Jordanzerlegung einer Matrix, nilpotente Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** [5/5/5 - 5/5/7 Jordanzerlegung über den reellen Zahlen](#)

Bestimmen Sie die Jordanzerlegung Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{F}_7.$$

**Lösung.** Mit  $\mathbb{F}$  bezeichnen wir den Zerfällungskörper des charakteristischen Polynoms der gegebenen Matrix, mit  $\varphi$  den (bezüglich der Standardbasis) zu  $A$  gehörigen Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{F}^4$ .

Nun wird  $A$  (über  $\mathbb{F}$ ) durch eine Ähnlichkeitstransformation in die jordanische Normalform überführt. Dazu bestimmen wir zunächst das charakteristische Polynom  $\chi_A = \det(X \cdot$

$E_4 - A) = X^4 + 2X^2 + 1$ . Seine Nullstellen liegen offensichtlich nicht in  $\mathbb{F}_7$ . Es ist aber leicht, den Zerfällungskörper anzugeben; wir erhalten ihn als  $\mathbb{F} = \mathbb{F}_7[i]$ , wobei  $i$  ein algebraisches Element mit dem Minimalpolynom  $X^2 + 1$  bezeichnet (dieses Polynom ist über  $\mathbb{F}_7$  irreduzibel). Nun ergeben sich für  $\varphi$  die Eigenwerte  $\lambda_1 = -i$  und  $\lambda_2 = i$  der Matrix  $A$ , die beide die algebraische Multiplizität 2 haben. Zur Bestimmung einer zyklischen Basis des Hauptraumes  $H_1 := H(\varphi, \lambda_1)$  lösen wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} (i+3) & -1 & 1 & -2 \\ -2 & (i-2) & 1 & 1 \\ -1 & 2 & (i-1) & 3 \\ 0 & 2 & 0 & i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

das den Unterraum  $\ker(\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id}) \subseteq H_1$  beschreibt. Er ist eindimensional und wird von dem Vektor

$$\mathbf{v}_2 = (-(3i+2), 3i, -2, 1)$$

erzeugt, d.h.  $\mathbf{v}_2$  ist ein Eigenvektor von  $A$  bezüglich  $\lambda_1$ . Nun muss wegen  $\dim(H_1) = 2$  jeder Urbildvektor  $\mathbf{v}_1 \in (\varphi - \lambda_1 \text{id})^{-1}(\mathbf{v}_2)$  zusammen mit  $\mathbf{v}_2$  eine Kette  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  zyklischer Vektoren für  $H_1$  bilden (Beweis?). Wir finden

$$\mathbf{v}_1 = ((2i+2), -3, (3i-2), 0)$$

als Lösung von

$$\begin{pmatrix} (i+3) & -1 & 1 & -2 \\ -2 & (i-2) & 1 & 1 \\ -1 & 2 & (i-1) & 3 \\ 0 & 2 & 0 & i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -(3i+2) \\ 3i \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend ergeben sich zyklische Vektoren

$$\mathbf{v}_3 = (-(2i-2), -3, -(3i+2), 0)$$

$$\mathbf{v}_4 = ((3i-2), -3i, -2, 1)$$

für  $H(\varphi, \lambda_2)$  als Lösungen der Gleichungssysteme  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot {}^t\mathbf{v}_4 = 0$  ( $\mathbf{v}_4 \neq \mathbf{0}$ ) und  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot {}^t\mathbf{v}_3 = {}^t\mathbf{v}_4$ . Mit der Übergangsmatrix

$$U = \begin{pmatrix} (2i+2) & -(3i+2) & -(2i-2) & (3i-2) \\ -3 & 3i & -3 & -3i \\ (3i-2) & -2 & -(3i+2) & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  und  $\mathbf{v}_4$  gebildet werden, erhalten wir die jordanische Normalform  $U^{-1} \cdot A \cdot U = G + F$  der Matrix  $A$  über  $\mathbb{F}$  mit

$$G = \begin{pmatrix} -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$G$  ist eine halbeinfache Matrix,  $F$  nilpotent sowie  $F \cdot G = G \cdot F$ .

Mit  $B = U \cdot G \cdot U^{-1}$  und  $N = U \cdot F \cdot U^{-1}$ ,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & -3 & 2 \\ -2 & 1 & 2 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & -3 \\ -1 & -1 & -3 & -1 \\ 1 & 1 & -3 & 3 \\ 3 & 3 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

erhalten wir eine Jordanzerlegung für  $A$ , d.h.  $A = B + N$ , wobei  $B$  halbeinfach,  $N$  nilpotent und  $B \cdot N = N \cdot B$  ist.

Wir sehen überdies, dass die Matrizen  $B$ ,  $N$  in  $M(4; \mathbb{F}_7)$  liegen.

### Aufgabe 5/5/005

Jordanzerlegung (3)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, Jordanzerlegung einer Matrix, nilpotente Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/5 - 5/5/7 [Jordanzerlegung über den reellen Zahlen](#)

Bestimmen Sie die Jordanzerlegungen der folgenden Matrizen.

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

### Aufgabe 5/5/006

(S: Varianten)

Jordanzerlegung (4)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, Jordanzerlegung einer Matrix, nilpotente Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/5 - 5/5/7 [Jordanzerlegung über den reellen Zahlen](#)

Bestimmen Sie die Jordanzerlegung der reellen Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Das charakteristische Polynom ist ein Quadrat.

**Lösung.** Den (bezüglich der Standardbasis) zu  $A$  gehörigen Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^4$  bezeichnen wir mit  $\varphi$ .

Zunächst wird  $A$  (über den komplexen Zahlen, falls erforderlich) durch eine Ähnlichkeitstransformation in die jordanische Normalform überführt. Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms

$$\chi_A = \det(X \cdot E_4 - A) = X^4 + 4X^3 + 4X^2 = (X^2 + 2X)^2$$

und erhalten die reellen Eigenwerte  $\lambda_1 = 0$  und  $\lambda_2 = -2$  der Matrix  $A$ , die beide die algebraische Multiplizität 2 haben. Zur Bestimmung einer zyklischen Basis des Hauptraumes  $H_1 := H(\varphi, \lambda_1)$  lösen wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

das den Unterraum  $\ker(\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id}) \subseteq H_1$  beschreibt. Er ist eindimensional und wird von dem Vektor

$$\mathbf{v}_2 = (-1, 1, 0, 0)$$

erzeugt, d.h.  $\mathbf{v}_2$  ist ein Eigenvektor von  $A$  bezüglich  $\lambda_1$ . Nun muss wegen  $\dim(H_1) = 2$  jeder Urbildvektor  $\mathbf{v}_1 \in (\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id})^{-1}(\mathbf{v}_2)$  zusammen mit  $\mathbf{v}_2$  eine Kette  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  zyklischer Vektoren für  $H_1$  bilden (Beweis?). Wir finden

$$\mathbf{v}_1 = (-5, 0, 2, -2)$$

als Lösung von

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend ergeben sich zyklische Vektoren

$$\mathbf{v}_3 = (-1, 0, 2, 2)$$

$$\mathbf{v}_4 = (1, 1, 0, 0)$$

für  $H(\varphi, \lambda_2)$  als Lösungen der Gleichungssysteme  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot \mathbf{v}_4 = 0$  ( $\mathbf{v}_4 \neq \mathbf{0}$ ) und  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_4$ . Mit der Übergangsmatrix

$$U = \begin{pmatrix} -5 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix},$$

deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$ ,  $\mathbf{v}_3$  und  $\mathbf{v}_4$  gebildet werden, erhalten wir die jordanische Normalform  $U^{-1} \cdot A \cdot U = G + F$  der Matrix  $A$  mit

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Nun ist  $G$  eine Diagonalmatrix,  $F$  nilpotent, sowie  $F \cdot G = G \cdot F$ .

Mit der diagonalisierbaren Matrix  $B = U \cdot G \cdot U^{-1}$  und der nilpotenten Matrix  $N = U \cdot F \cdot U^{-1}$  erhalten wir die Jordanzerlegung von  $A$ , d.h.  $A = B + N$ , wobei  $B \in M(4; \mathbb{R})$  halbeinfach,  $N \in M(4; \mathbb{R})$  nilpotent,  $B \cdot N = N \cdot B$  ist und

$$B = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}, \quad N = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 5/5/007**  
Jordanzerlegung (5)

(S: Varianten)

**Index:** Minimalpolynom einer quadratischen Matrix, Jordanzerlegung einer Matrix, nilpotente Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/5 - 5/5/7 Jordanzerlegung über den reellen Zahlen

Bestimmen Sie die Jordanzerlegung der reellen Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 8 & 5 \\ -2 & -6 & -10 & -5 \\ 3 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Hinweis.** Das charakteristische Polynom ist ein Quadrat.

**Lösung.** Den (bezüglich der Standardbasis) zu  $A$  gehörigen Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{C}^4$  bezeichnen wir mit  $\varphi$ .

Zunächst wird  $A$  (über den komplexen Zahlen) durch eine Ähnlichkeitstransformation in die Jordansche Normalform überführt. Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_4 - A) = X^4 + 4X^3 + 8X^2 + 8X + 4 = (X^2 + 2X + 2)^2$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = -1 + i$  und  $\lambda_2 = -1 - i$  der Matrix  $A$ , die beide die algebraische Multiplizität 2 haben. Zur Bestimmung einer zyklischen Basis des Hauptraumes  $H_1 := H(\varphi, \lambda_1)$  lösen wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -(i-1) & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -(i-5) & 8 & 5 \\ -2 & -6 & -(i+9) & -5 \\ 3 & 4 & 6 & -(i-3) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

das den Unterraum  $\ker(\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id}) \subseteq H_1$  beschreibt. Er ist eindimensional und wird von dem Vektor

$$\mathbf{v}_2 = (0, -(i-3), (i-3), 2)$$

erzeugt, d.h.  $\mathbf{v}_2$  ist ein Eigenvektor von  $A$  bezüglich  $\lambda_1$ . Nun muss wegen  $\dim(H_1) = 2$  jeder Urbildvektor  $\mathbf{v}_1 \in (\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id})^{-1}(\mathbf{v}_2)$  zusammen mit  $\mathbf{v}_2$  eine Kette  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  zyklischer Vektoren für  $H_1$  bilden (Beweis?). Wir finden

$$\mathbf{v}_1 = ((2i-2), -(9i+4), (5i+4), 0)$$

als Lösung von

$$\begin{pmatrix} -(i-1) & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -(i-5) & 8 & 5 \\ -2 & -6 & -(i+9) & -5 \\ 3 & 4 & 6 & -(i-3) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -(i-3) \\ (i-3) \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend ergeben sich zyklische Vektoren

$$\mathbf{v}_3 = (-(2i+2), (9i-4), -(5i-4), 0)$$

$$\mathbf{v}_4 = (0, (i+3), -(i+3), 2)$$

für  $H(\varphi, \lambda_2)$  als Lösungen der Gleichungssysteme  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot {}^t\mathbf{v}_4 = 0$  ( $\mathbf{v}_4 \neq \mathbf{0}$ ) und  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot {}^t\mathbf{v}_3 = {}^t\mathbf{v}_4$ . Mit der Übergangsmatrix

$$U = \begin{pmatrix} (2i-2) & 0 & -(2i+2) & 0 \\ -(9i+4) & -(i-3) & (9i-4) & (i+3) \\ (5i+4) & (i-3) & -(5i-4) & -(i+3) \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$ ,  $\mathbf{v}_3$  und  $\mathbf{v}_4$  gebildet werden, erhalten wir die komplexe jordanische Normalform  $U^{-1} \cdot A \cdot U = G + F$  der Matrix  $A$  mit

$$G = \begin{pmatrix} (i-1) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (i-1) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(i+1) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(i+1) \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Offensichtlich ist  $G$  eine halbeinfache Matrix,  $F$  nilpotent, sowie  $F \cdot G = G \cdot F$ . Mit der halbeinfachen Matrix  $B = U \cdot G \cdot U^{-1}$  und der nilpotenten Matrix  $N = U \cdot F \cdot U^{-1}$  erhalten wir die (reelle!) Jordanzerlegung von  $A$ , d.h.  $A = B + N$ , wobei  $B \in M(4; \mathbb{R})$  halbeinfach,  $N \in M(4; \mathbb{R})$  nilpotent,  $B \cdot N = N \cdot B$  ist und

$$B = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 9 & 17 & 10 \\ -7 & -13 & -21 & -10 \\ 8 & 9 & 13 & 4 \end{pmatrix}, \quad N = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 5/5/008

(S: Varianten)

Jordanzerlegung (6)

**Index:** Minimalpolynom einer Matrix, Jordanzerlegung einer Matrix, nilpotente Matrix, halbeinfache Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/5 - 5/5/7 Jordanzerlegung über den reellen Zahlen

Bestimmen Sie die Jordanzerlegung der reellen Matrix

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 6 & 4 & -8 & 4 \\ 14 & 6 & -16 & 12 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Den (bezüglich der Standardbasis) zu  $A$  gehörigen Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{C}^4$  bezeichnen wir mit  $\varphi$ .

Zunächst wird  $A$  (über den komplexen Zahlen) durch eine Ähnlichkeitstransformation in die jordanische Normalform überführt. Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_4 - A) = X^4 + 8X^2 + 16$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 2i$  und  $\lambda_2 = -2i$  der Matrix  $A$ , die beide die algebraische Multiplizität 2 haben. Zur Bestimmung einer zyklischen Basis des Hauptraumes  $H_1 := H(\varphi, \lambda_1)$  lösen wir das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -(2i+4) & 0 & 4 & -6 \\ 0 & -2i & -2 & 2 \\ 6 & 4 & -(2i+8) & 4 \\ 14 & 6 & -16 & -(2i-12) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

das den Unterraum  $\ker(\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id}) \subseteq H_1$  beschreibt. Er ist eindimensional und wird von dem Vektor

$$\mathbf{v}_2 = ((2i-4), -4i, -2, 2)$$

erzeugt, d.h.  $\mathbf{v}_2$  ist ein Eigenvektor von  $A$  bezüglich  $\lambda_1$ . Nun muss wegen  $\dim(H_1) = 2$  jeder Urbildvektor  $\mathbf{v}_1 \in (\varphi - \lambda_1 \cdot \text{id})^{-1}(\mathbf{v}_2)$  zusammen mit  $\mathbf{v}_2$  eine Kette  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  zyklischer Vektoren für  $H_1$  bilden (Beweis?). Wir finden

$$\mathbf{v}_1 = (-(4i - 3), (4i + 4), -(2i - 4), 0)$$

als Lösung von

$$\begin{pmatrix} -(2i + 4) & 0 & 4 & -6 \\ 0 & -2i & -2 & 2 \\ 6 & 4 & -(2i + 8) & 4 \\ 14 & 6 & -16 & -(2i - 12) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2i - 4) \\ -4i \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Entsprechend ergeben sich zyklische Vektoren

$$\mathbf{v}_3 = ((4i + 3), -(4i - 4), (2i + 4), 0)$$

$$\mathbf{v}_4 = (-(2i + 4), 4i, -2, 2)$$

für  $H(\varphi, \lambda_2)$  als Lösungen der Gleichungssysteme  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot \mathbf{v}_4 = 0$  ( $\mathbf{v}_4 \neq \mathbf{0}$ ) und  $(A - \lambda_2 \cdot E_4) \cdot \mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_4$ . Mit der Übergangsmatrix

$$U = \begin{pmatrix} -(4i - 3) & (2i - 4) & (4i + 3) & -(2i + 4) \\ (4i + 4) & -4i & -(4i - 4) & 4i \\ -(2i - 4) & -2 & (2i + 4) & -2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$ ,  $\mathbf{v}_3$  und  $\mathbf{v}_4$  gebildet werden, erhalten wir die komplexe jordanische Normalform  $U^{-1} \cdot A \cdot U = G + F$  der Matrix  $A$  mit

$$G = \begin{pmatrix} 2i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2i \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Offensichtlich ist  $G$  eine halbeinfache Matrix,  $F$  nilpotent, sowie  $F \cdot G = G \cdot F$ . Mit der halbeinfachen Matrix  $B = U \cdot G \cdot U^{-1}$  und der nilpotenten Matrix  $N = U \cdot F \cdot U^{-1}$  erhalten wir die (reelle!) Jordanzerlegung von  $A$ , d.h.  $A = B + N$ , wobei  $B \in M(4; \mathbb{R})$  halbeinfach,  $N \in M(4; \mathbb{R})$  nilpotent,  $B \cdot N = N \cdot B$  ist und

$$B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 5 & -5 \\ 8 & 4 & -12 & 8 \\ 8 & 5 & -10 & 6 \\ 12 & 5 & -14 & 10 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -1 \\ -8 & -4 & 10 & -6 \\ -2 & -1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/010

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (1)

**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

Bestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4; \mathbb{F}_5)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{F}_5[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X+2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & X & 0 & 1 \\ 2 & 0 & X+1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & X+1 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^3 + X^2 - X \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher zwei von 1 verschiedene Elementarteiler  $e_3(A) = X-2$ ,  $e_4(A) = X^3 + X^2 - X$ . Die aus den beiden Begleitmatrizen gebildete Blockdiagonalmatrix  $B$  ist die natürliche Form der Matrix  $A$ ,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 5/5/012

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (2)

**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

Bestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4, \mathbb{F}_5)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & -2 \\ -1 & -2 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{F}_5[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X & 2 & -1 & 2 \\ 1 & X+2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & X-2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 & X-1 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^4 - X^3 + X^2 - 2 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher einen einzigen von 1 verschiedenen Elementarteiler  $e_4(A) = X^4 - X^3 + X^2 - 2$ , dessen Begleitmatrix  $B = B(e_4(A))$  in diesem Fall die natürliche Form der Matrix  $A$  ist,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/015

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (3)**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 [Natürliche Form](#), [rationale und klassische Normalform](#)Bestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4; \mathbb{F}_5)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & -1 \\ -2 & 0 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{F}_5[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X+1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & X+2 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & X-2 & -2 \\ 1 & -2 & -1 & X-1 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^4 + 2X^2 - X - 2 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher einen einzigen von 1 verschiedenen Elementarteiler  $e_4(A) = X^4 + 2X^2 - X - 2$ , dessen Begleitmatrix  $B = B(e_4(A))$  in diesem Fall die natürliche Form der Matrix  $A$  ist,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/020

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (1)**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 [Natürliche Form](#), [rationale und klassische Normalform](#)Bestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4; \mathbb{Q})$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 6 & -2 & 3 & -7 \\ 6 & -1 & 1 & -7 \\ 6 & -3 & 3 & -7 \\ 6 & -3 & 3 & -7 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{Q}[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X-6 & 2 & -3 & 7 \\ -6 & X+1 & -1 & 7 \\ -6 & 3 & X-3 & 7 \\ -6 & 3 & -3 & X+7 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X-2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^3 + X^2 - 6X \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher zwei von 1 verschiedene Elementarteiler  $e_3(A) = X - 2$ ,  $e_4(A) = X^3 + X^2 - 6X$ . Die aus den beiden Begleitmatrizen gebildete Blockdiagonalmatrix  $B$  ist die natürliche Form der Matrix  $A$ ,

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

#### Aufgabe 5/5/022

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (2)

**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

Bestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4, \mathbb{Q})$ ,

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -3 & 1 \\ -5 & -1 & 1 & 4 \\ -5 & 3 & -3 & 4 \\ 3 & 3 & -3 & -4 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{Q}[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X+2 & -4 & 3 & -1 \\ 5 & X+1 & -1 & -4 \\ 5 & -3 & X+3 & -4 \\ -3 & -3 & 3 & X+4 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X+4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^3 + 6X^2 + 10X + 8 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher zwei von 1 verschiedene Elementarteiler  $e_3(A) = X + 4$ ,  $e_4(A) = X^3 + 6X^2 + 10X + 8$ . Die aus den beiden Begleitmatrizen gebildete Blockdiagonalmatrix  $B$  ist die natürliche Form der Matrix  $A$ ,

$$B = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 0 \\ 0 & -10 & 0 & 1 \\ 0 & -8 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/025

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (3)**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische NormalformBestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4; \mathbb{Q})$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 5 & -5 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 & -5 \\ 0 & -2 & 7 & -6 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{Q}[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X & 1 & -5 & 5 \\ -1 & X+1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & X-5 & 5 \\ 0 & 2 & -7 & X+6 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^4 + 2X^3 + X^2 + X + 4 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher einen einzigen von 1 verschiedenen Elementarteiler  $e_4(A) = X^4 + 2X^3 + X^2 + X + 4$ , dessen Begleitmatrix  $B = B(e_4(A))$  in diesem Fall die natürliche Form der Matrix  $A$  ist,

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/030

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (1)**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische NormalformBestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4; \mathbb{F}_2)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{F}_2[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X+1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 & 1 \\ 0 & 1 & X+1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & X+1 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & X+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^3+1 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher zwei von 1 verschiedene Elementarteiler  $e_3(A) = X+1$ ,  $e_4(A) = X^3+1$ . Die aus den beiden Begleitmatrizen gebildete Blockdiagonalmatrix  $B$  ist die natürliche Form der Matrix  $A$ ,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/032

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (2)

**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

Bestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4, \mathbb{F}_2)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{F}_2[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X+1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & X+1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & X+1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & X+1 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^4+X+1 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher einen einzigen von 1 verschiedenen Elementarteiler  $e_4(A) = X^4+X+1$ , dessen Begleitmatrix  $B = B(e_4(A))$  in diesem Fall die natürliche Form der Matrix  $A$  ist,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/035

(S: Varianten)

Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (3)**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische NormalformBestimmen Sie die natürliche Form der Matrix  $A \in M(4; \mathbb{F}_2)$ ,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.** Wir berechnen zunächst die Elementarteiler  $e_1(A), \dots, e_4(A)$  aus  $\mathbb{F}_2[X]$ . Dazu wird die charakteristische Matrix

$$X \cdot E_4 - A = \begin{pmatrix} X+1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & X & 1 & 1 \\ 1 & 0 & X & 1 \\ 0 & 1 & 1 & X+1 \end{pmatrix}$$

durch Zeilen- und Spaltenoperationen äquivalent umgeformt. Wir erhalten

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & X^4 + X^2 + X + 1 \end{pmatrix}$$

als Normalform einer Präsentationsmatrix für  $A$ . Es gibt daher einen einzigen von 1 verschiedenen Elementarteiler  $e_4(A) = X^4 + X^2 + X + 1$ , dessen Begleitmatrix  $B = B(e_4(A))$  in diesem Fall die natürliche Form der Matrix  $A$  ist,

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe** 5/5/040

(S: Varianten)

Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1)

**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix, Hyperbegleitmatrix, klassische Normalform, primäre Elementarteiler, rationale Normalform einer Matrix**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

Bestimmen Sie die erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix mit den nichttrivialen Elementarteilern

$$e_6 = X - 2,$$

$$e_7 = X^3 - 2X^2 + 9X - 18,$$

$$e_8 = X^4 - 4X^3 + 13X^2 - 36X + 36$$

aus  $K[X]$  in jedem der Fälle  $K = \mathbb{R}$  und  $K = \mathbb{C}$ .

**Lösung.** Die natürliche Form (erste Normalform) ist die aus den Begleitmatrizen  $B(e_8)$ ,  $B(e_7)$  und  $B(e_6)$  der nichttrivialen Elementarteiler gebildete Blockmatrix, daher in beiden Fällen gegeben durch

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -13 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 36 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -36 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 18 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \in M(8, K).$$

Zur Bestimmung der primären Elementarteiler ist über  $\mathbb{R}$ , bzw.  $\mathbb{C}$  die Zerlegung der Elementarteiler in irreduzible Faktoren auszuführen. Dies wird durch die Teilbarkeitseigenschaft  $e_6 | e_7 | e_8$  erleichtert. Division von  $e_7$  durch  $p := e_6 = X - 2$  ergibt  $q := X^2 + 9$ , und nach Division von  $e_8$  durch  $e_7 = p \cdot q$  folgt  $e_8 = p^2 \cdot q$ . Offensichtlich sind  $p$  und  $q$  über  $\mathbb{R}$  irreduzibel, daher erhalten wir die primären Elementarteiler  $(p^2, p, p, q, q)$ . Die aus den Begleitmatrizen dieser Polynome gebildete Blockdiagonalmatrix ist folglich die zweite Normalform (rationale kanonische Form)

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 0 \end{pmatrix}.$$

Im Fall  $K = \mathbb{C}$  zerfällt  $q$  dagegen in zwei irreduzible Faktoren  $q_1 = X + 3i$ ,  $q_2 = X - 3i$ , so dass in diesem Fall die primären Elementarteiler durch  $(p^2, p, p, q_1, q_1, q_2, q_2)$  gegeben sind. Als zweite Normalform ergibt sich über den komplexen Zahlen daher die Matrix

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -3i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3i \end{pmatrix}.$$

Zur Bestimmung der dritten Normalform (der klassischen Form) ist nun noch in beiden Fällen der Block  $B(p^2)$  durch die Hyperbegleitmatrix  $B(p, 2)$  zu ersetzen. So entstehen die Matrizen

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3i \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3i \end{pmatrix}$$

für  $K = \mathbb{R}$  bzw.  $K = \mathbb{C}$  (jordansche Normalform).

### Aufgabe 5/5/045

(S: Varianten)

Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2)

**Index:** Begleitmatrix, Elementarteiler einer Matrix, nichttriviale Elementarteiler, natürliche Form einer Matrix, Hyperbegleitmatrix, klassische Normalform, primäre Elementarteiler, rationale Normalform einer Matrix

**Stoffeinheiten:** 5/5/8 - 5/5/15 Natürliche Form, rationale und klassische Normalform

Bestimmen Sie die erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix mit den nichttrivialen Elementarteilern

$$e_7 = X - 4,$$

$$e_8 = X^3 - 8X^2 + 24X - 32,$$

$$e_9 = X^5 - 12X^4 + 64X^3 - 192X^2 + 320X - 256$$

aus  $K[X]$  in jedem der Fälle  $K = \mathbb{R}$  und  $K = \mathbb{C}$ .

**Lösung.** Die natürliche Form (erste Normalform) ist die aus den Begleitmatrizen  $B(e_9)$ ,  $B(e_8)$  und  $B(e_7)$  der nichttrivialen Elementarteiler gebildete Blockmatrix, daher in beiden Fällen gegeben durch

$$\begin{pmatrix} 12 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -64 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 192 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -320 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 256 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -24 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \in M(9; K).$$

Zur Bestimmung der primären Elementarteiler ist über  $\mathbb{R}$ , bzw.  $\mathbb{C}$  die Zerlegung der Elementarteiler in irreduzible Faktoren auszuführen. Dies wird durch die Teilbarkeitseigenschaft  $e_7 | e_8 | e_9$  erleichtert. Division von  $e_8$  durch  $p := e_7 = X - 4$  ergibt  $q := X^2 - 4X + 8$ , und Division von  $e_9$  durch  $e_8 = p \cdot q$  ergibt  $q$ , d.h.  $e_9 = p \cdot q^2$ .

$p$  ist linear und  $q$  hat zwei verschiedene konjugiert komplexe Nullstellen, daher sind  $p$  und  $q$  über  $\mathbb{R}$  irreduzibel. Wir erhalten als primäre Elementarteiler  $(p, p, p, q^2, q)$  mit  $q^2 = X^4 - 8X^3 + 32X^2 - 64X + 64$ . Die aus den Begleitmatrizen dieser Polynome gebildete Blockdiagonalmatrix ist die zweite Normalform (rationale kanonische Form)

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -32 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 64 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -64 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}$$

über  $\mathbb{R}$ . Im Fall  $K = \mathbb{C}$  zerfällt  $q$  dagegen in zwei irreduzible Faktoren  $q_1 = X + (2i - 2)$ ,  $q_2 = X - (2i + 2)$ , so dass hier die primären Elementarteiler durch  $(p, p, p, q_1^2, q_1, q_2^2, q_2)$ ,  $q_1^2 = X^2 + (4i - 4)X - 8i$ ,  $q_2^2 = X^2 - (4i + 4)X + 8i$  gegeben sind. Als zweite Normalform entsteht über den komplexen Zahlen daher die Matrix

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(4i - 4) & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 8i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -(2i - 2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (4i + 4) & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -8i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (2i + 2) \end{pmatrix}.$$

Zur Bestimmung der dritten Normalform (der klassischen Form) ist im Fall  $K = \mathbb{R}$  der Block  $B(q^2)$  in der zweiten Normalform durch die Hyperbegleitmatrix

$$\begin{pmatrix} B(q) & 0 \\ M & B(q) \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

zu ersetzen. So entsteht die Matrix

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -8 \end{pmatrix}.$$

Für  $K = \mathbb{C}$  erhalten wir als klassische Form die jordansche Normalform

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -(2i-2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -(2i-2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -(2i-2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (2i+2) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & (2i+2) \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & (2i+2) \end{pmatrix}.$$

## Aufgaben zum Kapitel 6

### Aufgabe 6/1/010

(S: Varianten)

Gleichungen für Unterräume

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Parameterdarstellung eines affinen Unterraumes, Ebene

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

$Y = P + \mathbb{R}\mathbf{v} + \mathbb{R}\mathbf{w} \subseteq \mathbb{R}^4$  sei eine Parameterdarstellung der Ebene  $Y$  im 4-dimensionalen affinen Standardraum, die durch

$$P = (-1, 4, 5, 5), \quad \mathbf{v} = (2, 3, 0, -1), \quad \mathbf{w} = (0, -2, 0, 2)$$

gegeben wird. Bestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem mit der Lösungsmenge  $Y$ .

**Lösung.** Ist  $U := T(Y) = \mathbb{R}\mathbf{v} + \mathbb{R}\mathbf{w}$  der Translationsraum von  $Y$ , so gilt  $U = W^\perp$ , wobei  $W$  den Raum derjenigen Linearformen auf  $\mathbb{R}^4$  bezeichnet, die auf  $U$  verschwinden,

$$W = \{\mathbf{u} \in (\mathbb{R}^4)^* \mid \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle = 0\}.$$

Schreiben wir  $(x_1, x_2, x_3, x_4)$  für das Koordinatenquadrupel eines Vektors  $\mathbf{u} \in (\mathbb{R}^4)^*$  bezüglich der dualen Basis  $(\mathbf{e}_1^*, \dots, \mathbf{e}_4^*)$ , so ist die Bedingung  $\mathbf{u} \in W$  dazu äquivalent, dass das homogene lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

erfüllt ist. Eine zeilenäquivalente Umformung der Koeffizientenmatrix ergibt die Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

aus der sich eine Basis  $((0, 0, 1, 0), (-1, 1, 0, 1))$  der Lösungsmenge ablesen lässt. Bezeichnet  $A$  die Matrix mit diesen Zeilen, so ist  $Ax = A \cdot {}^tP$  ein Gleichungssystem, dessen Lösungsmenge den Punkt  $P \in Y$  enthält und dessen zugehöriges homogenes System die Lösungsmenge  $T(Y) = U$  besitzt. Wir erhalten

$$\begin{aligned} x_3 &= 5 \\ -x_1 + x_2 + x_4 &= 10 \end{aligned}$$

als lineares Gleichungssystem mit der Lösungsmenge  $Y$ .

### Aufgabe 6/1/020

Translationen

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Translation, Translationsvektorraum eines affinen Raumes

**Stoffeinheiten:** 6/1/5 - 6/1/9 Affine Abbildungen

$(X, T(X), \tau)$  sei ein affiner Raum,  $f : X \rightarrow X$  eine affine Abbildung, für die  $T(f) = \text{id}_{T(X)}$  ist.

Beweisen Sie:  $f$  ist eine Translation, d.h. es existiert ein Vektor  $\mathbf{v} \in T(X)$ , für den  $f = \tau_{\mathbf{v}}$  gilt ( $\tau_{\mathbf{v}}$  ist hierbei – wie üblich – die durch  $\mathbf{v}$  definierte Translationsabbildung  $\tau_{\mathbf{v}} : X \rightarrow X, P \mapsto P + \mathbf{v}$ ).

**Aufgabe 6/1/030**

(S: Varianten)

Parameterdarstellung für Unterräume

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Parameterdarstellung eines affinen Unterraumes, affines Erzeugendensystem**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine UnterräumeWir betrachten den Unterraum  $Y$  des affinen Standardraumes  $\mathbb{R}^4$ , der durch das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + x_3 - 3x_4 &= -10 \\ -x_1 - x_2 - 3x_3 - 3x_4 &= 8 \end{aligned}$$

gegeben ist.

- (1) Beschreiben Sie  $Y$  in Parameterform.
- (2) Geben Sie ein affines Erzeugendensystem für  $Y$  an.

**Lösung.** Mit dem Gaußschen Algorithmus ist für das Gleichungssystem leicht die Lösungsmenge

$$Y = \{(-14, 6, 0, 0) + t_1 \cdot (-8, 5, 1, 0) + t_2 \cdot (-12, 9, 0, 1) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$$

zu finden. Aus der Parameterdarstellung  $Y = P + \mathbb{R}\mathbf{v}_1 + \mathbb{R}\mathbf{v}_2$  mit

$$P = (-14, 6, 0, 0), \quad \mathbf{v}_1 = (-8, 5, 1, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (-12, 9, 0, 1)$$

erhalten wir ein affines Erzeugendensystem  $\{P, P_1, P_2\}$ , wobei

$$P_1 = P + \mathbf{v}_1 = (-22, 11, 1, 0), \quad P_2 = P + \mathbf{v}_2 = (-26, 15, 0, 1)$$

gewählt wurden.

**Anmerkung.** Offensichtlich ist  $\{P, P_1, P_2\}$  sogar eine affine Basis des Unterraumes  $Y$ . Dies ist immer der Fall, wenn wir in vertrauter Weise mit dem Gaußschen Algorithmus vorgehen.**Aufgabe 6/1/040**

(S: Varianten)

Affine Basen für Unterräume (1)

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, affine Basis, affines Erzeugendensystem, Verbindungsraum**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine KoordinatenIm affinen Standardraum  $\mathbb{R}^4$  wird der Unterraum  $Y_1$  durch das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 &= -6 \\ 3x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 &= 30 \end{aligned}$$

und der Unterraum  $Y_2$  durch das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 15 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 &= 1 \end{aligned}$$

gegeben.

Bestimmen Sie für  $Y_1$ ,  $Y_1 \cap Y_2$ ,  $Y_1 \vee Y_2$  je eine affine Basis!**Lösung.** Mit dem Gaußschen Algorithmus ist für das erste Gleichungssystem leicht die Lösungsmenge

$$Y_1 = \{(7, -9, 0, 0) + t_1 \cdot (2, 0, 3, 0) + t_2 \cdot (1, -3, 0, 3) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{R}\}$$

zu finden. Aus der Parameterdarstellung  $Y_1 = P + \mathbb{R}\mathbf{v}_1 + \mathbb{R}\mathbf{v}_2$  mit

$$P = (7, -9, 0, 0), \quad \mathbf{v}_1 = (2, 0, 3, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (1, -3, 0, 3)$$

erhalten wir eine affine Basis  $\{P, P_1, P_2\}$ , wobei

$$P_1 = P + \mathbf{v}_1 = (9, -9, 3, 0), \quad P_2 = P + \mathbf{v}_2 = (8, -12, 0, 3)$$

gewählt wurden.

Nun wird der Durchschnitt  $Y_1 \cap Y_2$  bestimmt. Wir erhalten ihn durch das lineare Gleichungssystem

$$3x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 2x_4 = -6$$

$$3x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 30$$

$$3x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 15$$

$$x_1 + 3x_2 - 2x_3 - 3x_4 = 1$$

(gebildet aus den Gleichungen für  $Y_1$  und  $Y_2$ ). Die Lösungsmenge ist

$$Y_1 \cap Y_2 = \{(4, -6, -3, -3)\},$$

und dieser Punkt ist gleichzeitig eine affine Basis des Unterraumes  $Y_1 \cap Y_2$ .

Zur Bestimmung einer affinen Basis für  $Y_1 \vee Y_2$  erinnern wir an die Dimensionsformel für den Verbindungsraum. Sie lautet (für  $Y_1 \cap Y_2 \neq \emptyset$ )

$$\dim(Y_1 \vee Y_2) = \dim(Y_1) + \dim(Y_2) - \dim(Y_1 \cap Y_2),$$

woraus wegen  $\dim(Y_1) = \dim(Y_2) = 2$  und  $\dim(Y_1 \cap Y_2) = 0$  sofort  $\dim(Y_1 \vee Y_2) = 4$ , d.h.  $Y_1 \vee Y_2 = \mathbb{R}^4$  folgt. Affine Basis von  $Y_1 \vee Y_2$  ist daher jede beliebige affine Basis des Raumes  $\mathbb{R}^4$ , beispielsweise die Standardbasis

$$((0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

### Aufgabe 6/1/045

(S: Varianten)

Affine Basen für Unterräume (2)

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, affine Basis, affines Erzeugendensystem, Verbindungsraum

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Im affinen Standardraum  $\mathbb{F}_3^4$  wird der Unterraum  $Y_1$  durch das lineare Gleichungssystem

$$-x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$-x_1 + x_2 - x_3 = 1$$

und der Unterraum  $Y_2$  durch das lineare Gleichungssystem

$$x_2 + x_3 + x_4 = -1$$

$$x_1 - x_4 = -1$$

gegeben. Bestimmen Sie für  $Y_1$ ,  $Y_1 \cap Y_2$ ,  $Y_1 \vee Y_2$  je eine affine Basis!

**Lösung.** Mit dem gaußschen Algorithmus ist für das erste Gleichungssystem leicht die Lösungsmenge

$$Y_1 = \{(-1, 0, 0, 0) + t_1 \cdot (1, 1, 0, 0) + t_2 \cdot (-1, 0, 1, 1) \mid t_1, t_2 \in \mathbb{F}_3\}$$

zu finden. Aus der Parameterdarstellung  $Y_1 = P + \mathbb{F}_3\mathbf{v}_1 + \mathbb{F}_3\mathbf{v}_2$  mit

$$P = (-1, 0, 0, 0), \quad \mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, 0), \quad \mathbf{v}_2 = (-1, 0, 1, 1)$$

erhalten wir eine affine Basis  $\{P, P_1, P_2\}$ , wobei

$$P_1 = P + \mathbf{v}_1 = (0, 1, 0, 0), \quad P_2 = P + \mathbf{v}_2 = (1, 0, 1, 1)$$

gewählt wurden.

Nun wird der Durchschnitt  $Y_1 \cap Y_2$  bestimmt. Wir erhalten ihn durch das lineare Gleichungssystem

$$\begin{aligned} -x_1 + x_2 + x_3 + x_4 &= 1 \\ -x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ x_2 + x_3 + x_4 &= -1 \\ x_1 - x_4 &= -1 \end{aligned}$$

(gebildet aus den Gleichungen für  $Y_1$  und  $Y_2$ ). Die Lösungsmenge ist

$$Y_1 \cap Y_2 = \{(1, 1, -1, -1)\},$$

und dieser Punkt bildet gleichzeitig eine affine Basis des Unterraumes  $Y_1 \cap Y_2$ .

Zur Bestimmung einer affinen Basis für  $Y_1 \vee Y_2$  erinnern wir an die Dimensionsformel für den Verbindungsraum. Sie lautet (für  $Y_1 \cap Y_2 \neq \emptyset$ )

$$\dim(Y_1 \vee Y_2) = \dim(Y_1) + \dim(Y_2) - \dim(Y_1 \cap Y_2),$$

woraus wegen  $\dim(Y_1) = \dim(Y_2) = 2$  und  $\dim(Y_1 \cap Y_2) = 0$  sofort  $\dim(Y_1 \vee Y_2) = 4$ , d.h.  $Y_1 \vee Y_2 = \mathbb{F}_3^4$  folgt. Affine Basis von  $Y_1 \vee Y_2$  ist daher jede beliebige affine Basis des Raumes  $\mathbb{F}_3^4$ , beispielsweise die kanonische Basis

$$((0, 0, 0, 0), (1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)).$$

### Aufgabe 6/1/050

(S: Varianten)

Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 2)

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Parameterdarstellung eines affinen Unterraumes, parallele Unterräume

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Im affinen Standardraum  $\mathbb{F}_2^5$  sind die Unterräume

$$Y := P + \mathbb{F}_2 \cdot \mathbf{y}_1 + \mathbb{F}_2 \cdot \mathbf{y}_2 + \mathbb{F}_2 \cdot \mathbf{y}_3,$$

$$Z := Q + \mathbb{F}_2 \cdot \mathbf{z}_1 + \mathbb{F}_2 \cdot \mathbf{z}_2 + \mathbb{F}_2 \cdot \mathbf{z}_3$$

durch

$$P = (0, 1, 0, 0, 1), \quad Q = (1, 1, 1, 1, 1),$$

$$\mathbf{y}_1 = (1, 1, 1, 0, 1), \quad \mathbf{y}_2 = (1, 0, 0, 1, 1), \quad \mathbf{y}_3 = (0, 1, 0, 0, 1),$$

$$\mathbf{z}_1 = (0, 1, 1, 1, 0), \quad \mathbf{z}_2 = (1, 1, 0, 1, 0), \quad \mathbf{z}_3 = (0, 0, 1, 1, 1)$$

gegeben. Stellen Sie fest, ob  $Y$  und  $Z$  parallel sind.

**Lösung.** Der Translationsraum  $T(Y)$  ist von den Vektoren  $\mathbf{y}_i$  erzeugt, entsprechend der Translationsraum  $T(Z)$  von den Vektoren  $\mathbf{z}_j$  ( $1 \leq i, j \leq 3$ .)

Werden  $\mathbf{y}_i$  als Spalten einer Matrix  $A \in M(5, 3; \mathbb{F}_2)$  und  $\mathbf{z}_j$  als Spalten einer Matrix  $B \in M(5, 3; \mathbb{F}_2)$  gewählt, so ist offenbar  $Y$  genau dann zu  $Z$  parallel, wenn  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(A)$  oder  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(B)$  ist. Um dies zu prüfen, wird die Matrix

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

durch den gaußschen Algorithmus umgeformt. Wir erhalten eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

So folgt  $\text{rang}(A) = 3$  und  $\text{rang}(A, B) = 3$ , daher  $Y \parallel Z$ .

### Aufgabe 6/1/060

(S: Varianten)

Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 0)

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Parameterdarstellung eines affinen Unterraumes, parallele Unterräume

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Im affinen Standardraum  $\mathbb{R}^5$  sind die Unterräume

$$Y := P_0 + \mathbb{R}_2 \cdot \overrightarrow{P_0 P_1} + \mathbb{R}_2 \cdot \overrightarrow{P_0 P_2} + \mathbb{R}_2 \cdot \overrightarrow{P_0 P_3},$$

$$Z := Q_0 + \mathbb{R}_2 \cdot \overrightarrow{Q_0 Q_1} + \mathbb{R}_2 \cdot \overrightarrow{Q_0 Q_2}$$

durch die folgenden Punkte

$$P_0 = (3, -1, 3, 3, -3), \quad P_1 = (3, 1, -5, 0, -6),$$

$$P_2 = (7, 1, 1, 2, -6), \quad P_3 = (6, 0, 3, 3, -4),$$

$$Q_0 = (3, 5, -2, 0, 1), \quad Q_1 = (0, 6, -3, 0, 1),$$

$$Q_2 = (-6, 7, -5, 1, 1)$$

gegeben. Stellen Sie fest, ob  $Y$  und  $Z$  parallel sind.

**Lösung.** Der Translationsraum  $T(Y)$  wird von den Vektoren  $\mathbf{y}_i := \overrightarrow{P_0 P_i}$  erzeugt, entsprechend der Translationsraum  $T(Z)$  von den Vektoren  $\mathbf{z}_j := \overrightarrow{Q_0 Q_j}$  ( $1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 2$ ):

$$\mathbf{y}_1 = (0, 2, -8, -3, -3), \quad \mathbf{y}_2 = (4, 2, -2, -1, -3)$$

$$\mathbf{y}_3 = (3, 1, 0, 0, -1),$$

$$\mathbf{z}_1 = (-3, 1, -1, 0, 0), \quad \mathbf{z}_2 = (-9, 2, -3, 1, 0)$$

Werden die Vektoren  $\mathbf{y}_i$  als Spalten einer Matrix  $A \in M(5, 3; \mathbb{R})$  und die Vektoren  $\mathbf{z}_j$  als Spalten einer Matrix  $B \in M(5, 2; \mathbb{R})$  gewählt, so ist offenbar  $Y$  genau dann zu  $Z$  parallel, wenn  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(A)$  oder  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(B)$  ist. Um dies zu prüfen, wird die Matrix

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 3 & -3 & -9 \\ 2 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ -8 & -2 & 0 & -1 & -3 \\ -3 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & -3 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

durch den gaußschen Algorithmus umgeformt. Es ergibt sich eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & -4 & -3 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & -1 & 15 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

So folgt  $\text{rang}(A) = 3$  und  $\text{rang}(A, B) = 5$ , Parallelität kann daher nur vorliegen, wenn  $\text{rang}(B) = \text{rang}(A, B)$  ist. Da  $B$  nur zwei Spalten besitzt, ist jedoch  $\text{rang}(B) \leq 2$ . Damit sind die Unterräume  $Y$  und  $Z$  nicht parallel.

### Aufgabe 6/1/070

(S: Varianten)

Parallelität (Charakteristik 2)

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum, parallele Unterräume

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Im affinen Standardraum  $\mathbf{F}_2^5$  sind die Unterräume  $Y := P_0 \vee P_1 \vee P_2 \vee P_3$  und  $Z := Q_0 \vee Q_1 \vee Q_2 \vee Q_3$  durch die folgenden Punkte

$$P_0 = (1, 1, 0, 0, 1), \quad P_1 = (0, 0, 1, 0, 1),$$

$$P_2 = (0, 0, 1, 0, 0), \quad P_3 = (0, 1, 0, 1, 0),$$

$$Q_0 = (0, 0, 1, 1, 1), \quad Q_1 = (0, 0, 1, 1, 0),$$

$$Q_2 = (0, 1, 0, 0, 1), \quad Q_3 = (1, 0, 1, 0, 1)$$

gegeben. Stellen Sie fest, ob  $Y$  und  $Z$  parallel sind.

**Lösung.** Der Translationsraum  $T(Y)$  wird von den Vektoren  $\mathbf{y}_i := \overrightarrow{P_0 P_i}$  erzeugt, entsprechend der Translationsraum  $T(Z)$  von den Vektoren  $\mathbf{z}_j := \overrightarrow{Q_0 Q_j}$  ( $1 \leq i, j \leq 3$ ):

$$\mathbf{y}_1 = (1, 1, 1, 0, 0), \quad \mathbf{y}_2 = (1, 1, 1, 0, 1)$$

$$\mathbf{y}_3 = (1, 0, 0, 1, 1), \quad \mathbf{z}_1 = (0, 0, 0, 0, 1)$$

$$\mathbf{z}_2 = (0, 1, 1, 1, 0), \quad \mathbf{z}_3 = (1, 0, 0, 1, 0)$$

Werden die Vektoren  $\mathbf{y}_i$  als Spalten einer Matrix  $A \in M(5, 3; \mathbf{F}_2)$  und die Vektoren  $\mathbf{z}_j$  als Spalten einer Matrix  $B \in M(5, 3; \mathbf{F}_2)$  gewählt, so ist offenbar  $Y$  genau dann zu  $Z$  parallel, wenn  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(A)$  oder  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(B)$  ist. Um dies zu prüfen, wird die Matrix

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

durch den gaußschen Algorithmus umgeformt. Wir erhalten eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

So folgt  $\text{rang}(A) = 3$  und  $\text{rang}(A, B) = 3$ , daher  $Y \parallel Z$ .

**Aufgabe 6/1/080**

(S: Varianten)

Parallelität (Charakteristik 0)

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum, parallele Unterräume

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Im affinen Standardraum  $\mathbb{R}^5$  sind die Unterräume  $Y := P_0 \vee P_1 \vee P_2 \vee P_3$  und  $Z := Q_0 \vee Q_1 \vee Q_2$  durch die folgenden Punkte

$$\begin{aligned} P_0 &= (-3, -5, -1, 0, -3), & P_1 &= (0, -3, -2, 5, -5), \\ P_2 &= (-2, -7, -6, -3, -3), & P_3 &= (-1, -8, -7, -2, -1), \\ Q_0 &= (-1, 1, 2, 1, 2), & Q_1 &= (-5, -1, -2, 5, 0), \\ Q_2 &= (4, 2, 3, -2, 4) \end{aligned}$$

gegeben. Stellen Sie fest, ob  $Y$  und  $Z$  parallel sind.

**Lösung.** Der Translationsraum  $T(Y)$  wird von den Vektoren  $\mathbf{y}_i := \overrightarrow{P_0 P_i}$  erzeugt, entsprechend der Translationsraum  $T(Z)$  von den Vektoren  $\mathbf{z}_j := \overrightarrow{Q_0 Q_j}$  ( $1 \leq i \leq 3, 1 \leq j \leq 2$ ):

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_1 &= (3, 2, -1, 5, -2), & \mathbf{y}_2 &= (1, -2, -5, -3, 0) \\ \mathbf{y}_3 &= (2, -3, -6, -2, 2), \\ \mathbf{z}_1 &= (-4, -2, -4, 4, -2), & \mathbf{z}_2 &= (5, 1, 1, -3, 2) \end{aligned}$$

Werden die Vektoren  $\mathbf{y}_i$  als Spalten einer Matrix  $A \in M(5, 3; \mathbb{R})$  und die Vektoren  $\mathbf{z}_j$  als Spalten einer Matrix  $B \in M(5, 2; \mathbb{R})$  gewählt, so ist offenbar  $Y$  genau dann zu  $Z$  parallel, wenn  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(A)$  oder  $\text{rang}(A, B) = \text{rang}(B)$  ist. Um dies zu prüfen, wird die Matrix

$$(A, B) = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ 2 & -2 & -3 & -2 & 1 \\ -1 & -5 & -6 & -4 & 1 \\ 5 & -3 & -2 & 4 & -3 \\ -2 & 0 & 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

durch den gaußschen Algorithmus umgeformt. Es ergibt sich eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ 0 & 8 & 13 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & 9 & -26 & 27 \\ 0 & 0 & 0 & -8 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

So folgt  $\text{rang}(A) = 3$  und  $\text{rang}(A, B) = 5$ , Parallelität kann daher nur vorliegen, wenn  $\text{rang}(B) = \text{rang}(A, B)$  ist. Da  $B$  nur zwei Spalten hat, ist jedoch  $\text{rang}(B) \leq 2$ . Damit sind die Unterräume  $Y$  und  $Z$  nicht parallel.

**Aufgabe 6/1/090**

Parallelität

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum, parallele Unterräume

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Im affinen Raum  $\mathbb{R}^3$  sind die Geraden  $G_1$  und  $G_2$  gegeben, wobei

- a)  $G_1 := (1, 1, 1) \vee (2, 1, 1)$ ,  $G_2 := (1, 0, 1) \vee (11, 2, 1)$  bzw.
- b)  $G_1$  wie zuvor,  $G_2 := (1, 3, 3) \vee (2, 5, 3)$  bzw.
- c)  $G_1$  wie zuvor,  $G_2 := (9, 1, 4) \vee (1, 1, 4)$  ist.

- (1) Bestimmen Sie in jedem der Fälle  $G_1 \cap G_2$  und entscheiden Sie, ob die Geraden parallel sind.
- (2) Es sei  $E$  die Ebene, die durch die Gleichung  $x + y + z = 1$  gegeben ist. Bestimmen Sie den Durchschnitt  $G_1 \cap E$ . Ist  $E$  parallel zu  $G_1$ ?

**Aufgabe** 6/1/100

Satz von Pappus-Pascal

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum, parallele Unterräume

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Im affinen Raum  $A$  sind die Geraden  $G, H$  gegeben, für die  $G \cap H = \{P\}$  ein Punkt ist sowie Punkte  $A_1, A_2, A_3 \in G$ ,  $B_1, B_2, B_3 \in H$  mit  $A_i \neq P$ ,  $B_j \neq P$  für  $i, j = 1 \dots 3$ . Wir setzen voraus  $A_1 \vee B_2 \parallel A_2 \vee B_1$  und  $A_2 \vee B_3 \parallel A_3 \vee B_2$ . Zeigen Sie, dass dann  $A_1 \vee B_3 \parallel A_3 \vee B_1$  gilt.

**Aufgabe** 6/1/110

Eigenschaften affiner Unterräume

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum, Dimension eines affinen Raumes

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Wir betrachten im affinen Raum  $X$  die Punkte  $P_0, \dots, P_r$ , von denen wir voraussetzen, dass sie nicht in einem  $(r-1)$ -dimensionalen Teilraum liegen. Beweisen Sie: Es gibt genau einen  $r$ -dimensionalen Teilraum von  $X$ , der alle Punkte  $P_i$  enthält.

**Aufgabe** 6/1/120

Lage von Geraden im Raum

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, parallele Unterräume, Gerade

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Wir betrachten im affinen Standardraum  $\mathbb{R}^3$  zwei Geraden  $G_i$ , die durch Gleichungen

$$G_1 : a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + a_{13}X_3 = b_1, \quad a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + a_{23}X_3 = b_2$$

$$G_2 : a_{31}X_1 + a_{32}X_2 + a_{33}X_3 = b_3, \quad a_{41}X_1 + a_{42}X_2 + a_{43}X_3 = b_4$$

gegeben sind (es wird nicht behauptet, dass  $a_{ij}$  dann beliebig sein dürfen). Beschreiben Sie die Lage beider Geraden zueinander in Abhängigkeit von  $\text{rang}(A)$  und  $\text{rang}(A')$ , wobei  $A = (a_{ij})$  und  $A'$  die um die Spalte  ${}^t(b_1, b_2, b_3, b_4)$  erweiterte Matrix  $A$  ist.

**Aufgabe** 6/1/130

Anzahl affiner Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{F}_2^3$

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

$A := (\mathbb{F}_2)^3$  sei der affine Standardraum über dem zweielementigen Körper  $\mathbb{F}_2$ .

- (1) Wieviele Punkte hat  $A$ ?
- (2) Wieviele Geraden enthält  $A$ ?
- (3) Wieviele Ebenen enthält  $A$ ?

### Aufgabe 6/1/140

Gleichungssystem für eine Gerade

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum, Gerade

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Im affinen Raum  $\mathbb{R}^4$  wird durch  $G = (1, 2, 3, 4) \vee (2, 2, 4, 5)$  eine Gerade gegeben. Bestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem, das  $G$  beschreibt!

### Aufgabe 6/1/150

Gleichungssysteme für Unterräume

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Parameterdarstellung eines affinen Unterraumes, Verbindungsraum

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

Wir betrachten im affinen Raum  $\mathbb{R}^4$  die folgenden Teilräume  $P$ ,  $G$ ,  $F$ ,  $R$ . Bestimmen Sie jeweils ein Gleichungssystem, das den entsprechenden Teilraum als Lösungsmenge hat!

- (1)  $R = (3, 1, 2, 4) + \mathbb{R} \cdot (1, 1, 1, 1) + \mathbb{R} \cdot (1, 2, 1, 2) + \mathbb{R} \cdot (2, 3, 1, 3)$
- (2)  $F = (2, 1, 1, 2) \vee (1, 2, 1, 1) \vee (1, 0, 3, 3)$
- (3)  $G = (1, 0, 0, 1) \vee (3, 4, 1, 2)$
- (4)  $P = \{(1, 2, 1, 3)\}$

### Aufgabe 6/1/160

(S: Varianten)

Hyperebenen und Determinanten

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Verbindungsraum

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 Affine Unterräume

$X = K^n$  sei der  $n$ -dimensionale affine Standardraum über dem Körper  $K$ ,  $P_1, \dots, P_n \in X$  mit  $\dim(P_1 \vee \dots \vee P_n) = n - 1$ , d.h.  $Y = P_1 \vee \dots \vee P_n$  ist eine Hyperebene.

- (1) Zeigen Sie, dass mit  $P_i = (p_{i1}, \dots, p_{in})$  durch

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_n & 1 \\ p_{11} & \dots & p_{1n} & 1 \\ \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ p_{n1} & \dots & p_{nn} & 1 \end{pmatrix} = 0$$

eine Gleichung mit der Lösungsmenge  $Y$  gegeben ist.

- (2) Im affinen Raum  $\mathbb{R}^3$  sei  $Y = (1, -4, 0) \vee (4, -7, 1) \vee (-2, -6, -2)$ .  
Bestimmen Sie mittels (1) eine Gleichung für  $Y$ .

**Lösung für Teil (2).** Offensichtlich ist

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & 1 \\ 1 & -4 & 0 & 1 \\ 4 & -7 & 1 & 1 \\ -2 & -6 & -2 & 1 \end{pmatrix} = 8x_1 + 3x_2 - 15x_3 + 4 = 0$$

die gesuchte Gleichung.

**Anmerkung.** Es ist leicht zu sehen, dass die gegebenen Punkte affin unabhängig sind. Allerdings ist es unnötig, das zu prüfen, denn im Fall affiner Abhängigkeit müsste die angegebene Determinante identisch verschwinden.

### Aufgabe 6/1/170

Existenz affiner Abbildungen (1)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, linearer Anteil einer affinen Abbildung

**Stoffeinheiten:** 6/1/5 - 6/1/9 Affine Abbildungen

Existieren affine Abbildungen  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  bzw.  $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ , die nachfolgend angegebene Bedingungen erfüllen?

- (1)  $f(1, 1) = (0, 1)$ ,  $f(3, 2) = (1, 2)$ ,  $f(5, 3) = (2, 3)$ ,
- (2)  $g(1, 1) = (0, 1)$ ,  $g(3, 2) = (1, 2)$ ,  $g(5, 3) = (2, 2)$ .

### Aufgabe 6/1/180

(S: Varianten)

Fixpunkte affiner Abbildungen in der Charakteristik 3

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Fixpunkt

**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

Bestimmen Sie die Menge  $\text{Fix}(f)$  der Fixpunkte der folgendermaßen gegebenen affinen Abbildung  $f: \mathbb{F}_3^4 \rightarrow \mathbb{F}_3^4$  des affinen Standardraumes  $\mathbb{F}_3^4$  in sich.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) :=$$

$$(x_1 - x_2 + x_3 - 1, x_1 + x_3 + x_4 + 1, -x_1 - x_2 - x_3 - x_4, x_1 - x_4 - 1)$$

**Lösung.**  $\text{Fix}(f)$  ist die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{F}_3^4$ , für die

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, x_3, x_4)$$

gilt, daher die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems mit der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Lösungsmenge des Systems ist

$\{(-t_2 + 1, t_1 - 1, t_1, t_2) \mid t_1, t_2 \text{ Parameter}\}$ .

**Aufgabe 6/1/190**

(S: Varianten)

Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 4)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Fixpunkt, affiner Unterraum, Dimension eines affinen Raumes

**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

Bestimmen Sie die Dimension des affinen Unterraumes  $\text{Fix}(f) \subseteq \mathbb{Q}^4$  aller Fixpunkte der folgendermaßen gegebenen affinen Abbildung  $f: \mathbb{Q}^4 \rightarrow \mathbb{Q}^4$  des affinen Standardraumes  $\mathbb{Q}^4$  in sich.

$${}^t f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 & 3 \\ -3 & -1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \\ -6 \end{pmatrix}$$

**Lösung.**  $\text{Fix}(f)$  ist die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Q}^4$ , für die

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1, x_2, x_3, x_4)$$

gilt, daher die Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems mit der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -1 \\ -3 & -1 & -3 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Durch den gaußschen Algorithmus kann diese in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -9 & 4 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

überführt werden, daher stimmt der Rang der Koeffizientenmatrix mit dem der erweiterten Koeffizientenmatrix überein (beide haben den Rang 3), und es folgt  $\text{Fix}(f) \neq \emptyset$ ,  $\dim(\text{Fix}(f)) = 4 - 3 = 1$ .

**Aufgabe 6/1/200**

(S: Varianten)

Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (1)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Fixpunkt, affiner Unterraum, Dimension eines affinen Raumes

**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

Bestimmen Sie die Dimension des affinen Unterraumes  $\text{Fix}(f) \subseteq \mathbb{Q}^3$  aller Fixpunkte der folgendermaßen gegebenen affinen Abbildung  $f: \mathbb{Q}^3 \rightarrow \mathbb{Q}^3$  des affinen Standardraumes  $\mathbb{Q}^3$  in sich.

$${}^t f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -3 & -7 & 9 \\ -1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

**Lösung.**  $\text{Fix}(f)$  ist die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Q}^3$  mit der Eigenschaft  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)$ , daher Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems mit der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{pmatrix} -4 & -7 & 9 & 6 \\ -1 & -2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & -3 & -2 \end{pmatrix}.$$

Durch den gaußschen Algorithmus kann diese in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} -4 & -7 & 9 & 6 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

überführt werden, daher stimmt der Rang der Koeffizientenmatrix mit dem der erweiterten Koeffizientenmatrix überein (beide haben den Rang 2), und es folgt  $\text{Fix}(f) \neq \emptyset$ ,  $\dim(\text{Fix}(f)) = 3 - 2 = 1$ .

### Aufgabe 6/1/210

(S: Varianten)

Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (2)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Fixpunkt, affiner Unterraum, Dimension eines affinen Raumes

**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

Bestimmen Sie den Unterraum  $\text{Fix}(f) \subseteq \mathbb{Q}^3$ , der aus den Fixpunkten der nachfolgend angegebenen affinen Abbildung  $f: \mathbb{Q}^3 \rightarrow \mathbb{Q}^3$  besteht.

$${}^t f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ 18 & -8 & 6 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \\ 4 \end{pmatrix}$$

**Lösung.**  $\text{Fix}(f)$  ist die Menge aller  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Q}^3$  mit der Eigenschaft  $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3)$ , daher Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems mit der erweiterten Koeffizientenmatrix

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & -1 \\ 18 & -9 & 6 & -15 \\ 3 & -1 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

Durch den gaußschen Algorithmus kann diese in eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

überführt werden, aus der sich leicht die Lösungsmenge ablesen lässt,

$$\text{Fix}(f) = \left\{ \left( -\frac{7}{3}, -3, 0 \right) + t \cdot (-4, -6, 3) \mid t \in \mathbb{Q} \right\}.$$

### Aufgabe 6/1/220

Projektionen

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, affine Abbildung, Projektion, affine Koordinaten, Verbindungsraum

**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

$X$  sei der affine Standardraum  $\mathbb{R}^3$  und  $f : X \rightarrow X$  die affine Abbildung, die durch Projektion von  $X$  auf die Gerade  $G = P \vee Q$  längs der Ebene  $E = R \vee S \vee T$  entsteht, wobei

$$P = (1, 2, 4), \quad Q = (3, 6, 2), \quad R = (1, 1, 0), \quad S = (2, 1, 1), \quad T = (2, 2, 1)$$

ist. Geben Sie  $f$  in affinen Koordinaten bezüglich der Standardbasis an.

**Aufgabe** 6/1/230

Komplexe Konjugation als Kollineation

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Gerade, affine Abbildung

**Stoffeinheiten:** 6/1/5 - 6/1/9 Affine Abbildungen

$A := \mathbb{C}^n$  sei der affine Standardraum über dem Körper  $\mathbb{C}$  der komplexen Zahlen,  $f : A \rightarrow A$  die durch  $f(z_1, \dots, z_n) := (\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n)$  (komplexe Konjugation) gegebene Abbildung.

- (1) Zeigen Sie:  $f$  ist Kollineation (d.h. jede Gerade  $G \subseteq A$  wird durch  $f$  auf eine Gerade  $f(G)$  abgebildet).
- (2) Ist  $f$  eine affine Abbildung?

**Aufgabe** 6/1/240

Existenz affiner Abbildungen (2)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, linearer Anteil einer affinen Abbildung

**Stoffeinheiten:** 6/1/5 - 6/1/9 Affine Abbildungen

Zeigen Sie, dass es eine affine Abbildung  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  gibt, für die

$$f(1, 1, 1) = (1, 0, 1) \quad f(1, 0, 1) = (1, 1, 1)$$

$$f(0, 1, 1) = (0, 0, 0) \quad f(1, 0, 0) = (0, 1, 0)$$

ist, und geben sie  $A \in M(3, 3)$ ,  $b \in M(3, 1)$  an, so dass für  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$  mit  $\mathbf{y} = f(\mathbf{x})$  stets  ${}^t\mathbf{y} = A \cdot {}^t\mathbf{x} + b$  gilt.

**Aufgabe** 6/1/250

Affine Basen und Koordinaten

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, affine Basis, Koordinatentransformation

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Wir betrachten den affinen Standardraum  $X = \mathbb{R}^3$ .

- (1) Zeigen Sie:  $\mathcal{B} = (P_0, P_1, P_2, P_3)$  mit

$$P_0 := (1, 1, 0), \quad P_1 := (1, 2, 1), \quad P_2 := (2, 3, 1), \quad P_3 := (2, 3, 3)$$

ist eine affine Basis von  $X$ .

- (2) Durch  $2x + 3y - 4z = 3$  wird eine Ebene  $E$  in  $\mathbb{R}^3$  gegeben. Bestimmen Sie eine Gleichung für  $E$  im Koordinatensystem  $\mathcal{B}$ .

**Aufgabe 6/1/260**

(S: Varianten)

Affine Formen von Quadriken

**Index:** affiner Raum, Quadrik, Hauptachsenpolynome reeller Quadriken, affine Transformation, Koordinatentransformation**Stoffeinheiten:** 6/1/28 - 6/1/30 Affine Quadriken

Bestimmen Sie eine Hauptachsenform für das reelle quadratische Polynom

$$f = X_1^2 - 2X_1X_2 + 2X_1X_3 + 2X_2X_3 - 3X_3^2 - 6X_3 + 6$$

und geben Sie die zugehörige affine Transformation der Unbestimmten an.

**Lösung.** Durch quadratische Ergänzung erhalten wir

$$\begin{aligned} f &= (X_1 - X_2 + X_3)^2 - X_2^2 + 4X_2X_3 - 4X_3^2 - 6X_3 + 6 \\ &= (X_1 - X_2 + X_3)^2 - (X_2 - 2X_3)^2 - 6X_3 + 6, \end{aligned}$$

d.h. mittels der Substitution

$$Y_1 := X_1 - X_2 + X_3, \quad Y_2 := X_2 - 2X_3, \quad Y_3 := 3X_3$$

bekommt das gegebene Polynom die folgende Gestalt

$$f = Y_1^2 - Y_2^2 - 2Y_3 + 6.$$

Daraus ergibt sich nach Transformation des Koordinatenursprungs mittels

$$Z_1 := Y_1, \quad Z_2 := Y_2, \quad Z_3 := Y_3 - 3$$

offensichtlich

$$f = Z_1^2 - Z_2^2 - 2Z_3.$$

Dies ist bereits die Hauptachsenform. Durch Einsetzen erhalten wir die zugehörige affine Transformationen

$$Z_1 = X_1 - X_2 + X_3, \quad Z_2 = X_2 - 2X_3, \quad Z_3 = 3X_3 - 3.$$

**Anmerkung.** Das Verfahren gestaltet sich im vorliegenden Fall besonders einfach, da in den Teilschritten Monome vom Typ  $X_i^2$  auftreten. Anderenfalls kann analog vorgegangen werden, nachdem beispielsweise zunächst ein Term  $X_1X_2$  durch die Transformation  $X_1 = Y_1 + Y_2$ ,  $X_2 = Y_2$  in eine entsprechende Form gebracht wird.**Aufgabe 6/1/270**

Existenz von Fixpunkten (1)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Fixpunkt**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

$f : X \rightarrow X$  sei eine affine Abbildung, für die  $T(f) = \lambda \cdot \text{id}_T(X)$  ist sowie  $\lambda \in K$ ,  $\lambda \neq 1$ .  
Beweisen Sie, dass  $f$  einen Fixpunkt besitzt, d.h. dass ein Punkt  $P \in X$  existiert, für den  $f(P) = P$  ist.

**Aufgabe 6/1/280**

Existenz von Fixpunkten (2)

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, Fixpunkt

**Stoffeinheiten:** 6/1/31 - 6/1/33 Einige Eigenschaften affiner Abbildungen

Es sei  $X$  ein affiner Raum über einem Körper  $K$ , dessen Charakteristik von 2 verschieden ist,  $f : X \rightarrow X$  eine affine Abbildung sowie  $P, Q \in X$  verschiedene Punkte, für die  $f(P) = Q$  und  $f(Q) = P$  gilt.

Beweisen Sie, dass  $f$  einen Fixpunkt besitzt.

**Aufgabe** 6/1/290

Affine Fortsetzung

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, affin unabhängig, affine Basis, affine Fortsetzung

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

$X$  und  $X'$  seien affine Räume,  $(P_i)_{i \in I}$  eine affine Basis von  $X$  und  $(P'_i)_{i \in I}$  eine Familie von Punkten aus  $X'$ .  $f$  sei die eindeutig bestimmte affine Abbildung  $f : X \rightarrow X'$  mit  $f(P_i) = P'_i$  für alle  $i \in I$ .

Beweisen Sie:  $f$  ist genau dann injektiv, wenn  $(P'_i)_{i \in I}$  eine affin unabhängige Familie in  $X'$  ist.

**Aufgabe** 6/1/300

Strahlensatz und Teilverhältnis

**Index:** affiner Raum, Teilverhältnis, affine Abbildung, Invarianz des Teilverhältnisses, Isomorphismus affiner Räume

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Beweisen Sie den Strahlensatz unter Benutzung der Invarianz des Teilverhältnisses bei affinen Isomorphismen.

**Aufgabe** 6/1/310

Eine exakte Folge von Gruppen

**Index:** affiner Raum, affine Abbildung, exakte Folge, Translation

**Stoffeinheiten:** 6/1/5 - 6/1/9 Affine Abbildungen

$X$  sei ein nichtleerer affiner Raum,  $j : T(X) \rightarrow \text{GA}(X)$  der Gruppenhomomorphismus, der dem Vektor  $\mathbf{v} \in T(X)$  die Translation  $\tau_{\mathbf{v}} : X \rightarrow X$  zuordnet und  $p : \text{GA}(X) \rightarrow \text{GL}(T(X))$  der Homomorphismus, der der affinen Transformation  $f$  die entsprechende lineare Abbildung  $T(f)$  zuordnet. Mit den trivialen einelementigen Gruppen  $\mathbf{0}$  bzw.  $\mathbf{1}$  entsteht eine exakte Folge von Gruppenhomomorphismen:

$$\mathbf{0} \longrightarrow T(X) \xrightarrow[\mathbf{v} \mapsto \tau_{\mathbf{v}}]{j} \text{GA}(X) \xrightarrow[\mathbf{f} \mapsto T(\mathbf{f})]{\pi} \text{GL}(T(X)) \longrightarrow \mathbf{1}$$

Zeigen Sie:

- Für alle  $P \in X$  ist die Abbildung  $\psi_P : \text{GL}(T(X)) \rightarrow \text{GA}(X)$ , die der linearen Abbildung  $\varphi$  eine affine Transformation  $f : X \rightarrow X$  mit  $f(P + \mathbf{v}) = P + \varphi(\mathbf{v})$ ,  $\mathbf{v} \in T(X)$  zuordnet, ist ein Gruppenhomomorphismus, und es gilt  $\pi\psi_P = \text{id}_{\text{GL}(T(X))}$ .

- (2) Zu jedem der unter (1) gefundenen Homomorphismen  $\psi_P$  existiert eine bijektive Abbildung

$$\Phi_P : T(X) \times GL(T(X)) \rightarrow GA(X), \quad (\mathbf{v}, \varphi) \mapsto \tau_{\mathbf{v}} \cdot \psi_P(\varphi),$$

die jedoch im Allgemeinen kein Gruppenhomomorphismus ist, wenn die Operation auf der linken Seite komponentenweise definiert wird.

- (3) Geben Sie auf  $T(X) \times GL(T(X))$  eine Operation an, die diese Menge zu einer Gruppe macht und die unter (2) definierte Abbildung  $\Phi_P$  zu einem Gruppenhomomorphismus.

### Aufgabe 6/1/320

(S: Varianten)

Affine Koordinaten (Charakteristik 0)

**Index:** affiner Raum, affine Basis, affine Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Im affinen Standardraum  $\mathbb{R}^3$  sind die Punkte

$$P_0 = (-4, -5, -5), \quad P_1 = (-1, -8, -2)$$

$$P_2 = (-1, -6, -8), \quad P_3 = (-6, -7, -3)$$

gegeben. Zeigen Sie, dass  $(P_0, P_1, P_2, P_3)$  eine affine Basis ist und bestimmen Sie die affinen Koordinaten von  $Q = (19, -14, -16)$  bezüglich dieser Basis.

**Lösung.** Zunächst ist zu zeigen, dass im Translationsvektorraum  $T(\mathbb{R}^3)$  die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 := \overrightarrow{P_0 P_1} = (3, -3, 3),$$

$$\mathbf{b}_2 := \overrightarrow{P_0 P_2} = (3, -1, -3),$$

$$\mathbf{b}_3 := \overrightarrow{P_0 P_3} = (-2, -2, 2)$$

eine Basis bilden. Die affinen Koordinaten  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$  von  $Q$  sind dann durch die Bedingung  $x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3 = \overrightarrow{P_0 Q}$  eindeutig bestimmt. Mit

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -2 & 23 \\ -3 & -1 & -2 & -9 \\ 3 & -3 & 2 & -11 \end{pmatrix} \in M(3, 4, \mathbb{R})$$

bezeichnen wir die Matrix, deren erste drei Spalten durch die Tupel  $\mathbf{b}_i$  gebildet werden und deren letzte durch  $\overrightarrow{P_0 Q}$  gegeben ist. Mit zeilenäquivalenten Umformungen wird  $B$  in

$$C = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -2 & 23 \\ 0 & 1 & -2 & 7 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

überführt; daraus ist zu entnehmen, dass die ersten drei Spalten, daher auch  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$  linear unabhängig sind; diese Vektoren bilden aus Dimensionsgründen eine Basis des Translationsraumes. Die Matrix  $B$  ist die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems, das gesuchte Koordinatentupel seine eindeutig bestimmte Lösung; sie lässt sich aus  $C$  leicht ablesen. Wir erhalten  $(x_1, x_2, x_3) = (2, 5, -1)$ .

### Aufgabe 6/1/330

(S: Varianten)

Affine Koordinaten (Charakteristik 3)

**Index:** affiner Raum, affine Basis, affine Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Im affinen Standardraum  $\mathbb{F}_3^3$  sind die Punkte

$$P_0 = (1, 1, 1), \quad P_1 = (1, 1, 0)$$

$$P_2 = (0, 1, -1), \quad P_3 = (0, 0, 0)$$

gegeben. Zeigen Sie, dass  $(P_0, P_1, P_2, P_3)$  eine affine Basis ist und bestimmen Sie die affinen Koordinaten von  $Q = (-1, 1, 1)$  bezüglich dieser Basis.

**Lösung.** Zunächst ist zu zeigen, dass im Translationsvektorraum  $T(\mathbb{F}_3^3)$  die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 := \overrightarrow{P_0P_1} = (0, 0, -1),$$

$$\mathbf{b}_2 := \overrightarrow{P_0P_2} = (-1, 0, 1),$$

$$\mathbf{b}_3 := \overrightarrow{P_0P_3} = (-1, -1, -1)$$

eine Basis bilden. Die affinen Koordinaten  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}_3^3$  von  $Q$  sind dann durch die Bedingung  $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3 = \overrightarrow{P_0Q}$  eindeutig bestimmt. Mit

$$B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in M(3, 4, \mathbb{F}_3)$$

bezeichnen wir die Matrix, deren erste drei Spalten durch die Tupel  $\mathbf{b}_i$  gebildet werden und deren letzte durch  $\overrightarrow{P_0Q}$  gegeben ist. Mit zeilenäquivalenten Umformungen wird  $B$  in

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

überführt; daraus ist zu entnehmen, dass die ersten drei Spalten, daher auch  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$  linear unabhängig sind; diese Vektoren bilden aus Dimensionsgründen eine Basis des Translationsraumes. Die Matrix  $B$  ist die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems, das gesuchte Koordinatentupel seine eindeutig bestimmte Lösung; sie lässt sich aus  $C$  leicht ablesen. Wir erhalten  $(x_1, x_2, x_3) = (-1, -1, 0)$ .

**Aufgabe** 6/1/340

(S: Varianten)

Affine Koordinaten (Charakteristik 2)

**Index:** affiner Raum, affine Basis, affine Koordinaten

**Stoffeinheiten:** 6/1/20 - 6/1/27 Affine Fortsetzung und affine Koordinaten

Im affinen Standardraum  $\mathbb{F}_2^3$  sind die Punkte

$$P_0 = (0, 1, 1), \quad P_1 = (1, 1, 1)$$

$$P_2 = (1, 1, 0), \quad P_3 = (0, 0, 1)$$

gegeben. Zeigen Sie, dass  $(P_0, P_1, P_2, P_3)$  eine affine Basis ist und bestimmen Sie die affinen Koordinaten von  $Q = (1, 1, 1)$  bezüglich dieser Basis.

**Lösung.** Zunächst ist zu zeigen, dass im Translationsvektorraum  $T(\mathbb{F}_2^3)$  die Vektoren

$$\mathbf{b}_1 := \overrightarrow{P_0P_1} = (1, 0, 0),$$

$$\mathbf{b}_2 := \overrightarrow{P_0P_2} = (1, 0, 1),$$

$$\mathbf{b}_3 := \overrightarrow{P_0P_3} = (0, 1, 0)$$

eine Basis bilden. Die affinen Koordinaten  $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{F}_2^3$  von  $Q$  sind dann durch die Bedingung  $x_1\mathbf{b}_1 + x_2\mathbf{b}_2 + x_3\mathbf{b}_3 = \overrightarrow{P_0Q}$  eindeutig bestimmt. Mit

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M(3, 4, \mathbb{F}_2)$$

bezeichnen wir die Matrix, deren erste drei Spalten durch die Tupel  $\mathbf{b}_i$  gebildet werden und deren letzte durch  $\overrightarrow{P_0Q}$  gegeben ist. Mit zeilenäquivalenten Umformungen wird  $B$  in

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

überführt; daraus ist zu entnehmen, dass die ersten drei Spalten, daher auch  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$  linear unabhängig sind; diese Vektoren bilden aus Dimensionsgründen eine Basis des Translationsraumes. Die Matrix  $B$  ist die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems, das gesuchte Koordinatentupel seine eindeutig bestimmte Lösung; sie lässt sich aus  $C$  leicht ablesen. Wir erhalten  $(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 0)$ .

### Aufgabe 6/1/350

Charakterisierung von Hyperebenen

**Index:** affiner Raum, affiner Unterraum, Hyperebene, Hyperebenenchnitt

**Stoffeinheiten:** 6/1/10 - 6/1/19 [Affine Unterräume](#)

Wir betrachten einen endlichdimensionalen affinen Raum  $X$  und darin einen affinen Teilraum  $E$  von positiver Dimension. Beweisen Sie:  $E$  ist genau dann eine Hyperebene, wenn  $E$  zu jedem Teilraum parallel ist, der  $E$  nicht schneidet.

### Aufgabe 6/2/005

Ein Skalarprodukt

**Index:** Skalarprodukt, hermitesche Form

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 [Positiv definite hermitesche Formen](#)

$V = M(n, m; \mathbb{R})$  sei der Vektorraum der reellen  $n \times m$  Matrizen. Die Spur  $\text{tr}(C)$  einer quadratischen Matrix  $C$  wird (wie üblich) als Summe  $\sum_i c_{ii}$  der Elemente ihrer Hauptdiagonale definiert.

(1) Zeigen Sie, dass für  $A, B \in V$  stets  $\text{tr}({}^tA \cdot B) = \text{tr}(B \cdot {}^tA)$  ist.

(2) Ist die durch

$$\langle A, B \rangle := \text{tr}({}^tA \cdot B)$$

definierte Abbildung  $V^2 \rightarrow \mathbb{R}$  ein Skalarprodukt?

### Aufgabe 6/2/010

Satz des Thales

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt, Norm eines Vektors, orthogonale Vektoren

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

$(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  sei ein euklidischer Vektorraum mit der durch  $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$  gegebenen Norm  $\|\cdot\|$ . Zeigen Sie: Für  $x, y \in V$  gilt  $\|x\| = \|y\|$  genau dann, wenn  $(x - y) \perp (x + y)$  ist. Interpretieren Sie diese Aussage als *Satz des Thales*.

**Aufgabe** 6/2/020

Winkel und Drehungen

**Index:** euklidischer Standardraum, Winkel zwischen zwei Vektoren, Skalarprodukt, Norm eines Vektors

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

Wir betrachten die euklidischen Standardräume  $\mathbb{R}^n$ .

- (1) Bestimmen Sie den Winkel zwischen den Vektoren  $\mathbf{x} := (1, 2, -2)$ ,  
 $\mathbf{y} := (-1, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$ .
- (2) Bestimmen Sie den Winkel zwischen den Vektoren  
 $\mathbf{x} := (-1, 0, 2, -1)$ ,  $\mathbf{y} := (0, \sqrt{2}, -2, 1) \in \mathbb{R}^4$ .
- (3) Die lineare Abbildung  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$  wird bezüglich der Standardbasis durch die Matrix

$$M(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & -\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix}$$

definiert. Zeigen Sie:

Sind  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}$ , so ist der Winkel zwischen  $\mathbf{x}$  und  $\mathbf{y}$  gleich dem Winkel zwischen  $\varphi(\mathbf{x})$  und  $\varphi(\mathbf{y})$ ; weiter gilt: Ist  $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$ , dann ist auch  $\|\varphi(\mathbf{x})\| = \|\varphi(\mathbf{y})\|$ .

**Aufgabe** 6/2/030

Eigenschaften der Orthogonalität

**Index:** euklidischer Vektorraum, Norm, orthogonale Vektoren, orthogonaler Unterraum zu einer Teilmenge

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

$V$  sei ein euklidischer Vektorraum. Beweisen Sie:

- (1) Für eine Teilmenge  $M \subseteq V$  ist  $M^\perp$  stets Unterraum von  $V$ .
- (2) Sind  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ , so gilt
 
$$\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \iff \mathbf{x} \perp \mathbf{y}.$$
- (3) Für Unterräume  $U$  und  $W$  von  $V$  gilt stets
  - (i)  $U \subseteq W \Rightarrow U^\perp \supseteq W^\perp$ ,
  - (ii)  $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$ ,
  - (iii)  $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$ .

**Aufgabe** 6/2/040

Winkel zwischen Vektoren

(S: Varianten)

**Index:** euklidischer Standardraum, Winkel zwischen zwei Vektoren, Skalarprodukt, Norm eines Vektors

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

Bestimmen Sie den Winkel zwischen den Vektoren  $\mathbf{v} = (1, 2, 1)$  und  $\mathbf{w} = (-1, -1, 0)$  im euklidischen Standardvektorraum  $\mathbb{R}^3$ .

**Lösung.** Mit  $\alpha$  bezeichnen wir den Winkel zwischen beiden Vektoren. Offensichtlich ist  $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = -3$ ,  $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 6$ ,  $\langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle = 2$  und

$$\cos^2(\alpha) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle^2}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle} = \frac{3}{4}, \text{ daher}$$

$$\alpha = \arccos\left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{5\pi}{6}.$$

**Aufgabe** 6/2/050

(S: Varianten)

Winkel zwischen Geraden

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Winkel zwischen zwei Vektoren, Skalarprodukt, Norm eines Vektors

**Stoffeinheiten:** 6/2/15 - 6/2/16 Euklidische affine Räume

Zeigen Sie, dass sich die Geraden

$$G_1 = (3, 1, 3) \vee (5, 3, 3),$$

$$G_2 = (11, 6, 6) \vee (13, 7, 7)$$

im euklidischen affinen Standardraum  $\mathbb{R}^3$  schneiden und bestimmen Sie den Schnittwinkel. (Der Schnittwinkel ist derjenige Winkel im Intervall  $[0, \frac{\pi}{2}]$ , der durch zwei geeignete, von  $\mathbf{0}$  verschiedene Vektoren der Translationsräume gebildet wird.)

**Lösung.** Die Bedingung  $G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$  ist offensichtlich äquivalent dazu, dass das lineare Gleichungssystem

$$(3, 1, 3) + s \cdot (2, 2, 0) = (11, 6, 6) + t \cdot (2, 1, 1)$$

eine Lösung  $(s, t) \in \mathbb{R}^2$  besitzt. Nun ist

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 8 \\ 2 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

die erweiterte Koeffizientenmatrix dieses Systems, und leicht finden wir eine zeilenäquivalente Stufenmatrix

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Daraus ist zu entnehmen, dass der Rang der Koeffizientenmatrix mit dem der erweiterten Koeffizientenmatrix übereinstimmt, d.h.  $G_1 \cap G_2 \neq \emptyset$ .

Die Verbindungsvektoren der gegebenen Punkte sind Erzeugende der entsprechenden Translationsräume. Wir erhalten  $T(G_1) = \mathbb{R}\mathbf{v}$  und  $T(G_2) = \mathbb{R}\mathbf{w}$  mit  $\mathbf{v} = (2, 2, 0)$ ,  $\mathbf{w} = (2, 1, 1)$ . Für den Schnittwinkel  $\alpha$  der Geraden  $G_1$  und  $G_2$  ergibt sich

$$\cos^2(\alpha) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle^2}{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \cdot \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle} = \frac{3}{4},$$

folglich

$$\alpha = \arccos\left(\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

### Aufgabe 6/2/052

Winkel und Orthogonalbasen

**Index:** euklidischer Vektorraum, Winkel zwischen zwei Vektoren, Orthogonalbasis

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

$\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$  sei eine Orthogonalbasis im euklidischen Vektorraum  $V$  und  $\mathbf{x} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$  ein beliebiger Vektor.

Beweisen Sie: Ist  $\alpha_i$  der Winkel zwischen  $\mathbf{x}$  und  $\mathbf{b}_i$ , so gilt

$$\cos^2(\alpha_1) + \dots + \cos^2(\alpha_n) = 1.$$

### Aufgabe 6/2/055

Orthogonales Komplement (1)

**Index:** unitärer Vektorraum, Skalarprodukt, orthogonales Komplement

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

$P_n$  sei der unitäre Vektorraum der komplexen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle := \bar{a}_0 b_0 + \bar{a}_1 b_1 + \dots + \bar{a}_n b_n$$

definiert ist, wobei  $f, g \in P_n$  Polynome

$$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, \quad a_i \in \mathbb{C}$$

$$g = b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \in P_n, \quad b_i \in \mathbb{C}$$

bezeichnen.

Bestimmen Sie jeweils den orthogonalen Unterraum für

- (1) den Unterraum der Polynome  $f$  mit  $f(1) = 0$ ,
- (2) den Unterraum  $\mathbb{C} \cdot X^n$ .

### Aufgabe 6/2/056

Orthogonales Komplement (2)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt, orthogonales Komplement

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

$P_n$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle := a_0 b_0 + a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

definiert ist, wobei  $f, g \in P_n$  Polynome

$$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$$g = b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \in P_n, \quad b_i \in \mathbb{R}$$

bezeichnen. Bestimmen Sie das orthogonale Komplement für

- (1) den Unterraum der Polynome  $f$  mit  $f(1) = 0$ ,
- (2) den Unterraum  $\mathbb{R} \cdot X^n$ .

**Aufgabe 6/2/060**

Bestimmung des Abstands eines Punktes von einer Geraden

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Abstand von Unterräumen, orthogonales Komplement**Stoffeinheiten:** 6/2/17 - 6/2/22 Abstand von UnterräumenIm 2-dimensionalen euklidischen Raum  $\mathbb{R}^2$  betrachten wir den Punkt  $P$  und die Gerade  $G = Q \vee R$ , wobei  $P = (1, 3)$ ,  $Q = (1, 1)$  und  $R = (-1, 2)$  ist.Bestimmen Sie den Abstand zwischen  $P$  und  $G$ .**Aufgabe 6/2/065**

Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (1)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Abstand von Unterräumen, orthogonales Komplement**Stoffeinheiten:** 6/2/17 - 6/2/22 Abstand von Unterräumen $P_n$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle := a_0 b_0 + a_1 b_1 + \dots + a_n b_n$$

definiert ist, wobei  $f, g \in P_n$  Polynome

$$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$$g = b_0 + b_1 X + \dots + b_n X^n \in P_n, \quad b_i \in \mathbb{R}$$

bezeichnen.

Wir betrachten  $P_n$  in der üblichen Weise als affinen euklidischen Raum. Bestimmen Sie den Abstand zwischen dem Unterraum  $P_{n-1} \subset P_n$  und

- (1) dem Polynom  $X^n$ ,
- (2) dem Polynom  $a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1} + X^n$   
(für gegebene Zahlen  $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{R}$ ),
- (3) dem Polynom  $a_0 + a_1 X + \dots + a_{n-1} X^{n-1} + a_n X^n$   
(für gegebene Zahlen  $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ).

**Aufgabe 6/2/070**

Bestimmung verschiedener Abstände

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Abstand von Unterräumen, orthogonales Komplement**Stoffeinheiten:** 6/2/17 - 6/2/22 Abstand von UnterräumenWir betrachten den 3-dimensionalen affinen euklidischen Raum  $\mathbb{R}^3$ .

- (1) Bestimmen Sie den Abstand des Punktes  $(1, 1, 1)$  von der Ebene, die durch  $x + 2y - 3z = 1$  gegeben ist.

- (2) Bestimmen Sie den Abstand der beiden Geraden, die durch folgende Parameterdarstellungen gegeben sind:

$$G_1 = (1, 0, 1) + \mathbb{R} \cdot (0, 0, 1),$$

$$G_2 = (1, 2, 3) + \mathbb{R} \cdot (1, 1, 1)$$

- (3) Es sei  $E := P_1 \vee P_2 \vee P_3$  mit  $P_1 = (1, 3, -1)$ ,  $P_2 = (2, 3, 0)$ ,  $P_3 = (3, 4, 1)$ . Bestimmen Sie den Abstand zwischen  $E$  und  $(0, 0, 0)$ .

### Aufgabe 6/2/075

Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (2)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Abstand von Unterräumen, orthogonales Komplement

**Stoffeinheiten:** 6/2/17 - 6/2/22 Abstand von Unterräumen

$V$  sei der Vektorraum der stetigen Funktionen  $[-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$  und  $\langle, \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  die Abbildung, die durch

$$\langle f, g \rangle := \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

definiert ist.

- (1) Zeigen Sie, dass jeder endlichdimensionale Unterraum von  $V$  mit der Einschränkung der Abbildung  $\langle, \rangle$  einen euklidischen Vektorraum bildet.
- (2) Bestimmen Sie im Sinne von (1) den Abstand von  $\cos^{n+1}$  zum Unterraum

$$\mathbb{R} + \mathbb{R} \cdot \cos + \mathbb{R} \cdot \sin + \mathbb{R} \cdot \cos_2 + \mathbb{R} \cdot \sin_2 + \dots + \mathbb{R} \cdot \cos_n + \mathbb{R} \cdot \sin_n$$

für eine natürliche Zahl  $n \geq 1$ , wobei  $\sin_k$  und  $\cos_k$  die durch  $\sin_k(x) := \sin(kx)$  bzw.  $\cos_k(x) := \cos(kx)$  definierten Funktionen sind.

### Aufgabe 6/2/076

(S: Varianten)

Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (3)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Abstand von Unterräumen, orthogonales Komplement

**Stoffeinheiten:** 6/2/17 - 6/2/22 Abstand von Unterräumen

$P_n$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle := a_0b_0 + a_1b_1 + \dots + a_nb_n$$

definiert ist, wobei  $f, g \in P_n$  Polynome

$$f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$$g = b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n \in P_n, \quad b_i \in \mathbb{R}$$

bezeichnen.

Gegeben sind die Polynome

$$f_1 = 3X^2 + 2X + 7, \quad f_2 = 2X^2 + 8X + 6,$$

$$f_3 = 3X^2 + 2X + 5, \quad f_4 = 15X^2 + 2X + 7.$$

- (1) Bestimmen Sie das Polynom  $g$  mit  $\deg(g) \leq 2$ , das denselben Abstand von  $f_1, f_2, f_3, f_4$  hat.
- (2) Bestimmen Sie den Abstand zwischen  $g$  und  $f_1$ .
- (3) Zeigen Sie, dass  $h = g + a_3X^3 + a_4X^4 + \dots + a_nX^n$  mit  $a_i \in \mathbb{R}$  ebenfalls denselben Abstand von  $f_1, f_2, f_3, f_4$  hat und bestimmen Sie den Abstand zwischen  $h$  und  $f_1$ .

**Lösung.** Es sei  $g = b_0 + b_1X + b_2X^2 \in \mathbb{P}$  ein Polynom, das denselben Abstand von  $f_1, f_2, f_3, f_4$  hat. Es gilt

$$d(g, f_1)^2 = (b_2 - 3)^2 + (b_1 - 2)^2 + (b_0 - 7)^2 =$$

$$d(g, f_2)^2 = (b_2 - 2)^2 + (b_1 - 8)^2 + (b_0 - 6)^2 =$$

$$d(g, f_3)^2 = (b_2 - 3)^2 + (b_1 - 2)^2 + (b_0 - 5)^2 =$$

$$d(g, f_4)^2 = (b_2 - 15)^2 + (b_1 - 2)^2 + (b_0 - 7)^2,$$

wobei  $d(g, f_i)$  den Abstand zwischen  $g$  und  $f_i$  bezeichnet. Da sich Quadrate auf den verschiedenen Seiten der so erhaltenen Gleichungen aufheben, erhalten wir  $b_2 = 9$ ,  $b_1 = 6$ ,  $b_0 = 6$  und so die Lösungen für (1) und (2) als

$$g = 9X^2 + 6X + 6, \quad d(g, f_1) = \sqrt{53}.$$

### Aufgabe 6/2/080

Orientierter Winkel

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, orientierter Winkel, kanonisch orientierter euklidischer Standardraum

**Stoffeinheiten:** [6/2/27 - 6/2/32](#) Volumen

Bestimmen Sie den orientierten Winkel zwischen den Vektoren

$$\mathbf{x} := (4, 3), \quad \mathbf{y} := (3\sqrt{3} + 4, -4\sqrt{3} + 3)$$

in der kanonisch orientierten euklidischen Ebene  $\mathbb{R}^2$ .

### Aufgabe 6/2/090

Vektorprodukt (1)

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt

**Stoffeinheiten:** [6/2/33 - 6/2/42](#) Vektorprodukt

Im kanonisch orientierten euklidischen Vektorraum  $\mathbb{R}^3$  sind die folgenden Gleichungen für das Vektorprodukt mit dem Vektor  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$  zu lösen:

$$(1) (3, 1, 4) \times \mathbf{x} = (-1, -1, 1)$$

$$(2) (2, 2, 1) \times \mathbf{x} = (1, 2, 3)$$

- (3)  $\mathbf{a} \times \mathbf{x} = \mathbf{b}$  mit beliebig gegebenen  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ,  $\mathbf{a} \neq 0$ . Zeigen Sie dazu: Die Lösungsmenge ist genau dann nicht leer, wenn  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$  ist, und in diesem Fall besitzt sie die Gestalt  $\{\mathbf{x}_0 + \alpha \cdot \mathbf{a} \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$  mit einer beliebig gewählten speziellen Lösung  $\mathbf{x}_0$ .

### Aufgabe 6/2/100

Vektorprodukt (2)

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt

Ist das Vektorprodukt in einem euklidischen orientierten 3-dimensionalen Raum assoziativ, kommutativ bzw. distributiv? Geben Sie jeweils einen Beweis oder ein Gegenbeispiel an.

**Aufgabe** 6/2/110

Quaternionen

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt, Norm eines Vektors

**Stoffeinheiten:** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt

Wir betrachten einen orientierten 3-dimensionalen euklidischen Vektorraum  $V$  und bilden die direkte Summe  $\mathbb{H} := \mathbb{R} \oplus V$ . Zeigen Sie:

- (1) Auf  $\mathbb{H}$  lässt sich eindeutig eine Multiplikation „ $\cdot$ “ definieren, bei der die beiderseitige Multiplikation mit Elementen von  $\mathbb{R}$  durch die skalare Multiplikation im  $\mathbb{R}$ -Vektorraum  $\mathbb{H}$  gegeben ist und so, dass für  $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in V$  gilt  $\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = -\langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle + \mathbf{u} \times \mathbf{w}$ .  $\mathbb{H}$  wird durch diese Multiplikation zu einem (nichtkommutativen) Ring.
- (2) Die Abbildung  $\varphi : \mathbb{R} \oplus V \rightarrow \mathbb{R} \oplus V$  mit  $\varphi(a + \mathbf{u}) = a - \mathbf{u}$  für  $a \in \mathbb{R}, \mathbf{u} \in V$  ist  $\mathbb{R}$ -linear, und es ist  $\varphi(\alpha \cdot \beta) = \varphi(\beta) \cdot \varphi(\alpha)$  für  $\alpha, \beta \in \mathbb{H}$ . Weiter wird durch  $N : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{R}$  mit

$$N(\alpha) := \sqrt{\alpha \cdot \varphi(\alpha)}, \quad \alpha \in \mathbb{H}$$

eine Norm auf dem Vektorraum  $\mathbb{H}$  gegeben, d.h. es gelten die folgenden Eigenschaften:

- (i) Für  $\mathbf{x} \in \mathbb{H}$  ist  $N(\mathbf{x}) \geq 0$  mit Gleichheit genau dann, wenn  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ .
  - (ii) Für  $\mathbf{x} \in V$  und  $\alpha \in \mathbb{R}$  ist  $N(\alpha \cdot \mathbf{x}) = |\alpha| \cdot N(\mathbf{x})$ .
  - (iii) Für  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$  gilt  $N(\mathbf{x} + \mathbf{y}) \leq N(\mathbf{x}) + N(\mathbf{y})$ .
- (3) Mit der Einschränkung der obigen Multiplikation bildet  $\mathbb{H} - \{0\}$  eine Gruppe.

**Aufgabe** 6/2/120

(S: Varianten)

Orthonormierung (1)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Orthonormalbasis, Skalarprodukt, schmidt-sches Orthogonalisierungsverfahren

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

Verwenden Sie das Orthogonalisierungsverfahren nach E. Schmidt zur Bestimmung einer Orthonormalbasis des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , deren Fahne mit der Fahne der folgenden Basis  $(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  übereinstimmt;

$$\mathbf{v}_1 = (1, -1, -1), \quad \mathbf{v}_2 = (-1, 3, -2), \quad \mathbf{v}_3 = (-1, 1, 2).$$

**Lösung.** Wir orthogonalisieren zunächst die gegebene Basis. Dazu wird  $\mathbf{b}_1 := \mathbf{v}_1$  gewählt und  $\mathbf{b}_2 := x_1 \mathbf{b}_1 + \mathbf{v}_2$  als Vektor, für den  $\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2 \rangle = 0$  ist, d.h.

$$x_1 \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle + \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = 0 \quad \text{mit} \quad \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle = 3, \quad \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{v}_2 \rangle = -2.$$

Es folgt  $x_1 = \frac{2}{3}$ , und Einsetzen ergibt  $\mathbf{b}_2 = \left(-\frac{1}{3}, \frac{7}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ .

Analog werden  $y_1, y_2 \in \mathbb{R}$  gewählt, für die

$$\mathbf{b}_3 = y_1 \mathbf{b}_1 + y_2 \mathbf{b}_2 + \mathbf{v}_3, \quad \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3 \rangle = \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3 \rangle = 0$$

ist, daher

$$y_1 \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_1 \rangle + \langle \mathbf{b}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = y_2 \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2 \rangle + \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = 0.$$

Aus

$$\langle \mathbf{b}_1, \mathbf{v}_3 \rangle = -4, \quad \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_2 \rangle = \frac{38}{3}, \quad \langle \mathbf{b}_2, \mathbf{v}_3 \rangle = -\frac{8}{3}$$

erhalten wir

$$y_1 = \frac{4}{3}, \quad y_2 = \frac{4}{19}.$$

Durch Einsetzen ergibt sich der dritte Basisvektor  $\mathbf{b}_3 = \left(\frac{5}{19}, \frac{3}{19}, \frac{2}{19}\right)$ .

Abschließend wird die gefundene Orthogonalbasis  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$  durch Multiplikation mit Konstanten normiert; wir erhalten z.B. die Orthonormalbasis

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}(-1, 1, 1), \frac{1}{\sqrt{114}}(1, -7, 8), \frac{1}{\sqrt{38}}(5, 3, 2)\right).$$

**Anmerkung.** Vor dem Normieren kann ein Vektor mit einem beliebigen Faktor ( $\neq 0$ ) multipliziert werden; auf diese Weise wird das Rechnen mit Brüchen oder gemeinsamen Faktoren der Komponenten weitgehend überflüssig!

### Aufgabe 6/2/130

Orthonormierung (2)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Orthonormalbasis, Skalarprodukt, schmidt-sches Orthogonalisierungsverfahren

**Stoffeinheiten:** [6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung](#)

Orthonormieren Sie in jedem der folgenden euklidischen Vektorräume  $V$  die angegebenen Vektoren  $v_1, v_2, \dots \in V$  nach dem Verfahren von E. Schmidt.

- (1)  $V$  sei der euklidische Standardraum  $\mathbb{R}^3$ ,  $v_1 := (1, 2, 1)$ ,  $v_2 := (2, 1, 2)$ .
- (2)  $V$  sei der euklidische Standardraum  $\mathbb{R}^4$ ,  $v_1 := (1, 0, 1, 0)$ ,  $v_2 := (1, 2, 1, 1)$ ,  $v_3 := (1, 1, 1, 1)$ .

### Aufgabe 6/2/140

Orthonormierung (3)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Orthonormalbasis, Skalarprodukt, schmidt-sches Orthogonalisierungsverfahren

**Stoffeinheiten:** [6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung](#)

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis des Unterraumes

$U := \mathbb{R} \cdot (1, 1, 1, 1) + \mathbb{R} \cdot (1, 2, 3, 4)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^4$ , in der der Vektor  $(1, 1, 1, 1)$  vorkommt!

### Aufgabe 6/2/150

Orthonormierung (4)

**Index:** euklidischer affiner Standardraum, Orthonormalbasis, Skalarprodukt, Vektorprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 Orthogonalität und Orthogonalisierung

In jedem der folgenden Fälle sind die gegebenen Vektoren zu einer Orthonormalbasis des betreffenden euklidischen Vektorraumes  $V$  zu ergänzen:

(1)  $V$  ist der euklidische Standardraum  $\mathbb{R}^3$  und  $v_1 \in V$  mit

$$v_1 = \frac{1}{\sqrt{14}}(1, 2, 3).$$

(2)  $V$  ist der euklidische Standardraum  $\mathbb{R}^4$  und  $v_1, v_2 \in V$  mit

$$v_1 = \frac{1}{2}(1, 1, -1, -1), v_2 = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1).$$

**Aufgabe 6/2/160**

Skalarprodukt auf einem Vektorraum reeller Polynome (1)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

$P_n$  sei der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  und  $a \in \mathbb{R}$  eine Zahl. Wir definieren eine Abbildung  $\langle \cdot, \cdot \rangle_a: P_n \times P_n \rightarrow \mathbb{R}$  durch

$$\langle f, g \rangle_a = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(a)g^{(k)}(a),$$

wobei  $f^{(k)}(a)$  die  $k$ -Ableitung des Polynoms  $f$  an der Stelle  $a$  bezeichnet. Ist  $\langle f, g \rangle_a$  ein Skalarprodukt?

**Aufgabe 6/2/170**

Skalarprodukt auf einem Vektorraum reeller Polynome (2)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

$P_n$  sei der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  und  $a_0, \dots, a_r$  paarweise verschiedene reelle Zahlen. Durch

$$\langle f, g \rangle := \sum_{k=0}^r f(a_k)g(a_k)$$

wird eine Abbildung  $P_n \times P_n \rightarrow \mathbb{R}$  definiert. Welche Bedingung müssen die gegebenen Daten erfüllen, damit  $\langle f, g \rangle$  ein Skalarprodukt ist?

**Aufgabe 6/2/180**

Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (1)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

$a, b \in \mathbb{R}$  seien Zahlen,  $a < b$  und  $V$  der reelle Vektorraum der stetigen Funktionen  $[a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Erfüllt die durch

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x)g(x) dx$$

definierte Abbildung  $V^2 \rightarrow \mathbb{R}$  folgende Bedingungen?

- (1)  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  ist bilinear.
- (2) Für  $f \in V \setminus \{0\}$  ist  $\langle f, f \rangle$  positiv.

### Aufgabe 6/2/190

Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (2), eine Orthonormalbasis

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 [Orthogonalität und Orthogonalisierung](#)

$V$  sei der Vektorraum der stetigen Funktionen  $[-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ .

- (1) Zeigen Sie, dass durch

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x) dx$$

auf jedem endlichdimensionalen Unterraum  $U$  von  $V$  ein Skalarprodukt definiert ist, d.h.  $(U, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  ist ein euklidischer Vektorraum.

- (2) Zeigen Sie, dass das  $(2n + 1)$ -Tupel

$$(1, \cos, \sin, \cos_2, \sin_2, \dots, \cos_n, \sin_n)$$

eine Orthogonalbasis des von diesen Abbildungen erzeugten Unterraumes  $U$  bildet, wobei  $\sin_k$  und  $\cos_k$  die durch  $\sin_k(x) := \sin(kx)$  bzw.  $\cos_k(x) := \cos(kx)$  definierten Funktionen sind.

Gewinnen Sie daraus durch Normieren eine Orthonormalbasis.

### Aufgabe 6/2/200

Beispiele positiv definiten hermitescher Formen

**Index:** unitärer Vektorraum, positiv definite hermitesche Form

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 [Positiv definite hermitesche Formen](#)

$V = M(n, m; \mathbb{C})$  sei der Vektorraum der komplexen  $n \times m$ -Matrizen. Stellen Sie fest, welche der folgenden Abbildungen  $V^2 \rightarrow \mathbb{C}$  eine positiv definite hermitesche Form ist.

- (1)  $(A, B) \mapsto \operatorname{tr}(A \cdot {}^t B)$ .
- (2)  $(A, B) \mapsto \operatorname{tr}(\bar{A} \cdot {}^t B)$ .
- (3)  $(A, B) \mapsto \operatorname{tr}(A \cdot {}^t \bar{B})$ .

### Aufgabe 6/2/210

Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (3), eine Orthonormalbasis

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt, schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** 6/2/8 - 6/2/14 [Orthogonalität und Orthogonalisierung](#)

$P_2$  sei der Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq 2$ .

(1) Zeigen Sie, dass auf  $P_2$  durch

$$\langle f, g \rangle := \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

ein Skalarprodukt definiert wird.

(2) Bestimmen Sie in dem durch (1) gegebenen euklidischen Vektorraum  $P_2$  eine Orthonormalbasis, deren Fahne mit der Fahne der Basis  $(1, X, X^2)$  übereinstimmt.

### Aufgabe 6/2/220

Skalarprodukt auf der Komplexifizierung eines euklidischen Raumes

**Index:** euklidischer Vektorraum, unitärer Vektorraum, Skalarprodukt

**Stoffeinheiten:** 6/2/1 - 6/2/7 Positiv definite hermitesche Formen

$V$  sei ein euklidischer Vektorraum mit Skalarprodukt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  und  $V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV$  die Komplexifizierung von  $V$ . Dabei wird  $V$  in der üblichen Weise mit dem ersten direkten Summanden identifiziert. Zeigen Sie:

$V_{\mathbb{C}}$  ist ein unitärer Vektorraum mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle x_1 + iy_1, x_2 + iy_2 \rangle := (\langle x_1, x_2 \rangle + \langle y_1, y_2 \rangle) + i(\langle x_1, y_2 \rangle - \langle y_1, x_2 \rangle)$$

definiert ist ( $x_i, y_j \in V$ ), und dessen Einschränkung auf den reellen Unterraum  $V$  von  $V_{\mathbb{C}}$  das Skalarprodukt des ursprünglichen euklidischen Raumes  $V$  ergibt.

### Aufgabe 6/2/230

Gramsche Matrix (1)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt, orientiertes Volumen, Gramsche Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/2/27 - 6/2/32 Volumen

$P_n$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle := a_0b_0 + a_1b_1 + \dots + a_nb_n$$

definiert ist, wobei  $f, g \in P_n$  Polynome

$$f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

$$g = b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n \in P_n, \quad b_i \in \mathbb{R}$$

bezeichnen.  $(1, X, X^2, \dots, X^n)$  ist eine Basis von  $P_n$ .

Bestimmen Sie die *Gramsche Matrix*  $((\langle X^i, X^j \rangle)_{i,j=0,\dots,n})$ .

### Aufgabe 6/2/240

(S: Varianten)

Gramsche Matrix (2)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt, orientiertes Volumen, Gramsche Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/2/27 - 6/2/32 Volumen

$\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$  sei eine Basis im zweidimensionalen euklidischen Vektorraum  $V$  mit dem Skalarprodukt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  und  $\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2 \in V$ .

Berechnen Sie die *Gramsche Matrix*  $\text{GM}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) := (\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq 2}$  der Basis  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ , falls

$$\text{GM}(\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

ist und die Koordinaten bezüglich  $\mathcal{B}$  für  $\mathbf{b}_1$  durch  $(-1, 1)$  bzw. für  $\mathbf{b}_2$  durch  $(-2, 1)$  gegeben sind.

**Lösung.** Offenbar sind  $\mathbf{b}'_1$  und  $\mathbf{b}'_2$  linear unabhängig. Es sei  $\mathcal{B}' = (\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2)$  und

$$U_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

die Übergangsmatrix von  $\mathcal{B}'$  zu  $\mathcal{B}$ . Dann ist

$$U := U_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

die Übergangsmatrix von  $\mathcal{B}$  zu  $\mathcal{B}'$ . Nun sei  $U = (u_{i,j})$ . Dann ist  $\mathbf{b}_i = \sum_r u_{ri} \mathbf{b}'_r$ , und es ergibt sich

$$\begin{aligned} \text{GM}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) &= \left( \left\langle \sum_r u_{ri} \mathbf{b}'_r, \sum_s u_{sj} \mathbf{b}'_s \right\rangle \right) \\ &= \left( \sum_{r,s} u_{ri} \langle \mathbf{b}'_r, \mathbf{b}'_s \rangle u_{sj} \right) = {}^t U \cdot \text{GM}(\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2) \cdot U \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

**Aufgabe** 6/2/250

(S: Varianten)

Gramsche Matrix (3)

**Index:** euklidischer Vektorraum, Skalarprodukt, orientiertes Volumen, Gramsche Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/2/27 - 6/2/32 Volumen

$\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$  sei eine Basis im unitären Vektorraum  $V$  mit der positiv definiten hermiteschen Form  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  sowie  $\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2 \in V$ . Berechnen Sie die *Gramsche Matrix*  $\text{GM}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) := (\langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq 2}$  der Basis  $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2)$ , falls

$$\text{GM}(\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2) = \begin{pmatrix} 37 & (-i - 12) \\ (-i - 12) & 14 \end{pmatrix}$$

ist und bezüglich  $\mathcal{B}$  die Koordinaten von  $\mathbf{b}_1$  durch  $((-3i - 1), (-2i - 1))$  bzw. von  $\mathbf{b}_2$  durch  $((-2i - 1), (-i - 1))$  gegeben sind.

**Lösung.** Offenbar sind  $\mathbf{b}'_1$  und  $\mathbf{b}'_2$  linear unabhängig. Es sei  $\mathcal{B}' = (\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2)$  und

$$U_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} = \begin{pmatrix} (-3i - 1) & (-2i - 1) \\ (-2i - 1) & (-i - 1) \end{pmatrix}$$

die Übergangsmatrix von  $\mathcal{B}'$  zu  $\mathcal{B}$ . Dann ist

$$U := U_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}^{-1} = \begin{pmatrix} (-i - 1) & (2i + 1) \\ (2i + 1) & (-3i - 1) \end{pmatrix}$$

die Übergangsmatrix von  $\mathcal{B}$  zu  $\mathcal{B}'$ . Wir setzen  $U = (u_{i,j})$ . Dann ist  $\mathbf{b}_i = \sum_r u_{ri} \mathbf{b}'_r$  und es ergibt sich

$$\text{GM}(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = \left( \left\langle \sum_r u_{ri} \mathbf{b}'_r, \sum_s u_{sj} \mathbf{b}'_s \right\rangle \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \left( \sum \bar{u}_{ri} \langle \mathbf{b}'_r, \mathbf{b}'_s \rangle u_{sj} \right) = {}^t \bar{U} \cdot \text{GM}(\mathbf{b}'_1, \mathbf{b}'_2) \cdot U \\
&= \begin{pmatrix} (i-1) & (-2i+1) \\ (-2i+1) & (3i-1) \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 37 & (-i-12) \\ (-i-12) & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} (-i-1) & (2i+1) \\ (2i+1) & (-3i-1) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} (6i+216) & (-84i-315) \\ (66i-319) & (14i+493) \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

**Aufgabe 6/2/260**

Vektorprodukt

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt, Fläche eines Parallelogramms**Stoffeinheiten:** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt $\mathbb{R}^3$  sei der kanonisch orientierte euklidische 3-dimensionale Standardraum.

- (1) Zeigen Sie, dass  $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 2\mathbf{a} \times \mathbf{b}$  ist für  $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ .
- (2) Welche geometrische Bedeutung hat diese Identität?

**Aufgabe 6/2/270**

(S: Varianten)

Fläche und Volumen

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt, Fläche eines Parallelogramms, Volumen eines Parallelepipeds, gramscche Determinante**Stoffeinheiten:** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt $A = (1, 1, 2)$ ,  $B = (1, 2, 2)$ ,  $C = (-2, -3, 3)$  seien Punkte des euklidischen affinen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ .

- (1) Überprüfen Sie mit Hilfe des Vektorprodukts, dass der Koordinatenursprung  $O := (0, 0, 0)$  nicht in der Ebene liegt, die durch  $A, B, C$  verläuft.
- (2) Bestimmen Sie die Fläche des Parallelogramms, das durch die Ecken  $ABC$  gegeben ist.
- (3) Bestimmen Sie das Volumen des Parallelepipeds, das durch  $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$ ,  $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$ ,  $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$  definiert ist.

**Lösung.** Wir wählen die kanonische Orientierung auf  $\mathbb{R}^3$  und bezeichnen mit  $D$  die entsprechende Determinantenfunktion. Dann ist  $D(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$  das orientierte Volumen des durch  $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$  definierten Parallelepipeds und es gilt

$$|\langle \mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle| = D(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

Zu (1) bemerken wir, dass  $D(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = 7 \neq 0$  ist; dies ist gleichzeitig das in (3) erfragte Volumen.Die offensichtliche Interpretation des Begriffs „Fläche“ unter (2) ergibt sich nun, indem die Ebene in  $\mathbb{R}^3$ , die  $A, B, C$  enthält, auf natürliche Weise als euklidischer affiner Raum angesehen wird. Es folgt

$$F = \|(\mathbf{b} - \mathbf{a}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})\| = \sqrt{10}.$$

**Aufgabe 6/2/280**

(S: Varianten)

Fläche eines Parallelogramms (1)

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt, Fläche eines Parallelogramms

**Stoffeinheiten:** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$  mit  $\|\mathbf{a}\| = 5$ ,  $\|\mathbf{b}\| = 4$  seien Vektoren in einem 3-dimensionalen euklidischen Raum. Berechnen Sie mit Hilfe des Vektorprodukts die Fläche der Parallelogramms, das durch  $\mathbf{v}_1 = 5\mathbf{a} + 4\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{v}_2 = 2\mathbf{a} + 3\mathbf{b}$  definiert ist, wenn der Winkel zwischen  $\mathbf{a}$  und  $\mathbf{b}$  gleich  $\frac{1}{3}\pi$  ist.

**Lösung.** Wir wählen eine (beliebige) Orientierung auf  $V$ , diese definiert ein Vektorprodukt  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ . Der Flächeninhalt des Parallelogramms, das durch  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  gebildet wird, ist

$$\begin{aligned} \|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\| &= \|(5\mathbf{a} + 4\mathbf{b}) \times (2\mathbf{a} + 3\mathbf{b})\| \\ &= \left\| 10 \cdot \underbrace{\mathbf{a} \times \mathbf{a}}_0 + 15 \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{b} + 8 \cdot \underbrace{\mathbf{b} \times \mathbf{a}}_{-\mathbf{a} \times \mathbf{b}} + 12 \cdot \underbrace{\mathbf{b} \times \mathbf{b}}_0 \right\| \\ &= 7 \cdot \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = 7 \cdot \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin\left(\frac{1}{3}\pi\right) \\ &= 7 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \sin\left(\frac{1}{3}\pi\right) = 70\sqrt{3}. \end{aligned}$$

**Aufgabe** 6/2/290

(S: Varianten)

Fläche eines Parallelogramms (2)

**Index:** kanonisch orientierter euklidischer Standardraum, Vektorprodukt, Fläche eines Parallelogramms

**Stoffeinheiten:** 6/2/33 - 6/2/42 Vektorprodukt

$\mathbf{a}, \mathbf{b}$  mit  $\|\mathbf{a}\| = 5$ ,  $\|\mathbf{b}\| = 4$  seien Vektoren in einem 3-dimensionalen euklidischen Raum. Es wird vorausgesetzt, dass der Winkel zwischen  $\mathbf{a}$  und  $\mathbf{b}$  gleich  $\frac{1}{6}\pi$  ist.

- (1) Berechnen Sie mit Hilfe des Vektorprodukts die Fläche des Parallelogramms, dessen Diagonalen die Vektoren  $\mathbf{v}_1 = 6\mathbf{a} + 4\mathbf{b}$ ,  $\mathbf{v}_2 = 10\mathbf{a} + 12\mathbf{b}$  sind.
- (2) Welches Verhältnis hat die Fläche des durch  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  gebildeten Parallelogramms zur Fläche des aus den Seiten  $\mathbf{a}, \mathbf{b}$  gebildeten Parallelogramms?

**Lösung.** Wir wählen eine (beliebige) Orientierung auf  $V$ , diese definiert ein Vektorprodukt  $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \mapsto \mathbf{x} \times \mathbf{y}$ . Das Parallelogramm, dessen Diagonalen die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  sind, wird durch  $\frac{1}{2}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1)$ ,  $\frac{1}{2}(\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1)$  gebildet. Sein Flächeninhalt ist

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{2}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \times \frac{1}{2}(\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_1) \right\| &= 16 \cdot \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| \\ &= 16 \cdot \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \\ &= 16 \cdot 5 \cdot 4 \cdot \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) = 160. \end{aligned}$$

Offensichtlich gilt

$$\|\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2\| = 32 \cdot \|a \times b\|$$

für den Flächeninhalt des durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  definierten Parallelogramms.

### Aufgabe 6/3/001

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (1)

**Index:** unitärer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$V$  sei ein unitärer Vektorraum,  $\varphi : V \rightarrow V$  ein Endomorphismus. Welche Beziehung besteht zwischen den Eigenwerten von  $\varphi$  und denen des adjungierten Endomorphismus  $\varphi^*$  von  $\varphi$ ?

### Aufgabe 6/3/002

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (2)

**Index:** unitärer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$V$  sei ein unitärer Vektorraum,  $\varphi : V \rightarrow V$  ein Endomorphismus. Welche Beziehung besteht zwischen der Jordanform von  $\varphi$  und der Jordanform von  $\varphi^*$ ?

### Aufgabe 6/3/003

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (3)

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$\mathbb{R}^3$  sei der euklidische Standardvektorraum und  $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  die Projektion auf die Ebene  $E = \mathbb{R}e_1 + \mathbb{R}e_2$  längs des eindimensionalen Unterraumes, der durch die Gleichung  $x = 2y = z$  gegeben ist.

Bestimmen Sie die Matrix des adjungierten Endomorphismus  $\varphi^*$  von  $\varphi$  bezüglich der Standardbasis.

### Aufgabe 6/3/004

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (4)

**Index:** adjungierter Endomorphismus, Skalarprodukt, Orthonormalbasis, schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren

**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$P_2$  sei der reelle Vektorraum der Polynome vom Grad  $\leq 2$  im Polynomring  $\mathbb{R}[X]$ .

(1) Zeigen Sie, dass durch

$$\langle f, g \rangle := f(0)g(0) + f(1)g(1) + f(2)g(2)$$

ein Skalarprodukt auf  $P_2$  definiert ist.

(2) Bestimmen Sie den adjungierten Endomorphismus des Ableitungsoperators auf dem durch (1) gegebenen euklidischen Raum  $P_2$  durch Angabe seiner Matrix bezüglich der Basis  $(1, X, X^2)$ .

**Aufgabe 6/3/005**

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (5)

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$\varphi$  sei ein Endomorphismus des euklidischen Vektorraumes  $V$  und  $\varphi^*$  sein adjungierter Endomorphismus.

Beweisen Sie:  $\ker(\varphi) = \ker(\varphi^* \cdot \varphi)$ .**Aufgabe 6/3/006**

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (6)

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$\varphi$  sei ein Endomorphismus des euklidischen Vektorraumes  $V$  und  $\varphi^*$  sein adjungierter Endomorphismus.

Beweisen Sie:  $\operatorname{im}(\varphi) = \operatorname{im}(\varphi \cdot \varphi^*)$ .**Aufgabe 6/3/007**

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (7)

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$\varphi$  und  $\psi$  seien Endomorphismen des euklidischen Vektorraumes  $V$  und  $\varphi^*$  der zu  $\varphi$  adjungierte.

Beweisen Sie: Ist  $\varphi^* \psi = 0$ , so gilt  $\operatorname{im}(\varphi) \perp \operatorname{im}(\psi)$ .**Aufgabe 6/3/008**

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (8), invariante Unterräume

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus, invarianter Unterraum**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$P_3$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq 3$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle = f(-1)g(-1) + f(0)g(0) + f(1)g(1) + f(2)g(2)$$

definiert ist.  $\varphi^*$  sei der adjungierte Endomorphismus des Ableitungsoperators  $\varphi$  von  $P_3$ .

- (1) Bestimmen Sie die  $\varphi$ -invarianten Unterräume von  $P_3$ .
- (2) Zeigen Sie:  $U \subseteq P_3$  ist genau dann  $\varphi$ -invariant, wenn  $U^\perp$  ein  $\varphi^*$ -invarianter Unterraum ist.
- (3) Bestimmen Sie die  $\varphi^*$ -invarianten Unterräume von  $P_3$ .

**Aufgabe 6/3/009**

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (9), invariante Unterräume

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus, invarianter Unterraum

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

$P_n$  bezeichne den euklidischen Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das durch

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

definiert ist.  $\varphi^*$  sei der adjungierte Endomorphismus des Ableitungsoperators  $\varphi$  von  $P_n$ .

- (1) Bestimmen Sie die  $\varphi$ -invarianten Unterräume von  $P_n$ .
- (2) Zeigen Sie:  $U \subseteq P_n$  ist genau dann  $\varphi$ -invariant, wenn  $U^\perp$  ein  $\varphi^*$ -invarianter Unterraum ist.
- (3) Bestimmen Sie die  $\varphi^*$ -invarianten Unterräume von  $P_n$ .

**Aufgabe** 6/3/010

(S: Varianten)

Spektralzerlegung (1)

**Index:** Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Endomorphismus, selbstadjungierter Operator, Orthonormalbasis, Eigenvektor einer Matrix, symmetrische Matrix, Diagonalisierung einer symmetrischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

Für die folgenden Matrizen  $A, B$  ist jeweils eine Orthonormalbasis des euklidischen Standardvektorraumes  $\mathbb{R}^3$  zu finden, die aus Eigenvektoren besteht.

$$(1) \quad A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -14 & 10 \\ -14 & -2 & 4 \\ 10 & 4 & 10 \end{pmatrix},$$

$$(2) \quad B = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} -2 & 20 & 10 \\ 20 & -2 & -10 \\ 10 & -10 & 13 \end{pmatrix}.$$

**Lösung.**

- (1) Zunächst bestimmen wir die Eigenwerte der Matrix  $A$ ; sie ergeben sich als Nullstellen des charakteristischen Polynoms

$$\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = (X + 2) \cdot (X - 1) \cdot (X - 2),$$

das wir (um unnötige Brüche zu vermeiden) zweckmäßig mittels

$$\begin{aligned} 9^3 \cdot \chi_A &= \det \begin{pmatrix} 9X - 1 & 14 & -10 \\ 14 & 9X + 2 & -4 \\ -10 & -4 & 9X - 10 \end{pmatrix} \\ &= X^3 - X^2 - 4X + 4 \end{aligned}$$

berechnet haben. Die Nullstellen sind paarweise verschieden, d.h. jeder der Eigenräume ist eindimensional. Daher genügt es, für jeden Eigenwert  $\lambda$  einen von  $\mathbf{0}$  verschiedenen Vektor im Lösungsraum des entsprechenden homogenen linearen Gleichungssystems zu wählen und zu normieren. So finden wir eine Orthonormalbasis

$$\left( \frac{1}{3}(-2, -2, 1), \frac{1}{3}(-1, 2, 2), \frac{1}{3}(2, -1, 2) \right).$$

(2) In diesem Fall wird zunächst analog vorgegangen: Es ist

$$\chi_B = \det(X \cdot E_3 - B) = (X + 3) \cdot (X - 2)^2,$$

und für den Eigenwert  $\lambda_1 = -3$  ergibt sich ein Eigenvektor  $(2, -2, -1)$ . Der Eigenraum zu  $\lambda_2 = 2$  jedoch ist zweidimensional. Wir bestimmen eine Basis, indem wir das homogene lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 4 & -4 & -2 \\ -4 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

lösen (wobei wieder in der charakteristischen Gleichung Brüche vermieden wurden); wir erhalten mit dem gaußschen Algorithmus (oder „auf den ersten Blick“)

$$\mathcal{B}' = ((1, 1, 0), (1, 0, 2)).$$

Nach dem Orthogonalisierungsverfahren entsteht daraus

$$\mathcal{B}'_{\text{orth}} = ((1, 1, 0), (1, -1, 4)), \text{ d.h.}$$

$$\mathcal{B} = ((2, -2, -1), (1, 1, 0), (1, -1, 4))$$

ist eine Orthogonalbasis von  $\mathbb{R}^3$ , die aus Eigenvektoren der Matrix  $B$  besteht. Aus  $\mathcal{B}$  ergibt sich eine Orthonormalbasis

$$\left( \frac{1}{3}(2, -2, -1), \frac{\sqrt{2}}{2}(1, 1, 0), \frac{\sqrt{2}}{6}(1, -1, 4) \right).$$

**Anmerkungen.** Die Rechnung lässt sich im Fall (2) noch vereinfachen, wenn anstelle der schon wiederholt verwendeten Standardmethode zur Bestimmung des Eigenraumes das orthogonale Komplement zum Eigenraum  $V_{\lambda_1} = V_{\lambda_2}^\perp$  bestimmt wird.

Unter (2) ist leicht zu erkennen, dass die Aufgabe (da ein mehrfacher Eigenwert existiert) unendlich viele Lösungen besitzt. Manchmal sind mit etwas Glück und rechnerischem Geschick sogar noch „bessere“ zu finden, wie im vorliegenden Fall die Basis

$$\left( \frac{1}{3} \cdot (2, -2, -1), \frac{1}{3} \cdot (1, 2, -2), \frac{1}{3} \cdot (2, 1, 2) \right),$$

auf die wir bei systematischem Vorgehen mit dem gaußschen Algorithmus nicht gekommen sind.

### Aufgabe 6/3/015

Eine orthogonale Matrix

**Index:** euklidischer Vektorraum, orthogonale Vektoren, orthogonale Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

$a, b$  seien reelle Zahlen mit  $|a|, |b| \leq 1$ . Zeigen Sie, dass

$$U_{ab} := \begin{pmatrix} a & \sqrt{1-a^2} & 0 \\ b \cdot \sqrt{1-a^2} & -ab & -\sqrt{1-b^2} \\ \sqrt{1-b^2} \cdot \sqrt{1-a^2} & -a \cdot \sqrt{1-b^2} & b \end{pmatrix}$$

eine orthogonale Matrix ist.

### Aufgabe 6/3/020

Spektralzerlegung (2)

**Index:** Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Endomorphismus, selbstadjungierter Operator, Orthonormalbasis, Eigenvektor einer Matrix, symmetrische Matrix, Diagonalisierung einer symmetrischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

Wir betrachten den Endomorphismus  $\varphi$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^4$ , der bezüglich der Standardbasis die Matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -3 \\ -3 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hat. Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis, für die die Matrix von  $\varphi$  Diagonalgestalt hat. Geben Sie diese Diagonalmatrix an!

**Aufgabe 6/3/030**

Spektralzerlegung (3)

**Index:** Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Endomorphismus, selbstadjungierter Operator, Orthonormalbasis, Eigenvektor einer Matrix, symmetrische Matrix, Diagonalisierung einer symmetrischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

Führen Sie die Spektralzerlegung des euklidischen Standardraumes für die folgende Matrix aus:

$$\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

**Aufgabe 6/3/040**

Spektralzerlegung (4)

**Index:** Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Endomorphismus, selbstadjungierter Operator, Orthonormalbasis, Eigenvektor einer Matrix, symmetrische Matrix, Diagonalisierung einer symmetrischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

Bestimmen Sie die Eigenwerte der linearen Transformation des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^n$ , die bezüglich der Standardbasis durch die Matrix

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

beschrieben wird, und suchen Sie eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren.

**Aufgabe 6/3/043**

(S: Varianten)

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (10)

**Index:** adjungierter Endomorphismus, Skalarprodukt, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

$P_2$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq 2$  mit dem Skalarprodukt, das für

$$f = a_0 + a_1X + a_2X^2, \quad g = b_0 + b_1X + b_2X^2, \quad a_i, b_j \in \mathbb{R}$$

durch

$$\langle f, g \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$$

definiert ist. Wir bezeichnen mit

$$\varphi : P_2 \rightarrow P_2, \quad f \mapsto \frac{df}{dX}$$

den Ableitungsoperator und mit  $\varphi^*$  seinen adjungierten Endomorphismus.

(1) Zeigen Sie, dass  $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3)$  mit

$$f_1 = 3X^2 + 2X + 1, \quad f_2 = X^2 + X, \quad f_3 = 2X^2 + X$$

eine Basis von  $P_2$  ist.

(2) Bestimmen Sie die Matrix von  $\varphi^*$  bezüglich  $\mathcal{B}$ .

**Lösung.** Offensichtlich ist  $\mathcal{B}' = (1, X, X^2)$  eine Orthonormalbasis für  $P_2$ . Es folgt  $M_{\mathcal{B}'}(\varphi^*) = {}^t M_{\mathcal{B}'}(\varphi)$  nach Satz 6/3/1. Aus

$$M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

ergibt sich durch Transposition

$$M_{\mathcal{B}'}(\varphi^*) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die Koordinaten der Polynome  $f_i$  bilden die Spalten einer Matrix, für die auf übliche Weise eine inverse gefunden wird, d.h.  $\mathcal{B}$  ist Basis von  $P_2$ , und die Übergangsmatrix von  $\mathcal{B}$  zu  $\mathcal{B}'$  ergibt sich als

$$U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{mit} \quad U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Es folgt

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi^*) = U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}^{-1} \cdot M_{\mathcal{B}'}(\varphi^*) \cdot U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Aufgabe 6/3/044**

(S: Varianten)

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (11)

**Index:** adjungierter Endomorphismus, Skalarprodukt, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus

$P_2$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq 2$  mit dem Skalarprodukt, das für

$$f = a_0 + a_1X + a_2X^2, \quad g = b_0 + b_1X + b_2X^2, \quad a_i, b_j \in \mathbb{R}$$

durch

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

definiert ist. Wir bezeichnen mit

$$\varphi : P_2 \rightarrow P_2, \quad f \mapsto \frac{df}{dX}$$

den Ableitungsoperator und mit  $\varphi^*$  seinen adjungierten Endomorphismus.

(1) Zeigen Sie, dass  $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3)$  mit

$$f_1 = 2X^2 + 3, \quad f_2 = 3X + 1, \quad f_3 = X^2 - 2X + 1$$

eine Basis von  $P_2$  ist.

(2) Bestimmen Sie die Matrix von  $\varphi^*$  bezüglich  $\mathcal{B}$ .

**Lösung.** Offensichtlich gilt

$$\langle 1, X \rangle = \int_{-1}^1 x dx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0,$$

$$\langle X, X^2 \rangle = \int_{-1}^1 x^3 dx = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = 0,$$

$$\langle 1, X^2 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3},$$

und  $(1, X, 3X^2 - 1)$  ist eine Orthogonalbasis in  $P_2$ .

Dann ist

$$\mathcal{B}_1 = \frac{1}{4}(2\sqrt{2}, 2\sqrt{6}X, \sqrt{10}(3X^2 - 1))$$

eine Orthonormalbasis in  $P_2$  und es folgt  $M_{\mathcal{B}_1}(\varphi^*) = {}^t M_{\mathcal{B}_1}(\varphi)$  nach Satz 6/3/1.  $\mathcal{B}_2 = (1, X, X^2)$  ist keine Orthonormalbasis für  $P_2$ , aber es ist leicht zu sehen, dass

$$M_{\mathcal{B}_2}(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ist. Daher ergibt sich

$$M_{\mathcal{B}_2}(\varphi^*) = U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1}^{-1} \cdot M_{\mathcal{B}_1}(\varphi^*) \cdot U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} = U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1}^{-1} \cdot {}^t(M_{\mathcal{B}_1}(\varphi)) \cdot U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1},$$

$$M_{\mathcal{B}}(\varphi^*) = U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_2}^{-1} \cdot M_{\mathcal{B}_2}(\varphi^*) \cdot U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_2},$$

$$M_{\mathcal{B}_1}(\varphi) = U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1} \cdot M_{\mathcal{B}_2}(\varphi) \cdot U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1}^{-1},$$

wobei  $U_{\mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1}$ ,  $U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_2}$  die Übergangsmatrizen von  $\mathcal{B}_2$  zu  $\mathcal{B}_1$  bzw. von  $\mathcal{B}$  zu  $\mathcal{B}_2$  bezeichnen.

Die Übergangsmatrix von  $\mathcal{B}_1$  zu  $\mathcal{B}_2$  ist

$$U_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 2\sqrt{2} & 0 & -\sqrt{10} \\ 0 & 2\sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 3\sqrt{10} \end{pmatrix},$$

und es folgt

$$W = U_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} \cdot {}^t(U_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}) = \frac{3}{8} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 & -5 \\ 0 & 4 & 0 \\ -5 & 0 & 15 \end{pmatrix},$$

$$M_{\mathcal{B}_2}(\varphi^*) = U_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2} \cdot {}^t(M_{\mathcal{B}_1}(\varphi)) \cdot U_{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2}^{-1} = W \cdot {}^t(M_{\mathcal{B}_2}(\varphi)) \cdot W^{-1}.$$

Wir finden

$$W^{-1} = \frac{2}{15} \cdot \begin{pmatrix} 15 & 0 & 5 \\ 0 & 5 & 0 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad M_{\mathcal{B}_2}(\varphi^*) = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 \\ 6 & 0 & 2 \\ 0 & 15 & 0 \end{pmatrix}$$

und erhalten

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}(\varphi^*) &= U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_2}^{-1} \cdot M_{\mathcal{B}_2}(\varphi^*) \cdot U_{\mathcal{B}, \mathcal{B}_2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -3 & 1 & 5 \\ 4 & -1 & -6 \\ 6 & -2 & -9 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -5 & 0 \\ 6 & 0 & 2 \\ 0 & 15 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 22 & 276 & -172 \\ -22 & -336 & 212 \\ -44 & -507 & 314 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

### Aufgabe 6/3/045

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (12), invariante Unterräume

**Index:** euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus, invarianter Unterraum

**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$P_n$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  in  $\mathbb{R}[X]$  mit dem Skalarprodukt, das für

$$f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n, \quad g = b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n$$

(mit  $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ ) durch

$$\langle f, g \rangle = a_0b_0 + \dots + a_nb_n$$

definiert ist.  $\varphi^*$  sei der adjungierte Endomorphismus des Ableitungsoperators  $\varphi$  von  $P_n$ .

- (1) Bestimmen Sie die  $\varphi$ -invarianten Unterräume von  $P_n$ .
- (2) Zeigen Sie:  $U \subseteq P_n$  ist genau dann  $\varphi$ -invariant, wenn  $U^\perp$  ein  $\varphi^*$ -invarianter Unterraum ist.
- (3) Bestimmen Sie die  $\varphi^*$ -invarianten Unterräume von  $P_n$ .

### Aufgabe 6/3/046

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (13), adjungierter eines Projektionsoperators

**Index:** adjungierter Endomorphismus, Skalarprodukt, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** [6/3/1 - 6/3/8 Der adjungierte Endomorphismus](#)

$\varphi$  sei Projektionsoperator eines euklidischen Vektorraumes. Zeigen Sie, dass der adjungierte Endomorphismus  $\varphi^*$  von  $\varphi$  ebenfalls ein Projektionsoperator ist.

### Aufgabe 6/3/050

Spiegelungen der Ebene

**Index:** orthogonaler Automorphismus, Geradenspiegelung, Orthonormalbasis, Winkel zwischen zwei Vektoren

**Stoffeinheiten:** 6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen

Wir betrachten die lineare Abbildung  $\varphi : E \rightarrow E$  der euklidischen Ebene  $E$ , die bezüglich einer gegebenen Orthonormalbasis die folgende Matrix

$$\frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

besitzt.

- (1) Zeigen Sie:  $\varphi$  ist eine Spiegelung.
- (2) Geben Sie die Spiegelungsgerade  $G$  an (d.h. die Gerade, deren Punkte bei  $\varphi$  unverändert bleiben).
- (3) Bestimmen Sie den Winkel zwischen  $G$  und der ersten Koordinatenachse.

**Aufgabe** 6/3/060

Spiegelungen und Drehungen

**Index:** orthogonaler Automorphismus, Geradenspiegelung, Drehung

**Stoffeinheiten:** 6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen

Geben Sie die Eigenwerte von Drehungen und Spiegelungen der euklidischen Ebene an.

**Aufgabe** 6/3/070

Orthogonale Abbildungen (1)

**Index:** euklidischer Vektorraum, orthogonaler Automorphismus, Orthonormalbasis, Geradenspiegelung, Drehung

**Stoffeinheiten:** 6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen

Überprüfen Sie, dass die Matrizen

$$(1) \quad \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \quad \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{3} + 2 & \sqrt{3} - 2 & \sqrt{2} \\ \sqrt{3} - 2 & \sqrt{3} + 2 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -\sqrt{2} & 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

bezüglich der Standardbasis des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  orthogonale Abbildungen definieren. Beschreiben Sie die Wirkung dieser Abbildungen!

**Aufgabe** 6/3/080

Orthogonale Abbildungen (2)

**Index:** euklidischer Vektorraum, orthogonaler Automorphismus, Orthonormalbasis, Geradenspiegelung, Drehung, Drehwinkel

**Stoffeinheiten:** 6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen

Wir betrachten die euklidische Ebene  $E$ .

- (1) Zeigen Sie: Sind  $\varphi$  und  $\psi$  Spiegelungen von  $E$ , so ist  $\varphi \cdot \psi$  eine Drehung.

(2) Wir beziehen uns nun auf eine fest gewählte Orthonormalbasis und die durch sie gegebene Orientierung.

$\varphi$  sei die Spiegelung an der Geraden, die gegen die erste Koordinatenachse um den Winkel  $\frac{\pi}{6}$  geneigt ist,  $\psi$  die Spiegelung an der Geraden, die gegen die erste

Koordinatenachse um den Winkel  $\frac{\pi}{3}$  geneigt ist. Welchen Drehwinkel hat  $\varphi \cdot \psi$ ?

### Aufgabe 6/3/090

Orthogonale Abbildungen (3)

**Index:** euklidischer Vektorraum, orthogonaler Automorphismus, invarianter Unterraum, orthogonales Komplement

**Stoffeinheiten:** [6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen](#)

Wir betrachten einen euklidischen Vektorraum  $V$  und eine orthogonale Transformation  $\varphi : V \rightarrow V$ .

Beweisen Sie: Falls  $U$  invariant bezüglich  $\varphi$  ist, so ist auch das orthogonale Komplement  $U^\perp$  invariant bezüglich  $\varphi$ .

### Aufgabe 6/3/100

Orthogonale Abbildungen (4)

**Index:** euklidischer Vektorraum, orthogonaler Automorphismus, invarianter Unterraum, orthogonales Komplement

**Stoffeinheiten:** [6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen](#)

$V$  sei ein euklidischer Vektorraum.

(1) Wir wählen zwei Vektoren  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$  mit  $\|\mathbf{x}\| = \|\mathbf{y}\|$ . Beweisen Sie: Es existiert eine orthogonale Abbildung  $\varphi : V \rightarrow V$  mit  $\varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{y}$ .

(2) Gegeben sind die Vektoren  $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2 \in V$  mit  $\|\mathbf{x}_1\| = \|\mathbf{y}_1\|$ ,  $\|\mathbf{x}_2\| = \|\mathbf{y}_2\|$  und der Eigenschaft, dass der Winkel zwischen  $\mathbf{x}_1$  und  $\mathbf{x}_2$  mit dem Winkel zwischen  $\mathbf{y}_1$  und  $\mathbf{y}_2$  übereinstimmt. Beweisen Sie: Es existiert eine orthogonale Abbildung  $\varphi : V \rightarrow V$  mit  $\varphi(\mathbf{x}_1) = \mathbf{y}_1$ ,  $\varphi(\mathbf{x}_2) = \mathbf{y}_2$ .

### Aufgabe 6/3/105

Orthogonale Abbildungen (5)

**Index:** euklidischer Vektorraum, orthogonaler Automorphismus, Norm eines Vektors, Winkel zwischen zwei Vektoren

**Stoffeinheiten:** [6/3/14 - 6/3/15 Klassifikation der orthogonalen Abbildungen](#)

$E$  sei eine euklidische Ebene,  $\varphi : E \rightarrow E$  ein Endomorphismus,  $\varphi^*$  sein adjungierter Endomorphismus. Zeigen Sie:

(1) Ist  $\varphi$  eine Drehung, so ist auch  $\varphi^*$  eine Drehung.

(2) Ist  $\varphi$  eine Punktspiegelung, so ist auch  $\varphi^*$  Punktspiegelung.

(3) Ist  $\varphi$  eine Geradenspiegelung, so ist auch  $\varphi^*$  eine Geradenspiegelung.

Treffen entsprechende Aussagen für einen dreidimensionalen euklidischen Raum zu?

**Aufgabe 6/3/110**

Spektralzerlegung (5)

**Index:** orthogonale Summe von Unterräumen, euklidischer Vektorraum, Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Automorphismus, symmetrische Matrix, Diagonalisierung einer symmetrischen Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

Zerlegen Sie den 3-dimensionalen euklidischen Standardraum in eine orthogonale Summe von Eigenräumen der durch die symmetrische Matrix

$$\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 7 \end{pmatrix}$$

gegebenen linearen Abbildung.

**Aufgabe 6/3/120**

Ebene Quadriken (1)

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Bestimmen Sie eine metrische Hauptachsenform der Quadrik, die in der euklidischen affinen Ebene  $\mathbb{R}^2$  durch das Polynom

$$f = 4X^2 + 32XY + 41Y^2 - 110X - 80Y + 100 \in \mathbb{R}[X, Y]$$

definiert wird und geben Sie die zugehörige Koordinatentransformation an!

**Aufgabe 6/3/130**

Ebene Quadriken (2)

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Welche Gestalt hat die Quadrik in der euklidischen Standardebene  $\mathbb{R}^2$ , die durch die folgende Gleichung gegeben ist?

$$9x^2 + 24xy + 16y^2 + 130x + 90y + 125 = 0$$

**Aufgabe 6/3/140**

Ebene Quadriken (3)

(S: Varianten)

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken, Bewegung eines euklidischen affinen Raumes

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom

$$f = 2X_1^2 - 8X_1X_2 + 8X_2^2 - 3X_1 + X_2 + 2 \in \mathbb{R}[X_1, X_2]$$

eine Bewegung der affinen euklidischen Standardebene an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ -4 & 8 \end{pmatrix} \text{ sowie } a_1 = -3, \quad a_2 = 1, \quad a_0 = 2.$$

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_2 - A) = X^2 - 10X$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 10$  und  $\lambda_2 = 0$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem  $A \cdot x = \lambda_1 x$ , d.h. gleichbedeutend das System

$$\begin{pmatrix} -8 & -4 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(1, -2)$  erzeugt, und da der Eigenraum des anderen Eigenwertes orthogonal zu diesem ist, ergibt sich nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^2$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2), \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 1).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$  und  $\mathbf{v}_2$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom in

$$f = 10Y_1^2 - \sqrt{5}Y_1 - \sqrt{5}Y_2 + 2$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^t U A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$f = 10\left(Y_1 - \frac{1}{20}\sqrt{5}\right)^2 - \sqrt{5}Y_2 + \frac{15}{8}.$$

überführt. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 + \frac{1}{20}\sqrt{5}, \quad Y_2 = Z_2 + \frac{3}{8}\sqrt{5}$$

erhalten wir

$$f = 10Z_1^2 - \sqrt{5}Z_2,$$

woraus nach Multiplikation mit  $\frac{2}{5}\sqrt{5}$  die Gestalt

$$g = 4\sqrt{5}Z_1^2 - 2Z_2$$

entsteht; dies ist die Hauptachsenform einer Parabel.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$X_1 = \frac{1}{5}\sqrt{5}Z_1 + \frac{2}{5}\sqrt{5}Z_2 + \frac{4}{5},$$

$$X_2 = -\frac{2}{5}\sqrt{5}Z_1 + \frac{1}{5}\sqrt{5}Z_2 + \frac{11}{40}.$$

**Aufgabe 6/3/150**

Quadriken (4), Beispiel in der Dimension 4

**Index:** metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken, Quadrik

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 [Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken](#)

Im 4-dimensionalen euklidischen Standardraum wird durch das Polynom

$$f := Y^2 - 4YZ + Z^2 - 2XU + 2X - 4Y + 2Z \in \mathbb{R}[X, Y, Z, U]$$

eine Quadrik  $Q = V(F)$  gegeben. Bestimmen Sie eine Hauptachsenform für  $f$  und die zugehörige orthogonale Koordinatentransformation.

**Aufgabe 6/3/160**

Normale Endomorphismen (1)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator

**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 [Spektralsatz für normale Operatoren](#)

$V$  sei ein unitärer Vektorraum. Zeigen Sie, dass eine Projektion

$\varphi : V \rightarrow V$  genau dann normal ist, wenn  $\text{im}(\varphi) \perp \text{ker}(\varphi)$ .

**Aufgabe 6/3/170**

Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (14)

**Index:** unitärer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus, orthogonale Summe von Unterräumen

**Stoffeinheiten:** 6/3/1 - 6/3/8 [Der adjungierte Endomorphismus](#)

- (1)  $V$  sei ein unitärer Vektorraum,  $\varphi : V \rightarrow V$  ein Endomorphismus,  $\varphi^*$  der adjungierte. Zeigen Sie:  $\text{ker}(\varphi^*) \oplus \text{im}(\varphi) = V$ .
- (2) Nun sei  $A \in M(m, n; \mathbb{C})$ ,  $b \in M(m, 1, \mathbb{C})$ . Beweisen Sie: Das lineare Gleichungssystem  $Ax = b$  besitzt genau dann eine Lösung, wenn  $b$  zum Lösungsraum von  ${}^t\bar{A} \cdot x = b$  orthogonal ist.

**Aufgabe 6/3/180**

Normale Endomorphismen (2)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator, adjungierter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 [Spektralsatz für normale Operatoren](#)

Sind Summe bzw. Produkt normaler Endomorphismen eines unitären Vektorraumes wieder normal?

**Aufgabe 6/3/190**

Normale Endomorphismen (3)

**Index:** euklidischer Vektorraum, normaler Operator, adjungierter Endomorphismus**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

$P_n$  sei der euklidische Vektorraum der reellen Polynome vom Grad  $\leq n$  mit dem Skalarprodukt, das für

$$f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n, \quad g = b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n \in P_n$$

durch

$$\langle f, g \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + \dots + a_nb_n$$

definiert ist. Welche der folgenden Endomorphismen sind normal?

- (1)  $\varphi : P_n \rightarrow P_n$ , gegeben durch den Einsetzungshomomorphismus  $X \mapsto -X$  des Polynomringes  $\mathbb{R}[X]$ ,
- (2)  $\psi_a : P_n \rightarrow P_n$ , gegeben durch den Einsetzungshomomorphismus  $X \mapsto X + a$  des Polynomringes  $\mathbb{R}[X]$  ( $a \in \mathbb{R}$ ).

**Aufgabe 6/3/200**

Normale Endomorphismen (4)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator, adjungierter Endomorphismus, orthogonale Summe von Unterräumen**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

$V$  sei ein unitärer Vektorraum,  $\varphi$  ein normaler Endomorphismus von  $V$  und  $\varphi^*$  sein adjungierter Endomorphismus. Zeigen Sie:

- (1)  $\text{im}(\varphi) = \text{im}(\varphi^*)$  und  $\ker(\varphi) = \ker(\varphi^*)$ .
- (2)  $\ker(\varphi) \perp \text{im}(\varphi) = V$ .

**Aufgabe 6/3/210**

Normale Endomorphismen (5)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator, adjungierter Endomorphismus**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

$V$  sei ein unitärer Vektorraum,  $\varphi : V \rightarrow V$  ein normaler Endomorphismus. Zeigen Sie:

- (1)  $\langle \varphi(\mathbf{x}), \varphi(\mathbf{y}) \rangle = \langle \varphi^*(\mathbf{x}), \varphi^*(\mathbf{y}) \rangle$  für alle  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$ .
- (2)  $\|\varphi(\mathbf{x})\| = \|\varphi^*(\mathbf{x})\|$  für alle  $\mathbf{x} \in V$ .
- (3)  $\psi : V \rightarrow V$  sei ein weiterer normaler Endomorphismus von  $V$ , so gilt genau dann  $\varphi \cdot \psi = \mathbf{0}$ , wenn  $\psi \cdot \varphi = \mathbf{0}$ .

**Aufgabe 6/3/220**

Normale Endomorphismen (6)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator, adjungierter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

$V$  sei ein unitärer Vektorraum,  $\varphi : V \rightarrow V$  ein Endomorphismus und  $\varphi^*$  der adjungierte Endomorphismus. Zeigen Sie:

Ist  $\varphi$  ein normaler Operator, so sind die Eigenvektoren von  $\varphi$  auch Eigenvektoren von  $\varphi^*$ .

**Aufgabe 6/3/230**

Normale Endomorphismen (7)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator, Orthonormalbasis

**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

$V$  sei ein unitärer Vektorraum und  $\varphi, \psi$  normale Endomorphismen von  $V$ , für die  $\varphi \cdot \psi = \psi \cdot \varphi$  gilt.

Zeigen Sie, dass eine Orthonormalbasis von  $V$  existiert, deren Vektoren sowohl Eigenvektoren von  $\varphi$  als auch von  $\psi$  sind.

**Aufgabe 6/3/240**

Normale Endomorphismen (8)

**Index:** unitärer Vektorraum, normaler Operator, Orthonormalbasis, adjungierter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** 6/3/9 - 6/3/13 Spektralsatz für normale Operatoren

$V, W$  seien unitäre  $\mathbb{K}$ -Vektorräume und  $\mathcal{B}_V = (\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n) \in V^n$ ,  
 $\mathcal{B}_W = (\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_m) \in W^m$  Orthonormalbasen in  $V$  bzw.  $W$ .

- (1) Zeigen Sie, dass das Tensorprodukt  $V \otimes_{\mathbb{K}} W$  ebenfalls einen unitären Vektorraum  $(V \otimes W, \langle, \rangle)$  bildet, wenn die hermitesche Form  $\langle, \rangle$  bezüglich des Tensorprodukts  $\mathcal{B}_V \otimes \mathcal{B}_W$  der gegebenen Basen von  $V$  und  $W$  durch

$$\langle \mathbf{b}_i \otimes \mathbf{c}_j, \mathbf{b}_k \otimes \mathbf{c}_l \rangle = \delta_{ik} \cdot \delta_{jl}, \quad i, k \in \{1, \dots, n\}, \quad j, l \in \{1, \dots, m\}$$

definiert wird (damit ist die Matrix von  $\langle, \rangle$  bezüglich  $\mathcal{B}_V \otimes \mathcal{B}_W$  angegeben).

- (2) Zeigen Sie, dass der adjungierte Endomorphismus des Tensorprodukts  $\varphi \otimes_{\mathbb{K}} \psi$  zweier Endomorphismen  $\varphi : V \rightarrow V$ ,  $\psi : W \rightarrow W$  das Tensorprodukt der adjungierten Endomorphismen  $\varphi^*, \psi^*$  ist.
- (3) Zeigen Sie, dass das Tensorprodukt normaler Endomorphismen ebenfalls normal ist.

**Aufgabe 6/3/250**

(S: Varianten)

Quadriken (5), Ellipsoid

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ ,

$$f = 2X_1^2 + \sqrt{2}X_1X_2 + 2X_2^2 + \sqrt{2}X_2X_3 + 2X_3^2 - X_1 + X_2 - 2X_3 + \left(\frac{1}{4}\sqrt{2} - \frac{1}{48}\right)$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 4 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 4 \end{pmatrix}$$

sowie  $a_1 = -1$ ,  $a_2 = 1$ ,  $a_3 = -2$ ,  $a_0 = (\frac{1}{4}\sqrt{2} - \frac{1}{48})$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = X^3 - 6X^2 + 11X - 6$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 2$ ,  $\lambda_2 = 3$  und  $\lambda_3 = 1$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist von dem Vektor  $(-1, 0, 1)$  erzeugt; Fortsetzung dieses Verfahrens ergibt nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{(-\sqrt{2})}(-1, 0, 1),$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{2}(1, \sqrt{2}, 1),$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{2}(1, -\sqrt{2}, 1).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom, in

$$f = 2Y_1^2 + 3Y_2^2 + Y_3^2 + \frac{1}{2}\sqrt{2}Y_1 + (\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{3}{2})Y_2 - (\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{3}{2})Y_3 + (\frac{1}{4}\sqrt{2} - \frac{1}{48})$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tU A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$2 \cdot (Y_1 + \frac{1}{8}\sqrt{2})^2 + 3 \cdot (Y_2 + (\frac{1}{12}\sqrt{2} - \frac{1}{4}))^2 + 1 \cdot (Y_3 - (\frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{3}{4}))^2 - 1$$

überführt. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 - \frac{1}{8}\sqrt{2},$$

$$Y_2 = Z_2 - \left(\frac{1}{12}\sqrt{2} - \frac{1}{4}\right),$$

$$Y_3 = Z_3 + \left(\frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{3}{4}\right)$$

erhalten wir

$$f = 2Z_1^2 + 3Z_2^2 + Z_3^2 - 1;$$

dies ist die Hauptachsenform eines Ellipsoids.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$X_1 = \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_3 + \left(\frac{1}{12}\sqrt{2} + \frac{3}{8}\right),$$

$$X_2 = \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_2 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_3 - \left(\frac{1}{4}\sqrt{2} + \frac{1}{3}\right),$$

$$X_3 = -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_3 + \left(\frac{1}{12}\sqrt{2} + \frac{5}{8}\right).$$

**Aufgabe** 6/3/260

(S: Varianten)

Quadriken (6), Kegel

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ ,

$$f = X_1^2 + 3\sqrt{2}X_1X_2 - 2X_1X_3 + 3\sqrt{2}X_2X_3 + X_3^2 + 2X_2 - X_3 - \left(\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{16}\right)$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 3\sqrt{2} & -2 \\ 3\sqrt{2} & 0 & 3\sqrt{2} \\ -2 & 3\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix}$$

sowie  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 2$ ,  $a_3 = -1$ ,  $a_0 = -\left(\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{16}\right)$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = X^3 - 2X^2 - 9X + 18$  und erhalten die Eigenwerte

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$  und  $\lambda_3 = -3$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 2 & -3\sqrt{2} & 2 \\ -3\sqrt{2} & 4 & -3\sqrt{2} \\ 2 & -3\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(-1, 0, 1)$  erzeugt, und Fortsetzung des Verfahrens ergibt nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{(\sqrt{2})}(-1, 0, 1),$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{2}(1, \sqrt{2}, 1),$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{2}(1, -\sqrt{2}, 1).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & 1 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom in

$$f = 2Y_1^2 + 3Y_2^2 - 3Y_3^2 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Y_1 + (\sqrt{2} - \frac{1}{2})Y_2 - (\sqrt{2} + \frac{1}{2})Y_3 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{16})$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tU A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$2 \cdot (Y_1 - \frac{1}{8}\sqrt{2})^2 + 3 \cdot (Y_2 + (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{12}))^2 - 3 \cdot (Y_3 + (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{1}{12}))^2$$

überführt. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 + \frac{1}{8}\sqrt{2},$$

$$Y_2 = Z_2 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{12}),$$

$$Y_3 = Z_3 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{1}{12})$$

erhalten wir

$$f = 2Z_1^2 + 3Z_2^2 - 3Z_3^2;$$

dies ist die Hauptachsenform eines Kegels.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$X_1 = -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_3 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{1}{8}),$$

$$X_2 = \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_2 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_3 + \frac{1}{12}\sqrt{2},$$

$$X_3 = \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_3 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{8}).$$

**Aufgabe 6/3/270**

(S: Varianten)

Quadriken (7), einschaliges Hyperboloid

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für QuadrikenGeben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ ,

$$f = 2X_1^2 - \sqrt{2}X_1X_2 + \sqrt{2}X_1X_3 - 4X_2X_3 + 2X_1 - 3X_2 - 3X_3 - \frac{31}{12}$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & 0 & -4 \\ \sqrt{2} & -4 & 0 \end{pmatrix},$$

sowie  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = -3$ ,  $a_3 = -3$ ,  $a_0 = -\frac{31}{12}$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = X^3 - 2X^2 - 5X + 6$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = 3$  und  $\lambda_3 = -2$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -2 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 2 & 4 \\ -\sqrt{2} & 4 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(-\sqrt{2}, -1, 1)$  erzeugt, und Fortsetzung des Verfahrens ergibt nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{2}(-\sqrt{2}, -1, 1),$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{2}, -1, 1),$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{(-\sqrt{2})}(0, 1, 1).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & -1 & -\sqrt{2} \\ 1 & 1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom, in

$$f = Y_1^2 + 3Y_2^2 - 2Y_3^2 - \sqrt{2}Y_1 + \sqrt{2}Y_2 + 3\sqrt{2}Y_3 - \frac{31}{12}$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tU A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$1 \cdot (Y_1 - \frac{1}{2}\sqrt{2})^2 + 3 \cdot (Y_2 + \frac{1}{6}\sqrt{2})^2 - 2 \cdot (Y_3 - \frac{3}{4}\sqrt{2})^2 - 1$$

transformiert. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 + \frac{1}{2}\sqrt{2},$$

$$Y_2 = Z_2 - \frac{1}{6}\sqrt{2},$$

$$Y_3 = Z_3 + \frac{3}{4}\sqrt{2}$$

erhalten wir

$$f = Z_1^2 + 3Z_2^2 - 2Z_3^2 - 1;$$

dies ist die Hauptachsenform eines einschaligen Hyperboloids.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$X_1 = -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_2 - \frac{2}{3},$$

$$X_2 = -\frac{1}{2}Z_1 - \frac{1}{2}Z_2 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_3 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{3}{4}),$$

$$X_3 = \frac{1}{2}Z_1 + \frac{1}{2}Z_2 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_3 + (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{3}{4}).$$

### Aufgabe 6/3/280

(S: Varianten)

Quadriken (8), elliptisches Paraboloid

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ ,

$$f = \frac{19}{18}X_1^2 + \frac{17}{9}X_1X_2 + \frac{19}{18}X_2^2 + \frac{4}{9}X_1X_3 - \frac{4}{9}X_2X_3 + \frac{8}{9}X_3^2 - 2X_2 - X_3 + 1$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 19 & 17 & 4 \\ 17 & 19 & -4 \\ 4 & -4 & 16 \end{pmatrix},$$

sowie  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = -2$ ,  $a_3 = -1$ ,  $a_0 = 1$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = X^3 - 3X^2 + 2X$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 2$ ,  $\lambda_2 = 1$  und  $\lambda_3 = 0$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 17 & -17 & -4 \\ -17 & 17 & 4 \\ -4 & 4 & 20 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(1, 1, 0)$  erzeugt, und Fortsetzung des Verfahrens ergibt nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{(-\sqrt{2})}(1, 1, 0),$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{(3 \cdot \sqrt{2})}(1, -1, 4),$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{3}(2, -2, -1).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -3\sqrt{2} & \sqrt{2} & 4 \\ -3\sqrt{2} & -\sqrt{2} & -4 \\ 0 & 4\sqrt{2} & -2 \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom in

$$f = 2Y_1^2 + Y_2^2 + \sqrt{2}Y_1 - \frac{1}{3}\sqrt{2}Y_2 + \frac{5}{3}Y_3 + 1$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tUAU = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$2 \cdot \left(Y_1 + \frac{1}{4}\sqrt{2}\right)^2 + 1 \cdot \left(Y_2 - \frac{1}{6}\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{3}Y_3 + \frac{25}{36}\right)$$

transformiert. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 - \frac{1}{4}\sqrt{2}$$

$$Y_2 = Z_2 + \frac{1}{6}\sqrt{2}$$

$$Y_3 = -\frac{6}{5}Z_3 - \frac{5}{12}$$

erhalten wir

$$f = 2Z_1^2 + Z_2^2 - 2Z_3;$$

dies ist die Hauptachsenform für ein elliptisches Paraboloid.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$\begin{aligned} X_1 &= -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{6}\sqrt{2}Z_2 - \frac{4}{5}Z_3 + \frac{1}{36}, \\ X_2 &= -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 - \frac{1}{6}\sqrt{2}Z_2 + \frac{4}{5}Z_3 + \frac{17}{36}, \\ X_3 &= \frac{2}{3}\sqrt{2}Z_2 + \frac{2}{5}Z_3 + \frac{13}{36}. \end{aligned}$$

**Aufgabe** 6/3/290

(S: Varianten)

Quadriken (9), hyperbolisches Paraboloid

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ ,

$$f = \frac{13}{9}X_1^2 - \frac{4}{9}X_1X_2 - \frac{8}{9}X_2^2 + \frac{28}{9}X_1X_3 + \frac{4}{9}X_2X_3 + \frac{13}{9}X_3^2 + 2X_1 - 2X_3 - 1$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 13 & -2 & 14 \\ -2 & -8 & 2 \\ 14 & 2 & 13 \end{pmatrix},$$

sowie  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = 0$ ,  $a_3 = -2$ ,  $a_0 = -1$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = X^3 - 2X^2 - 3X$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 3$ ,  $\lambda_2 = -1$  und  $\lambda_3 = 0$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 14 & 2 & -14 \\ 2 & 35 & -2 \\ -14 & -2 & 14 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(1, 0, 1)$  erzeugt, und Fortsetzung des Verfahrens ergibt nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{(-\sqrt{2})}(1, 0, 1),$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{(-3 \cdot \sqrt{2})}(-1, -4, 1),$$

$$\mathbf{v}_3 = \frac{1}{3}(2, -1, -2).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} -3\sqrt{2} & \sqrt{2} & 4 \\ 0 & 4\sqrt{2} & -2 \\ -3\sqrt{2} & -\sqrt{2} & -4 \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom in

$$f = 3Y_1^2 - Y_2^2 + \frac{2}{3}\sqrt{2}Y_2 + \frac{8}{3}Y_3 - 1$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tU A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$3 \cdot (Y_1)^2 - 1 \cdot (Y_2 - \frac{1}{3}\sqrt{2})^2 + (\frac{8}{3}Y_3 - \frac{7}{9})$$

transformiert. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1$$

$$Y_2 = Z_2 + \frac{1}{3}\sqrt{2}$$

$$Y_3 = -\frac{3}{4}Z_3 + \frac{7}{24}$$

erhalten wir

$$f = 3Z_1^2 - Z_2^2 - 2Z_3;$$

dies ist die Hauptachsenform für ein hyperbolisches Paraboloid.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$X_1 = -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 + \frac{1}{6}\sqrt{2}Z_2 - \frac{1}{2}Z_3 + \frac{11}{36},$$

$$X_2 = \frac{2}{3}\sqrt{2}Z_2 + \frac{1}{4}Z_3 + \frac{25}{72},$$

$$X_3 = -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 - \frac{1}{6}\sqrt{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_3 - \frac{11}{36}.$$

### Aufgabe 6/3/300

(S: Varianten)

Quadriken (10), zweischaliges Hyperboloid

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3]$ ,

$$f = -X_1^2 - 2X_1X_2 - X_2^2 - \sqrt{2}X_1X_3 + \sqrt{2}X_2X_3 + 3X_2 - 2X_3 - \left(\frac{3}{2}\sqrt{2} + \frac{25}{16}\right)$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} + a_1 X_1 + a_2 X_2 + a_3 X_3 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -\sqrt{2} \\ -2 & -2 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix},$$

sowie  $a_1 = 0$ ,  $a_2 = 3$ ,  $a_3 = -2$ ,  $a_0 = -\left(\frac{3}{2}\sqrt{2} + \frac{25}{16}\right)$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_3 - A) = X^3 + 2X^2 - X - 2$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 1$ ,  $\lambda_2 = -2$  und  $\lambda_3 = -1$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & \sqrt{2} \\ 2 & 4 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(-1, 1, \sqrt{2})$  erzeugt, und Fortsetzung des Verfahrens ergibt nach Normierung eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^3$  mit

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \frac{1}{2}(-1, 1, \sqrt{2}), \\ \mathbf{v}_2 &= \frac{1}{(-\sqrt{2})}(1, 1, 0), \\ \mathbf{v}_3 &= \frac{1}{2}(-1, 1, -\sqrt{2}). \end{aligned}$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten durch die Vektoren  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 1 & -\sqrt{2} & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom in

$$f = Y_1^2 - 2Y_2^2 - Y_3^2 - \left(\sqrt{2} - \frac{3}{2}\right)Y_1 - \frac{3}{2}\sqrt{2}Y_2 + \left(\sqrt{2} + \frac{3}{2}\right)Y_3 - \left(\frac{3}{2}\sqrt{2} + \frac{25}{16}\right)$$

transformiert wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tU A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$1 \cdot (Y_1 - (\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{3}{4}))^2 - 2 \cdot (Y_2 + \frac{3}{8}\sqrt{2})^2 - 1 \cdot (Y_3 - (\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{3}{4}))^2 - 1$$

überführt. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 + (\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{3}{4}),$$

$$Y_2 = Z_2 - \frac{3}{8}\sqrt{2},$$

$$Y_3 = Z_3 + (\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{3}{4})$$

erhalten wir

$$f = Z_1^2 - 2Z_2^2 - Z_3^2 - 1;$$

dies ist die Hauptachsenform eines zweischaligen Hyperboloids.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$X_1 = -\frac{1}{2}Z_1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_2 - \frac{1}{2}Z_3 - (\frac{1}{2}\sqrt{2} - \frac{3}{8}),$$

$$X_2 = \frac{1}{2}Z_1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_3 + (\frac{1}{2}\sqrt{2} + \frac{3}{8}),$$

$$X_3 = \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 - \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_3 - \frac{3}{4}\sqrt{2}.$$

### Aufgabe 6/3/320

(S: Varianten)

Quadriken (12), Beispiele in der Dimension 4

**Index:** Quadrik, metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

**Stoffeinheiten:** 6/3/18 - 6/3/20 Metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken

Geben Sie für das quadratische Polynom  $f \in \mathbb{R}[X_1, X_2, X_3, X_4]$ ,

$$f = -3\sqrt{2}X_1X_2 + X_2^2 - X_3^2 - 3\sqrt{2}X_1X_4 - 2X_2X_4 + X_4^2 + 2X_1 - X_2 - 2X_3 + 2X_4 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{23}{16})$$

eine Bewegung des affinen euklidischen dreidimensionalen Raumes an, so dass nach der entsprechenden Koordinatentransformation und Multiplikation mit einer von Null verschiedenen Konstanten eine metrische Hauptachsenform entsteht. Bestimmen Sie  $f$  im neuen Koordinatensystem.

**Lösung.** Wir schreiben das Polynom  $f$  in der Form

$$f = (X_1 \ X_2 \ X_3 \ X_4) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4X_4 + a_0$$

mit der symmetrischen Matrix

$$A = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -3\sqrt{2} & 0 & -3\sqrt{2} \\ -3\sqrt{2} & 2 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ -3\sqrt{2} & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

sowie  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = -1$ ,  $a_3 = -2$ ,  $a_4 = 2$ ,  $a_0 = -(\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{23}{16})$ .

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $A$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu bestimmen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_A = \det(X \cdot E_4 - A) = X^4 - X^3 - 11X^2 + 9X + 18$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = -1$  und  $\lambda_4 = -3$  der Matrix  $A$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} 4 & 3\sqrt{2} & 0 & 3\sqrt{2} \\ 3\sqrt{2} & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 6 & 0 \\ 3\sqrt{2} & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(0, -1, 0, 1)$  erzeugt; durch Fortsetzung des Verfahrens ergibt sich nach Normierung leicht eine Basis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^4$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, -1, 0, 1),$$

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{2}(\sqrt{2}, -1, 0, -1),$$

$$\mathbf{v}_3 = (0, 0, 1, 0),$$

$$\mathbf{v}_4 = \frac{1}{2}(\sqrt{2}, 1, 0, 1).$$

Mit der Übergangsmatrix  $U$ , deren Spalten aus den Vektoren  $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$  und  $\mathbf{v}_4$  gebildet werden, erhalten wir die Transformation

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ Y_3 \\ Y_4 \end{pmatrix}, \quad U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ -\sqrt{2} & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ \sqrt{2} & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

durch die das gegebene Polynom in

$$f = 2Y_1^2 + 3Y_2^2 - Y_3^2 - 3Y_4^2 + \frac{3}{2}\sqrt{2}Y_1 + (\sqrt{2} - \frac{1}{2})Y_2 - 2Y_3 + (\sqrt{2} + \frac{1}{2})Y_4 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{23}{16})$$

überführt wird (natürlich ist die Substitution nur für den linearen Anteil explizit auszuführen, denn die quadratischen Terme entsprechen der Diagonalmatrix  ${}^tU A U = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$ ).

Durch quadratische Ergänzung wird  $f$  in die Form

$$2 \cdot (Y_1 + \frac{3}{8}\sqrt{2})^2 + 3 \cdot (Y_2 + (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{12}))^2 - 1 \cdot (Y_3 + 1)^2 - 3 \cdot (Y_4 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{1}{12}))^2 - 1$$

transformiert. Nach Verschiebung des Koordinatenursprungs mittels

$$Y_1 = Z_1 - \frac{3}{8}\sqrt{2},$$

$$Y_2 = Z_2 - (\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{1}{12}),$$

$$Y_3 = Z_3 - 1,$$

$$Y_4 = Z_4 + (\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{1}{12})$$

erhalten wir

$$f = 2Z_1^2 + 3Z_2^2 - Z_3^2 - 3Z_4^2 - 1;$$

dies ist die gesuchte Hauptachsenform.

Als zugehörige Koordinatentransformation entsteht durch schrittweises Einsetzen die Substitution

$$\begin{aligned} X_1 &= \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_2 + \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_4 + \frac{1}{12}\sqrt{2}, \\ X_2 &= -\frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 - \frac{1}{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_4 + \left(\frac{1}{6}\sqrt{2} + \frac{3}{8}\right), \\ X_3 &= Z_3 - 1, \\ X_4 &= \frac{1}{2}\sqrt{2}Z_1 - \frac{1}{2}Z_2 + \frac{1}{2}Z_4 + \left(\frac{1}{6}\sqrt{2} - \frac{3}{8}\right). \end{aligned}$$

**Aufgabe** 6/3/330

(S: Varianten)

Polare Zerlegung

**Index:** Polarzerlegung einer regulären Matrix, orthogonale Matrix, positiv definite symmetrische Matrix

**Stoffeinheiten:** 6/3/21 - 6/3/26 Polare Zerlegung eines Automorphismus

Finden Sie für die reguläre Matrix

$$A = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

die polare Zerlegung, d.h. bestimmen Sie symmetrische, positiv definite Matrizen  $H_1$ ,  $H_2$  sowie eine orthogonale Matrix  $M$ , für die  $A = M \cdot H_1 = H_2 \cdot M$  ist.

**Lösung.** Wir berechnen  $\sqrt{C}$  für

$$C = {}^t A \cdot A = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Zunächst wird eine orthogonale Koordinatentransformation ausgeführt, nach der  $C$  Diagonalgestalt hat (Spektralzerlegung). Dazu berechnen wir die Nullstellen des charakteristischen Polynoms  $\chi_C = \det(X \cdot E_2 - C) = X^2 - 5X + 4$  und erhalten die Eigenwerte  $\lambda_1 = 1$  und  $\lambda_2 = 4$  der Matrix  $C$ . Zur Bestimmung einer Basis aus Eigenvektoren lösen wir zunächst das lineare Gleichungssystem

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Der Lösungsraum ist offensichtlich von dem Vektor  $(-1, 1)$  erzeugt, und da der Eigenraum des anderen Eigenwertes orthogonal zu diesem ist, ergibt sich nach Normierung eine Orthonormalbasis  $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$  des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^2$  mit

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot (-1, 1), \quad \mathbf{v}_2 = -\frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot (1, 1).$$

Durch die Matrix

$$U^{-1} = {}^t U = -\frac{1}{2}\sqrt{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

deren Spalten aus den Vektoren  $\mathbf{v}_1$  und  $\mathbf{v}_2$  gebildet werden, erhalten wir mit  $D := \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2})$  offensichtlich  $D^2 = U \cdot C \cdot U^{-1}$ , d.h.  $C = U^{-1} \cdot D^2 \cdot U$ .

Damit ist

$$H_1 = \sqrt{C} = U^{-1} \cdot D \cdot U = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix};$$

die beiden anderen gesuchten Matrizen erhalten wir als

$$M = A \cdot H_1^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$H_2 = A \cdot M^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

### Aufgabe 6/4/010

Norm eines Endomorphismus (1)

**Index:** unitärer Vektorraum, Norm eines Endomorphismus, unitärer Automorphismus

**Stoffeinheiten:** [6/4/8 - 6/4/13 Norm eines Endomorphismus](#)

$\varphi$  sei ein Automorphismus des unitären Standardraumes  $\mathbb{K}^n$ .

- (1) Beweisen Sie: Ist  $\varphi$  unitär, so gilt  $\|\varphi\| = 1$ . Ist die Bedingung auch notwendig?
- (2) Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Norm von  $\varphi$  und den Eigenwerten von  $\sqrt{\varphi^* \cdot \varphi}$ ?

### Aufgabe 6/4/020

Norm eines Endomorphismus (2)

**Index:** unitärer Vektorraum, Norm eines Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** [6/4/8 - 6/4/13 Norm eines Endomorphismus](#)

$V$  bezeichne den unitären Standardraum  $\mathbb{K}^n$ . Zeigen Sie, dass die folgenden Eigenschaften für beliebige  $\varphi, \psi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$  und  $\alpha \in \mathbb{K}$  erfüllt sind.

- (1)  $\|\varphi\| \geq 0$ ; dabei besteht genau dann Gleichheit, wenn  $\varphi$  die Nullabbildung ist.
- (2)  $\|\alpha \cdot \varphi\| = |\alpha| \cdot \|\varphi\|$ .
- (3)  $\|\varphi + \psi\| \leq \|\varphi\| + \|\psi\|$ .

### Aufgabe 6/4/030

Norm eines Endomorphismus (3)

**Index:** unitärer Vektorraum, Norm eines Endomorphismus, adjungierter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** [6/4/8 - 6/4/13 Norm eines Endomorphismus](#)

$\varphi$  sei ein Endomorphismus des unitären Standardraumes  $\mathbb{K}^n$ . Beweisen Sie, dass  $\|\varphi^*\| = \|\varphi\|$  ist.

### Aufgabe 6/4/040

Exponential eines Endomorphismus, Eigenschaften

**Index:** Exponential eines Endomorphismus, orthogonaler Automorphismus, euklidischer Vektorraum, adjungierter Endomorphismus

**Stoffeinheiten:** [6/4/14 - 6/4/15 Das Exponential](#)

$\varphi$  sei ein Endomorphismus des euklidischen Standardraumes  $\mathbb{R}^n$ , für den  $\varphi^* = -\varphi$  ist.

- (1) Beweisen Sie, dass  $\exp(\varphi)$  orthogonal ist.
- (2) Zeigen Sie anhand eines Beispiels, dass nicht jede orthogonale Abbildung auf diese Weise gewonnen werden kann.

**Hinweis.** Zeigen Sie im Fall  $n = 2$ , dass unter der angegebenen Voraussetzung  $\det(\exp(\varphi)) = 1$  ist.

**Aufgabe** 6/4/050

(S: Varianten)

Beispiele 2-dimensionaler linearer dynamischer Systeme, Beschreibung der Orbits

**Index:** lineares dynamisches System, Exponential einer Matrix, Orbit eines Punktes im Phasenraum, singuläre Punkte eines dynamischen Systems

**Stoffeinheiten:** 6/4/16 - 6/4/21 [Homogene lineare Differenzialgleichungssysteme](#)

Wir betrachten das lineare dynamische System

$$\frac{dx}{dt} = A \cdot x$$

im Phasenraum  $\mathbb{R}^2$ , das durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Skizzieren Sie (ohne Maßstab und bis auf Äquivalenz) die Orbits des Systems. Geben Sie in Ihrer Skizze insbesondere die Lage der singulären Punkte (d.h. der einelementigen Orbits) an.

**Lösung.** Die Bahnkurve des Systems durch  $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  ist

$$\left\{ {}^t x(t) \mid t \in \mathbb{R} \right\} \quad \text{mit} \quad x(t) = \exp(tA) \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Wir haben daher das Exponential  $\exp(tA)$  zu bestimmen, das ganz allgemein mittels der komplexen jordanischen Normalform der Matrix  $A$  aufgefunden werden kann. Charakteristisches Polynom ist

$$\det(X \cdot E_2 - A) = X^2 - 16X + 39.$$


aus  $\mathbb{R}[X]$ . Es hat die einfachen Nullstellen 3 und 13. Daher ist die Matrix  $A$  diagonalisierbar. Sie kann durch eine Ähnlichkeitstransformation in die folgende Matrix

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 13 \end{pmatrix}$$

überführt werden; dies entspricht dem Übergang zu einem äquivalenten linearen dynamischen System. Für reelle einfache Eigenwerte erhalten wir

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{3t} & 0 \\ 0 & e^{13t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

als Orbit durch den Punkt  $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$  (vgl. auch 6/4/21 (1)). Daraus lassen sich die nachfolgend skizzierten Bahnkurven erkennen.



Es gibt genau einen singulären Orbit  $\{(0, 0)\}$ . Das vorliegende dynamische System ist ein instabiler Knoten.

### Aufgabe 6/4/060

(S: Varianten)

Lineare Differenzialgleichungen 3. Ordnung

**Index:** homogene lineare Differenzialgleichung n-ter Ordnung, Exponential einer Matrix, Fundamentalsystem einer homogenen linearen Differenzialgleichung n-ter Ordnung

**Stoffeinheiten:** 6/4/22 - 6/4/24 Lineare Differenzialgleichungen höherer Ordnung

Bestimmen Sie diejenige Lösung  $x(t)$  der homogenen linearen Differenzialgleichung

$$x''' + 9x'' + 27x' + 27x = 0,$$

für die  $x(0) = -5$ ,  $x'(0) = 14$  und  $x''(0) = -37$  ist.

**Lösung.** Das aus den Koeffizienten gebildete Polynom  $f = X^3 + 9X^2 + 27X + 27$  zerfällt in ein Produkt  $f = (X + 3)^3$  von Linearfaktoren. Die gegebene Differenzialgleichung besitzt daher nach 6/4/24 ein Fundamentalsystem

$$(f_1(t), f_2(t), f_3(t)) \text{ mit} \\ f_1(t) = e^{-3t}, f_2(t) = te^{-3t}, f_3(t) = t^2e^{-3t}.$$

Da jede Lösung auf eindeutige Weise Linearkombination

$$x(t) = c_1 \cdot f_1(t) + c_2 \cdot f_2(t) + c_3 \cdot f_3(t)$$

der Lösungen  $f_i(t)$  ist, sind nur die Zahlen  $c_i \in \mathbb{R}$  zu bestimmen, für die die Anfangsbedingung erfüllt ist. Durch Differenzieren erhalten wir

$$f_1'(t) = -3e^{-3t}, f_1''(t) = 9e^{-3t} \\ f_2'(t) = -3te^{-3t} + e^{-3t}, f_2''(t) = 9te^{-3t} - 6e^{-3t} \\ f_3'(t) = -3t^2e^{-3t} + 2te^{-3t}, f_3''(t) = 9t^2e^{-3t} - 12te^{-3t} + 2e^{-3t}.$$

Für die Ableitungen  $x^{(i)}(t)$  ergibt eine Substitution von  $t = 0$

$$x^{(i)}(0) = c_1 f_1^{(i)}(0) + c_2 f_2^{(i)}(0) + c_3 f_3^{(i)}(0), \quad i = 0, 1, 2.$$

Dies ist ein lineares Gleichungssystem

$$c_1 = -5, \quad -3c_1 + c_2 = 14, \quad 9c_1 - 6c_2 + 2c_3 = -37,$$

aus dem wir die Koeffizienten  $c_1 = -5$ ,  $c_2 = -1$ ,  $c_3 = 1$  ablesen.

Die gesuchte Lösung ist

$$x(t) = t^2e^{-3t} - te^{-3t} - 5e^{-3t}. \quad \square$$

# Sachverzeichnis

## A

### Abbildung

- Aufgabe 0/3/010: Potenzmenge und charakteristische Funktion, 34
- Aufgabe 0/3/070: Abbildungen, Wertetafeln, 35
- Aufgabe 0/3/080: Eigenschaften von Abbildungen (1), 35
- Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36
- Aufgabe 0/3/120: Mengenpotenzen (1), 37
- Aufgabe 0/3/130: Mengenpotenzen (2), 37

### Abstand von Unterräumen

- Aufgabe 6/2/060: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einer Geraden, 240
- Aufgabe 6/2/065: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (1), 240
- Aufgabe 6/2/070: Bestimmung verschiedener Abstände, 240
- Aufgabe 6/2/075: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (2), 241
- Aufgabe 6/2/076: (S) Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (3), 241

### Abtrennungsregel

- Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30

### abzählbare Menge

- Aufgabe 0/5/050: Abzählbare Mengen (1), 39
- Aufgabe 0/5/060: Abzählbare Mengen (2), 39

### Addition ganzer Zahlen

- Aufgabe 0/3/110: Natürliche Zahlen, 36

### adjungierte Matrix

- Aufgabe 4/2/120: (S) Die adjungierte Matrix (1), 148
- Aufgabe 4/2/130: Rechenregeln für Determinanten (3), 149
- Aufgabe 4/2/140: (S) Die adjungierte Matrix (2), 149

### adjungierter Endomorphismus

- Aufgabe 6/3/001: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (1), 251
- Aufgabe 6/3/002: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (2), 251
- Aufgabe 6/3/003: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (3), 251
- Aufgabe 6/3/004: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (4), 251
- Aufgabe 6/3/005: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (5), 252
- Aufgabe 6/3/006: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (6), 252
- Aufgabe 6/3/007: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (7), 252
- Aufgabe 6/3/008: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (8), invariante Unterräume, 252
- Aufgabe 6/3/009: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (9), invariante Unterräume, 252
- Aufgabe 6/3/043: (S) Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (10), 255
- Aufgabe 6/3/044: (S) Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (11), 256

- Aufgabe 6/3/045: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (12), invariante Unterräume, 258
- Aufgabe 6/3/046: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (13), adjungierter eines Projektionsoperators, 258
- Aufgabe 6/3/170: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (14), 263
- Aufgabe 6/3/180: Normale Endomorphismen (2), 263
- Aufgabe 6/3/190: Normale Endomorphismen (3), 264
- Aufgabe 6/3/200: Normale Endomorphismen (4), 264
- Aufgabe 6/3/210: Normale Endomorphismen (5), 264
- Aufgabe 6/3/220: Normale Endomorphismen (6), 264
- Aufgabe 6/3/240: Normale Endomorphismen (8), 265
- Aufgabe 6/4/030: Norm eines Endomorphismus (3), 278
- Aufgabe 6/4/040: Exponential eines Endomorphismus, Eigenschaften, 278

### Ähnlichkeit

- Aufgabe 5/3/060: Ähnlichkeit, Beispiel, 186
- Aufgabe 5/3/070: Nilpotente Endomorphismen (5), 187
- Aufgabe 5/3/080: Ein falsches Verfahren, 187

### äquivalente polynomiale Matrizen

- Aufgabe 5/4/150: Jordansche Normalform der transponierten Matrix, 201

### Äquivalenz polynomialer Matrizen

- Aufgabe 5/4/141: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4, 196
- Aufgabe 5/4/142: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4, 198
- Aufgabe 5/4/143: Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante, 200

### Äquivalenz von Aussagen

- Aufgabe 0/2/020: Äquivalenz von Aussagen (1), 30
- Aufgabe 0/2/090: Aussagenverbindungen (6), 32

### Äquivalenzrelation

- Aufgabe 0/3/040: Differenzgleichheit, 34
- Aufgabe 0/3/050: Operationen rationaler Zahlen, 35
- Aufgabe 1/1/330: Typ einer Permutation, 47

### äußere Potenz einer Matrix

- Aufgabe 4/5/020: (S) Äußere Potenz einer Matrix, 166

### äußere Potenz eines Vektorraumes

- Aufgabe 4/5/005: Eigenschaften des äußeren Produkts, 165
- Aufgabe 4/5/010: (S) Basen äußerer Potenzen, 165

### affin unabhängig

- Aufgabe 6/1/290: Affine Fortsetzung, 233

### affine Abbildung

- Aufgabe 6/1/020: Translationen, 219
- Aufgabe 6/1/170: Existenz affiner Abbildungen (1), 228
- Aufgabe 6/1/180: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen in der Charakteristik 3, 228

- Aufgabe 6/1/190: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 4), 229
- Aufgabe 6/1/200: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (1), 229
- Aufgabe 6/1/210: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (2), 230
- Aufgabe 6/1/220: Projektionen, 230
- Aufgabe 6/1/230: Komplexe Konjugation als Kollineation, 231
- Aufgabe 6/1/240: Existenz affiner Abbildungen (2), 231
- Aufgabe 6/1/250: Affine Basen und Koordinaten, 231
- Aufgabe 6/1/270: Existenz von Fixpunkten (1), 232
- Aufgabe 6/1/280: Existenz von Fixpunkten (2), 232
- Aufgabe 6/1/290: Affine Fortsetzung, 233
- Aufgabe 6/1/300: Strahlensatz und Teilverhältnis, 233
- Aufgabe 6/1/310: Eine exakte Folge von Gruppen, 233
- affine Basis
  - Aufgabe 6/1/040: (S) Affine Basen für Unterräume (1), 220
  - Aufgabe 6/1/045: (S) Affine Basen für Unterräume (2), 221
  - Aufgabe 6/1/250: Affine Basen und Koordinaten, 231
  - Aufgabe 6/1/290: Affine Fortsetzung, 233
  - Aufgabe 6/1/320: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 0), 234
  - Aufgabe 6/1/330: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 3), 234
  - Aufgabe 6/1/340: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 2), 235
- affine Fortsetzung
  - Aufgabe 6/1/290: Affine Fortsetzung, 233
- affine Koordinaten
  - Aufgabe 6/1/220: Projektionen, 230
  - Aufgabe 6/1/320: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 0), 234
  - Aufgabe 6/1/330: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 3), 234
  - Aufgabe 6/1/340: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 2), 235
- affine Transformation
  - Aufgabe 6/1/260: (S) Affine Formen von Quadriken, 232
- affiner Raum
  - Aufgabe 6/1/010: (S) Gleichungen für Unterräume, 219
  - Aufgabe 6/1/020: Translationen, 219
  - Aufgabe 6/1/030: (S) Parameterdarstellung für Unterräume, 220
  - Aufgabe 6/1/040: (S) Affine Basen für Unterräume (1), 220
  - Aufgabe 6/1/045: (S) Affine Basen für Unterräume (2), 221
  - Aufgabe 6/1/050: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 2), 222
  - Aufgabe 6/1/060: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 0), 223
  - Aufgabe 6/1/070: (S) Parallelität (Charakteristik 2), 224
  - Aufgabe 6/1/080: (S) Parallelität (Charakteristik 0), 225
  - Aufgabe 6/1/090: Parallelität, 225
  - Aufgabe 6/1/090: Parallelität, 225
  - Aufgabe 6/1/100: Satz von Pappus-Pascal, 226
  - Aufgabe 6/1/110: Eigenschaften affiner Unterräume, 226
  - Aufgabe 6/1/120: Lage von Geraden im Raum, 226
  - Aufgabe 6/1/130: Anzahl affiner Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{F}_2^3$ , 226
  - Aufgabe 6/1/140: Gleichungssystem für eine Gerade, 227
  - Aufgabe 6/1/150: Gleichungssysteme für Unterräume, 227
  - Aufgabe 6/1/160: (S) Hyperebenen und Determinanten, 227
  - Aufgabe 6/1/170: Existenz affiner Abbildungen (1), 228
  - Aufgabe 6/1/180: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen in der Charakteristik 3, 228
  - Aufgabe 6/1/190: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 4), 229
  - Aufgabe 6/1/200: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (1), 229
  - Aufgabe 6/1/210: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (2), 230
  - Aufgabe 6/1/220: Projektionen, 230
  - Aufgabe 6/1/230: Komplexe Konjugation als Kollineation, 231
  - Aufgabe 6/1/240: Existenz affiner Abbildungen (2), 231
  - Aufgabe 6/1/250: Affine Basen und Koordinaten, 231
  - Aufgabe 6/1/260: (S) Affine Formen von Quadriken, 232
  - Aufgabe 6/1/270: Existenz von Fixpunkten (1), 232
  - Aufgabe 6/1/280: Existenz von Fixpunkten (2), 232
  - Aufgabe 6/1/290: Affine Fortsetzung, 233
  - Aufgabe 6/1/300: Strahlensatz und Teilverhältnis, 233
  - Aufgabe 6/1/310: Eine exakte Folge von Gruppen, 233
  - Aufgabe 6/1/320: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 0), 234
  - Aufgabe 6/1/330: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 3), 234
  - Aufgabe 6/1/340: (S) Affine Koordinaten (Charakteristik 2), 235
  - Aufgabe 6/1/350: Charakterisierung von Hyperebenen, 236
- affiner Unterraum
  - Aufgabe 6/1/010: (S) Gleichungen für Unterräume, 219
  - Aufgabe 6/1/030: (S) Parameterdarstellung für Unterräume, 220
  - Aufgabe 6/1/040: (S) Affine Basen für Unterräume (1), 220
  - Aufgabe 6/1/045: (S) Affine Basen für Unterräume (2), 221
  - Aufgabe 6/1/050: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 2), 222
  - Aufgabe 6/1/060: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 0), 223
  - Aufgabe 6/1/070: (S) Parallelität (Charakteristik 2), 224
  - Aufgabe 6/1/080: (S) Parallelität (Charakteristik 0), 225
  - Aufgabe 6/1/090: Parallelität, 225
  - Aufgabe 6/1/100: Satz von Pappus-Pascal, 226

- Aufgabe 6/1/110: Eigenschaften affiner Unterräume, 226
- Aufgabe 6/1/120: Lage von Geraden im Raum, 226
- Aufgabe 6/1/130: Anzahl affiner Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{F}_2^3$ , 226
- Aufgabe 6/1/140: Gleichungssystem für eine Gerade, 227
- Aufgabe 6/1/150: Gleichungssysteme für Unterräume, 227
- Aufgabe 6/1/160: (S) Hyperebenen und Determinanten, 227
- Aufgabe 6/1/190: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 4), 229
- Aufgabe 6/1/200: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (1), 229
- Aufgabe 6/1/210: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (2), 230
- Aufgabe 6/1/220: Projektionen, 230
- Aufgabe 6/1/230: Komplexe Konjugation als Kollineation, 231
- Aufgabe 6/1/350: Charakterisierung von Hyperebenen, 236
- affines Erzeugendensystem
  - Aufgabe 6/1/030: (S) Parameterdarstellung für Unterräume, 220
  - Aufgabe 6/1/040: (S) Affine Basen für Unterräume (1), 220
  - Aufgabe 6/1/045: (S) Affine Basen für Unterräume (2), 221
- alternierende Bilinearform
  - Aufgabe 4/3/130: (S) Bestimmung symplektischer Basen, 162
- Anfangsschritt
  - Aufgabe 0/2/100: Binomialkoeffizienten, 32
  - Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33
  - Aufgabe 0/2/120: Vollständige Induktion (1), 33
  - Aufgabe 0/2/130: Vollständige Induktion (2), 33
- Austauschverfahren
  - Aufgabe 3/3/150: (S) Austauschverfahren, 124
- Auswahlaxiom
  - Aufgabe 0/4/010: Abbildungen, kartesisches Produkt, 37
- Automorphismus
  - Aufgabe 4/2/050: (S) Determinanten mit Parametern (2), 145
- B**
  - Basis einer äußeren Potenz von Vektorräumen
    - Aufgabe 4/5/010: (S) Basen äußerer Potenzen, 165
  - Basis eines Tensorprodukts
    - Aufgabe 4/4/010: (S) Rechnen mit Basen von Tensorprodukten, 162
    - Aufgabe 4/4/020: Eigenschaften des Tensorprodukts (1), 163
    - Aufgabe 4/4/030: Eigenschaften des Tensorprodukts (2), 163
    - Aufgabe 4/4/040: Eigenschaften des Tensorprodukts (3), 163
    - Aufgabe 4/4/070: (S) Das Kroneckerprodukt (2), 164
  - Basis eines Vektorraumes
    - Aufgabe 3/3/090: (S) Basen und Koordinaten (1), 122
    - Aufgabe 3/3/100: (S) Basen und Koordinaten (2), 122
    - Aufgabe 3/3/110: (S) Rechenbeispiele zur Basisauswahl, 123
    - Aufgabe 3/3/120: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (1), 123
    - Aufgabe 3/3/130: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (2), 123
    - Aufgabe 3/3/150: (S) Austauschverfahren, 124
    - Aufgabe 3/3/160: (S) Basen von Komplementäräumen, 125
    - Aufgabe 3/3/170: Eine Eigenschaft von Basen, 126
    - Aufgabe 3/3/190: (S) Basen in Faktorräumen, 127
    - Aufgabe 3/3/230: Ein Gruppenisomorphismus\*, 130
    - Aufgabe 3/3/250: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (1), 132
    - Aufgabe 3/3/260: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (2), 132
    - Aufgabe 3/3/270: (S) Bild und Kern eines Endomorphismus, 133
    - Aufgabe 3/4/010: (S) Koordinaten und Übergangsmatrizen, 133
    - Aufgabe 3/4/020: Matrix der Transposition, 134
    - Aufgabe 3/5/010: (S) Duale Basen (1), 135
    - Aufgabe 3/5/020: (S) Duale Basen (2), 136
    - Aufgabe 3/5/030: Linearformen und Unterräume, 136
    - Aufgabe 3/5/050: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (1), 138
    - Aufgabe 3/5/051: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (2), 139
  - Basisergänzungssatz
    - Aufgabe 3/3/140: (S) Basisergänzung im  $\mathbb{R}^5$ , 124
    - Aufgabe 3/3/260: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (2), 132
  - Basiswechsel für Bilinearformen
    - Aufgabe 4/3/030: (S) Bilinearformen und Basiswechsel, 156
  - Basiswechsel für lineare Abbildungen
    - Aufgabe 3/4/030: (S) Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel, 134
    - Aufgabe 3/4/040: (S) Matrix eines Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , Basiswechsel, 135
    - Aufgabe 3/4/050: (S) Matrix eines Endomorphismus eines Unterraumes von  $\mathbb{R}[X]$ , Basiswechsel, 135
  - Begleitmatrix
    - Aufgabe 5/1/010: (S) Charakteristische Polynome reeller Matrizen, 167
    - Aufgabe 5/5/012: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (2), 209
    - Aufgabe 5/5/015: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (3), 210
    - Aufgabe 5/5/020: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (1), 210
    - Aufgabe 5/5/022: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (2), 211
    - Aufgabe 5/5/025: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (3), 212
    - Aufgabe 5/5/030: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (1), 212
    - Aufgabe 5/5/032: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (2), 213
    - Aufgabe 5/5/035: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (3), 214
    - Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
    - Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216

- Bewegung eines euklidischen affinen Raumes
- Aufgabe 6/3/140: (S) Ebene Quadriken (3), 261
- Beweisprinzipien
- Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30
- Bifunktionalität des Tensorprodukts
- Aufgabe 4/4/040: Eigenschaften des Tensorprodukts (3), 163
- bijektive Abbildung
- Aufgabe 0/3/010: Potenzmenge und charakteristische Funktion, 34
  - Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36
- Bild einer Abbildung
- Aufgabe 0/3/120: Mengenpotenzen (1), 37
  - Aufgabe 0/3/130: Mengenpotenzen (2), 37
- Bild und Kern einer linearen Abbildung
- Aufgabe 3/1/070: Beispiele für Homomorphismen (2), 113
  - Aufgabe 3/2/050: Schnitt eines Homomorphismus, 117
  - Aufgabe 3/2/060:  $\text{Hom}(V, W)$  als Vektorraum, 117
  - Aufgabe 3/3/200: (S) Dimension von Bild und Kern einer linearen Abbildung, 127
  - Aufgabe 3/3/202: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 2, 128
  - Aufgabe 3/3/203: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 3, 128
  - Aufgabe 3/3/205: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 5, 129
  - Aufgabe 3/3/210: Dimensionen der Vektorräume in exakten Folgen, 129
  - Aufgabe 3/3/250: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (1), 132
  - Aufgabe 3/3/260: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (2), 132
  - Aufgabe 3/3/270: (S) Bild und Kern eines Endomorphismus, 133
- Bilinearform
- Aufgabe 4/3/010: (S) Beispiele für Bilinearformen (1), 155
  - Aufgabe 4/3/020: Beispiele für Bilinearformen (2), 156
  - Aufgabe 4/3/030: (S) Bilinearformen und Basiswechsel, 156
- C**
- Charakteristik eines Körpers
- Aufgabe 1/2/330: Endliche Körper, Gegenbeispiel, 59
  - Aufgabe 1/2/340: Der Frobenius-Homomorphismus, 59
  - Aufgabe 1/2/350: Der kleine fermatsche Satz, 60
  - Aufgabe 2/2/080: (S) Lineare Gleichungssysteme in der Charakteristik 0,3,5, 79
  - Aufgabe 3/3/220: Anzahl der Elemente eines endlichen Körpers, 130
- charakteristische Matrix
- Aufgabe 5/4/141: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4, 196
  - Aufgabe 5/4/142: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4, 198
  - Aufgabe 5/4/143: Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante, 200
  - Aufgabe 5/4/150: Jordansche Normalform der transponierten Matrix, 201
- charakteristisches Polynom einer Matrix
- Aufgabe 5/1/005: (S) Eigenwerte einer reellen Matrix, 167
  - Aufgabe 5/1/010: (S) Charakteristische Polynome reeller Matrizen, 167
  - Aufgabe 5/1/020: Eigenwerte einer Matrix über dem Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ , 168
  - Aufgabe 5/1/030: Eigenwerte einer komplexen Matrix, 168
  - Aufgabe 5/1/040: Reelle und komplexe Eigenwerte einer reellen Matrix, 169
  - Aufgabe 5/1/050: Eigenwerte und Eigenräume von Matrizen, 169
  - Aufgabe 5/1/120: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (1), 170
  - Aufgabe 5/2/010: (S) Diagonalisierbarkeit einer Matrix über den reellen Zahlen, 171
  - Aufgabe 5/2/024: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (1), 172
  - Aufgabe 5/2/025: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (2), 173
  - Aufgabe 5/2/026: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, reelle Eigenwerte, 174
  - Aufgabe 5/2/027: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, komplexe Eigenwerte, 175
  - Aufgabe 5/2/028: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (3), 176
  - Aufgabe 5/2/030: Diagonalisierbarkeit, 177
  - Aufgabe 5/2/040: Diagonalisierbarkeit, Eigenschaften, 178
  - Aufgabe 5/2/050: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (1), 178
  - Aufgabe 5/2/060: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (2), 178
  - Aufgabe 5/2/070: Diagonalisierbarkeit einer Drehmatrix, 178
  - Aufgabe 5/2/080: Diagonalisierbarkeit in Abhängigkeit von einem Parameter, 179
  - Aufgabe 5/2/090: Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit einer Dreiecksmatrix, 179
  - Aufgabe 5/2/100: Diagonalisierbarkeit der Ableitung, 179
  - Aufgabe 5/2/120: Charakteristisches Polynom und Minimalpolynom, 180
  - Aufgabe 5/2/160: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (2), 181
  - Aufgabe 5/2/180: (S) Halbeinfachheit (1) (Grundkörper  $\mathbb{Q}$ ), 182
  - Aufgabe 5/2/190: (S) Halbeinfachheit (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ ), 183
  - Aufgabe 5/2/200: (S) Halbeinfachheit (3) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 184
  - Aufgabe 5/4/070: Typen jordanscher Normalformen (2), 192
  - Aufgabe 5/4/080: Typen jordanscher Normalformen (3), 192
- charakteristisches Polynom einer quadratischen Matrix
- Aufgabe 5/4/170: Einige Eigenschaften des Minimalpolynoms und des charakteristischen Polynoms einer Matrix, 201
- charakteristisches Polynom eines Endomorphismus
- Aufgabe 5/2/110: Endomorphismen und charakteristische Polynome, 179
- Code
- Aufgabe 3/2/040: (S) Lineare Codes, Decodierung (1), 115

- Aufgabe 3/2/041: (S) Lineare Codes, Decodierung (2), 116
- Aufgabe 3/3/030: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (1), 119
- Aufgabe 3/3/031: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2), 119
- Aufgabe 3/3/032: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3), 120
- cramersche Regel
  - Aufgabe 4/2/150: (S) Cramersche Regel, 150
- D**
- Definitionsbereich einer Abbildung
  - Aufgabe 0/3/120: Mengenpotenzen (1), 37
  - Aufgabe 0/3/130: Mengenpotenzen (2), 37
- Determinante einer Matrix
  - Aufgabe 4/2/009: (S) Erste Schritte mit Determinanten, 140
  - Aufgabe 4/2/010: Rechenregeln für Determinanten (1), 141
  - Aufgabe 4/2/025: Rechenregeln für Determinanten (2), 141
  - Aufgabe 4/2/030: (S) Bestimmung von Determinanten (1), 141
  - Aufgabe 4/2/032: (S) Bestimmung von Determinanten (2), 142
  - Aufgabe 4/2/034: (S) Bestimmung von Determinanten (3), 144
  - Aufgabe 4/2/040: (S) Determinanten mit Parametern (1), 144
  - Aufgabe 4/2/090: Determinanten und Kettenbrüche, 146
  - Aufgabe 4/2/100: (S) Determinanten mit Parametern (3), 146
  - Aufgabe 4/2/110: (S) Kofaktoren von Determinanten, 147
  - Aufgabe 4/2/120: (S) Die adjungierte Matrix (1), 148
  - Aufgabe 4/2/130: Rechenregeln für Determinanten (3), 149
  - Aufgabe 4/2/140: (S) Die adjungierte Matrix (2), 149
  - Aufgabe 4/2/150: (S) Cramersche Regel, 150
  - Aufgabe 4/2/200: (S) Komplexität der Bestimmung von Determinanten, 153
  - Aufgabe 4/3/020: Beispiele für Bilinearformen (2), 156
- Determinante eines Endomorphismus
  - Aufgabe 4/2/050: (S) Determinanten mit Parametern (2), 145
  - Aufgabe 4/2/180: (S) Endomorphismen und Determinanten (1), 151
  - Aufgabe 4/2/190: (S) Endomorphismen und Determinanten (2), 152
- Determinantenkriterium
  - Aufgabe 4/3/070: (S) Rechenaufgaben zur positiven Definitheit, 159
- Determinantenkriterium für positive Definitheit
  - Aufgabe 4/3/120: Quadratische Form eines Graphen\*, 161
- Determinantenteiler einer Matrix
  - Aufgabe 5/4/140: (S) Smithsche Normalform, 195
  - Aufgabe 5/4/141: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4, 196
  - Aufgabe 5/4/142: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4, 198
  - Aufgabe 5/4/143: Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante, 200
- diagonalisierbare Matrix
  - Aufgabe 5/2/010: (S) Diagonalisierbarkeit einer Matrix über den reellen Zahlen, 171
  - Aufgabe 5/2/024: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (1), 172
  - Aufgabe 5/2/025: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (2), 173
  - Aufgabe 5/2/026: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, reelle Eigenwerte, 174
  - Aufgabe 5/2/027: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, komplexe Eigenwerte, 175
  - Aufgabe 5/2/028: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (3), 176
  - Aufgabe 5/2/030: Diagonalisierbarkeit, 177
  - Aufgabe 5/2/040: Diagonalisierbarkeit, Eigenschaften, 178
  - Aufgabe 5/2/050: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (1), 178
  - Aufgabe 5/2/060: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (2), 178
  - Aufgabe 5/2/070: Diagonalisierbarkeit einer Drehmatrix, 178
  - Aufgabe 5/2/080: Diagonalisierbarkeit in Abhängigkeit von einem Parameter, 179
  - Aufgabe 5/2/090: Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit einer Dreiecksmatrix, 179
  - Aufgabe 5/2/100: Diagonalisierbarkeit der Ableitung, 179
  - Aufgabe 5/2/150: Diagonalisierbarkeit von  $f(A)$  für  $f \in K[X]$ , 180
  - Aufgabe 5/2/160: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (2), 181
  - Aufgabe 5/2/180: (S) Halbeinfachheit (1) (Grundkörper  $\mathbb{Q}$ ), 182
  - Aufgabe 5/2/190: (S) Halbeinfachheit (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ ), 183
  - Aufgabe 5/2/200: (S) Halbeinfachheit (3) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 184
- diagonalisierbarer Endomorphismus
  - Aufgabe 5/2/100: Diagonalisierbarkeit der Ableitung, 179
  - Aufgabe 5/2/140: Zerlegung eines Endomorphismus in eine Summe diagonalisierbarer Endomorphismen, 180
- Diagonalisierung
  - Aufgabe 4/3/050: (S) Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form, 158
  - Aufgabe 4/3/060: (S) Diagonalisierung einer quadratischen Form, 159
- Diagonalisierung einer symmetrischen Matrix
  - Aufgabe 6/3/010: (S) Spektralzerlegung (1), 253
  - Aufgabe 6/3/020: Spektralzerlegung (2), 254
  - Aufgabe 6/3/030: Spektralzerlegung (3), 255
  - Aufgabe 6/3/040: Spektralzerlegung (4), 255
  - Aufgabe 6/3/110: Spektralzerlegung (5), 261
- Diagonalmatrix
  - Aufgabe 2/3/170: Bestimmung der Inversen spezieller invertierbarer Matrizen, 94
- Diedergruppe
  - Aufgabe 1/1/160: Diedergruppe, 42
- Differenz von Mengen
  - Aufgabe 0/1/010: Mengenoperationen (1), 25
  - Aufgabe 0/1/020: Mengenoperationen (2), Komplementärmengen, 25

## Differenzgleichheit

- Aufgabe 0/3/040: Differenzgleichheit, 34

## Dimension

- Aufgabe 3/3/220: Anzahl der Elemente eines endlichen Körpers, 130

## Dimension eines affinen Raumes

- Aufgabe 6/1/110: Eigenschaften affiner Unterräume, 226
- Aufgabe 6/1/190: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 4), 229
- Aufgabe 6/1/200: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (1), 229
- Aufgabe 6/1/210: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (2), 230

## Dimension eines Tensorprodukts

- Aufgabe 4/4/020: Eigenschaften des Tensorprodukts (1), 163
- Aufgabe 4/4/030: Eigenschaften des Tensorprodukts (2), 163
- Aufgabe 4/4/040: Eigenschaften des Tensorprodukts (3), 163

## Dimension eines Vektorraumes

- Aufgabe 3/3/170: Eine Eigenschaft von Basen, 126
- Aufgabe 3/3/200: (S) Dimension von Bild und Kern einer linearen Abbildung, 127
- Aufgabe 3/3/202: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 2, 128
- Aufgabe 3/3/203: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 3, 128
- Aufgabe 3/3/205: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 5, 129
- Aufgabe 3/3/210: Dimensionen der Vektorräume in exakten Folgen, 129
- Aufgabe 3/5/051: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (2), 139

## direkte Summe von Unterräumen

- Aufgabe 3/2/010: Innere direkte Summen (1), 114
- Aufgabe 3/2/020: Innere direkte Summen (2), 114

## direkte Summe von Vektorräumen

- Aufgabe 3/2/070: Exakte Folgen zerfallen, 117

## direktes Produkt von Gruppen

- Aufgabe 1/1/060: Direktes Produkt von Gruppen, 41

## direktes Produkt von Monoiden

- Aufgabe 1/1/060: Direktes Produkt von Gruppen, 41

## Division mit Rest

- Aufgabe 1/2/080: Ganze gaußsche Zahlen, Division mit Rest, 53
- Aufgabe 1/2/280: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2), 58
- Aufgabe 2/4/005: (S) Division mit Rest für Polynome (1), 98
- Aufgabe 2/4/006: (S) Division mit Rest, ausführliche Darstellung (2), 98
- Aufgabe 2/4/007: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (1), 99
- Aufgabe 2/4/010: (S) Division mit Rest für Polynome (3), 100
- Aufgabe 2/4/020: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (2), 101
- Aufgabe 2/4/030: (S) Der größte gemeinsame Teiler in Abhängigkeit von Parametern, 101
- Aufgabe 2/4/040: (S) Nullstellenbestimmung mit Hilfe des euklidischen Algorithmus, 102
- Aufgabe 2/4/050: (S) Nullstellen rationaler Polynome, 102

- Aufgabe 2/4/070: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 103

## Drehung

- Aufgabe 6/3/060: Spiegelungen und Drehungen, 259
- Aufgabe 6/3/070: Orthogonale Abbildungen (1), 259
- Aufgabe 6/3/080: Orthogonale Abbildungen (2), 259

## Drehwinkel

- Aufgabe 6/3/080: Orthogonale Abbildungen (2), 259

## Dreiecksmatrix

- Aufgabe 2/3/240: (S) Gauß-Bruhat-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$ , 97
- Aufgabe 2/3/250: (S) LR-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$ , 97

## duale Basis

- Aufgabe 3/5/020: (S) Duale Basen (2), 136
- Aufgabe 3/5/030: Linearformen und Unterräume, 136

## dualer Vektorraum

- Aufgabe 3/5/010: (S) Duale Basen (1), 135
- Aufgabe 3/5/020: (S) Duale Basen (2), 136
- Aufgabe 3/5/030: Linearformen und Unterräume, 136
- Aufgabe 3/5/060: Ein Vektorraum, der nicht zu seinem dualen isomorph ist, 139

## Durchschnitt eines Mengensystems

- Aufgabe 0/1/030: Mengenoperationen (3), 25
- Aufgabe 0/1/040: Durchschnitt eines Mengensystems, 26

## Durchschnitt zweier Mengen

- Aufgabe 0/1/010: Mengenoperationen (1), 25
- Aufgabe 0/1/020: Mengenoperationen (2), Komplementärmengen, 25
- Aufgabe 0/1/050: Mengenoperationen, kartesisches Produkt, 26
- Aufgabe 0/1/070: Potenzmengen und Mengenoperationen, 26

**E**

## Ebene

- Aufgabe 6/1/010: (S) Gleichungen für Unterräume, 219

## Eigenschaften von Abbildungen

- Aufgabe 0/3/080: Eigenschaften von Abbildungen (1), 35
- Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36

## Eigenschaften von Relationen

- Aufgabe 0/3/020: Relationen, Beispiele (1), 34
- Aufgabe 0/3/030: Relationen, Beispiele (2), 34

## Eigenvektor einer Matrix

- Aufgabe 5/2/180: (S) Halbeinfachheit (1) (Grundkörper  $\mathbb{Q}$ ), 182
- Aufgabe 5/2/190: (S) Halbeinfachheit (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ ), 183
- Aufgabe 5/2/200: (S) Halbeinfachheit (3) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 184

## Eigenvektor einer Matrix

- Aufgabe 5/1/050: Eigenwerte und Eigenräume von Matrizen, 169
- Aufgabe 5/1/060: Eigenwerte symmetrischer Matrizen, 169
- Aufgabe 5/1/070: Eigenwerte von Quadraten, 169
- Aufgabe 5/1/080: Eigenwerte, Eigenschaften, 170
- Aufgabe 5/1/090: Potenzen von Eigenwerten, 170
- Aufgabe 5/1/100: Eigenwerte von Dreiecksmatrizen, 170

- Aufgabe 5/1/110: Eigenwerte und Regularität, 170
- Aufgabe 5/1/120: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (1), 170
- Aufgabe 5/1/130: Gemeinsame Basen aus Eigenvektoren, 171
- Aufgabe 5/2/010: (S) Diagonalisierbarkeit einer Matrix über den reellen Zahlen, 171
- Aufgabe 5/2/024: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (1), 172
- Aufgabe 5/2/025: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (2), 173
- Aufgabe 5/2/026: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, reelle Eigenwerte, 174
- Aufgabe 5/2/027: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, komplexe Eigenwerte, 175
- Aufgabe 5/2/028: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (3), 176
- Aufgabe 5/2/030: Diagonalisierbarkeit, 177
- Aufgabe 5/2/040: Diagonalisierbarkeit, Eigenschaften, 178
- Aufgabe 5/2/050: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (1), 178
- Aufgabe 5/2/060: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (2), 178
- Aufgabe 5/2/070: Diagonalisierbarkeit einer Drehmatrix, 178
- Aufgabe 5/2/080: Diagonalisierbarkeit in Abhängigkeit von einem Parameter, 179
- Aufgabe 5/2/090: Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit einer Dreiecksmatrix, 179
- Aufgabe 5/2/100: Diagonalisierbarkeit der Ableitung, 179
- Aufgabe 5/2/150: Diagonalisierbarkeit von  $f(A)$  für  $f \in K[X]$ , 180
- Aufgabe 5/2/160: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (2), 181
- Aufgabe 6/3/010: (S) Spektralzerlegung (1), 253
- Aufgabe 6/3/020: Spektralzerlegung (2), 254
- Aufgabe 6/3/030: Spektralzerlegung (3), 255
- Aufgabe 6/3/040: Spektralzerlegung (4), 255
- Eigenvektor eines Endomorphismus
  - Aufgabe 5/2/130: Simultane Eigenwerte, 180
  - Aufgabe 5/2/140: Zerlegung eines Endomorphismus in eine Summe diagonalisierbarer Endomorphismen, 180
- Eigenvektoren einer Matrix
  - Aufgabe 5/4/010: Jordansche Normalform (1) (Grundkörper  $\mathbb{R}$ ), 187
  - Aufgabe 5/4/020: Jordansche Normalform (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 188
  - Aufgabe 5/4/030: Jordansche Normalform (3) (Grundkörper  $\mathbb{C}$ ), 188
  - Aufgabe 5/4/035: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 188
  - Aufgabe 5/4/040: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 190
  - Aufgabe 5/4/050: Jordansche Normalform (4), mit Parametern, 191
- Eigenvektoren eines Endomorphismus
  - Aufgabe 5/4/100: Jordansche Normalform eines Endomorphismus, 192
  - Aufgabe 5/4/110: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (1), 193
  - Aufgabe 5/4/120: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (2), 193
- Eigenwert einer Matrix
  - Aufgabe 5/1/005: (S) Eigenwerte einer reellen Matrix, 167
  - Aufgabe 5/1/020: Eigenwerte einer Matrix über dem Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ , 168
  - Aufgabe 5/1/030: Eigenwerte einer komplexen Matrix, 168
  - Aufgabe 5/1/040: Reelle und komplexe Eigenwerte einer reellen Matrix, 169
  - Aufgabe 5/1/050: Eigenwerte und Eigenräume von Matrizen, 169
  - Aufgabe 5/1/060: Eigenwerte symmetrischer Matrizen, 169
  - Aufgabe 5/1/070: Eigenwerte von Quadraten, 169
  - Aufgabe 5/1/080: Eigenwerte, Eigenschaften, 170
  - Aufgabe 5/1/090: Potenzen von Eigenwerten, 170
  - Aufgabe 5/1/100: Eigenwerte von Dreiecksmatrizen, 170
  - Aufgabe 5/1/110: Eigenwerte und Regularität, 170
  - Aufgabe 5/1/120: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (1), 170
  - Aufgabe 5/1/130: Gemeinsame Basen aus Eigenvektoren, 171
  - Aufgabe 5/2/010: (S) Diagonalisierbarkeit einer Matrix über den reellen Zahlen, 171
  - Aufgabe 5/2/024: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (1), 172
  - Aufgabe 5/2/025: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (2), 173
  - Aufgabe 5/2/026: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, reelle Eigenwerte, 174
  - Aufgabe 5/2/027: (S) Nichtdiagonalisierbarkeit, komplexe Eigenwerte, 175
  - Aufgabe 5/2/028: (S) Diagonalisierbarkeit in der Dimension 3 (3), 176
  - Aufgabe 5/2/030: Diagonalisierbarkeit, 177
  - Aufgabe 5/2/040: Diagonalisierbarkeit, Eigenschaften, 178
  - Aufgabe 5/2/050: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (1), 178
  - Aufgabe 5/2/060: Diagonalisierbarkeit und das Auffinden einer Transformationsmatrix (2), 178
  - Aufgabe 5/2/070: Diagonalisierbarkeit einer Drehmatrix, 178
  - Aufgabe 5/2/080: Diagonalisierbarkeit in Abhängigkeit von einem Parameter, 179
  - Aufgabe 5/2/090: Hinreichende Bedingung für die Diagonalisierbarkeit einer Dreiecksmatrix, 179
  - Aufgabe 5/2/100: Diagonalisierbarkeit der Ableitung, 179
  - Aufgabe 5/2/160: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (2), 181
  - Aufgabe 5/2/180: (S) Halbeinfachheit (1) (Grundkörper  $\mathbb{Q}$ ), 182
  - Aufgabe 5/2/190: (S) Halbeinfachheit (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ ), 183
  - Aufgabe 5/2/200: (S) Halbeinfachheit (3) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 184
- Eigenwert eines Endomorphismus
  - Aufgabe 5/2/130: Simultane Eigenwerte, 180
  - Aufgabe 5/2/140: Zerlegung eines Endomorphismus in eine Summe diagonalisierbarer Endomorphismen, 180
- Eigenwerte einer Matrix
  - Aufgabe 5/4/010: Jordansche Normalform (1) (Grundkörper  $\mathbb{R}$ ), 187

- Aufgabe 5/4/020: Jordansche Normalform (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 188
- Aufgabe 5/4/030: Jordansche Normalform (3) (Grundkörper  $\mathbb{C}$ ), 188
- Aufgabe 5/4/035: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 188
- Aufgabe 5/4/040: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 190
- Aufgabe 5/4/050: Jordansche Normalform (4), mit Parametern, 191
- Aufgabe 5/4/060: Typen jordanscher Normalformen (1), 191
- Aufgabe 5/4/070: Typen jordanscher Normalformen (2), 192
- Aufgabe 5/4/080: Typen jordanscher Normalformen (3), 192
- Eigenwerte eines Endomorphismus
  - Aufgabe 5/4/100: Jordansche Normalform eines Endomorphismus, 192
  - Aufgabe 5/4/110: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (1), 193
  - Aufgabe 5/4/120: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (2), 193
- Einheit
  - Aufgabe 1/2/090: Einheiten einiger Ringe (1), 53
  - Aufgabe 1/2/100: Einheiten einiger Ringe (2), 53
  - Aufgabe 1/2/110: Einheiten einiger Ringe (3), 53
  - Aufgabe 1/2/120: Einheiten einiger Ringe (4), 53
  - Aufgabe 1/2/130: Nilpotente Ringelemente und Einheiten, 54
- Einsetzen einer Matrix in ein Polynom
  - Aufgabe 5/2/120: Charakteristisches Polynom und Minimalpolynom, 180
  - Aufgabe 5/2/150: Diagonalisierbarkeit von  $f(A)$  für  $f \in K[X]$ , 180
- Einsetzungshomomorphismus
  - Aufgabe 1/2/110: Einheiten einiger Ringe (3), 53
  - Aufgabe 1/2/170: Der Ersetzungshomomorphismus für ganzzahlige Polynome, 54
  - Aufgabe 1/2/190: Polynome und Abbildungen, 55
- Elementarteiler einer Matrix
  - Aufgabe 5/4/140: (S) Smithsche Normalform, 195
  - Aufgabe 5/4/141: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4, 196
  - Aufgabe 5/4/142: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4, 198
  - Aufgabe 5/4/143: Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante, 200
  - Aufgabe 5/5/012: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (2), 209
  - Aufgabe 5/5/015: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (3), 210
  - Aufgabe 5/5/020: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (1), 210
  - Aufgabe 5/5/022: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (2), 211
  - Aufgabe 5/5/025: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (3), 212
  - Aufgabe 5/5/030: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (1), 212
  - Aufgabe 5/5/032: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (2), 213
  - Aufgabe 5/5/035: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (3), 214
  - Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
- Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216
- endlicher Körper
  - Aufgabe 1/2/210: Nullstellenbestimmung (1), 56
  - Aufgabe 1/2/220: (S) Nullstellenbestimmung (2), 56
  - Aufgabe 1/2/320: Körper mit 4 Elementen, 59
- Entschlüsselung durch lineare Fortsetzung
  - Aufgabe 3/3/240: (S) Hill-Ciphern (3), 130
- Entwicklung einer Determinante nach der  $i$ -ten Spalte
  - Aufgabe 4/2/090: Determinanten und Kettenbrüche, 146
- Entwicklung einer Determinante nach der  $i$ -ten Zeile
  - Aufgabe 4/2/090: Determinanten und Kettenbrüche, 146
- Ersetzungshomomorphismus
  - Aufgabe 1/2/170: Der Ersetzungshomomorphismus für ganzzahlige Polynome, 54
  - Aufgabe 1/2/190: Polynome und Abbildungen, 55
- erweiterte Koeffizientenmatrix
  - Aufgabe 2/2/060: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_7$ , 78
  - Aufgabe 2/2/080: (S) Lineare Gleichungssysteme in der Charakteristik 0,3,5, 79
  - Aufgabe 2/2/090: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten (2), 79
- Erzeugendensystem eines Vektorraumes
  - Aufgabe 3/1/060: Beispiele für Homomorphismen (1), 113
  - Aufgabe 3/3/010: (S) Lineare Unabhängigkeit von Vektoren und Erzeugendensysteme, 118
- Erzeugung von Untergruppen
  - Aufgabe 1/1/120: Zyklische Gruppen (1), 42
  - Aufgabe 1/1/130: Zyklische Gruppen (2), 42
- euklidischer affiner Standardraum
  - Aufgabe 6/2/050: (S) Winkel zwischen Geraden, 238
  - Aufgabe 6/2/060: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einer Geraden, 240
  - Aufgabe 6/2/065: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (1), 240
  - Aufgabe 6/2/070: Bestimmung verschiedener Abstände, 240
  - Aufgabe 6/2/075: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (2), 241
  - Aufgabe 6/2/076: (S) Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (3), 241
  - Aufgabe 6/2/080: Orientierter Winkel, 242
  - Aufgabe 6/2/120: (S) Orthonormierung (1), 243
  - Aufgabe 6/2/130: Orthonormierung (2), 244
  - Aufgabe 6/2/140: Orthonormierung (3), 244
  - Aufgabe 6/2/150: Orthonormierung (4), 244
- euklidischer Algorithmus
  - Aufgabe 1/2/270: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 56
  - Aufgabe 1/2/275: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (1), 57
  - Aufgabe 1/2/280: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2), 58
  - Aufgabe 2/4/007: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (1), 99
  - Aufgabe 2/4/020: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (2), 101
  - Aufgabe 2/4/070: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 103
- euklidischer Standardraum
  - Aufgabe 6/2/020: Winkel und Drehungen, 237
  - Aufgabe 6/2/040: (S) Winkel zwischen Vektoren, 237

## euklidischer Vektorraum

- Aufgabe 6/2/010: Satz des Thales, 236
- Aufgabe 6/2/030: Eigenschaften der Orthogonalität, 237
- Aufgabe 6/2/052: Winkel und Orthogonalbasen, 239
- Aufgabe 6/2/056: Orthogonales Komplement (2), 239
- Aufgabe 6/2/160: Skalarprodukt auf einem Vektorraum reeller Polynome (1), 245
- Aufgabe 6/2/170: Skalarprodukt auf einem Vektorraum reeller Polynome (2), 245
- Aufgabe 6/2/180: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (1), 245
- Aufgabe 6/2/190: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (2), eine Orthonormalbasis, 246
- Aufgabe 6/2/210: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (3), eine Orthonormalbasis, 246
- Aufgabe 6/2/220: Skalarprodukt auf der Komplexifizierung eines euklidischen Raumes, 247
- Aufgabe 6/2/230: Gramsche Matrix (1), 247
- Aufgabe 6/2/240: (S) Gramsche Matrix (2), 247
- Aufgabe 6/2/250: (S) Gramsche Matrix (3), 248
- Aufgabe 6/3/003: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (3), 251
- Aufgabe 6/3/005: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (5), 252
- Aufgabe 6/3/006: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (6), 252
- Aufgabe 6/3/007: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (7), 252
- Aufgabe 6/3/008: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (8), invariante Unterräume, 252
- Aufgabe 6/3/009: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (9), invariante Unterräume, 252
- Aufgabe 6/3/015: Eine orthogonale Matrix, 254
- Aufgabe 6/3/045: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (12), invariante Unterräume, 258
- Aufgabe 6/3/070: Orthogonale Abbildungen (1), 259
- Aufgabe 6/3/080: Orthogonale Abbildungen (2), 259
- Aufgabe 6/3/090: Orthogonale Abbildungen (3), 260
- Aufgabe 6/3/100: Orthogonale Abbildungen (4), 260
- Aufgabe 6/3/105: Orthogonale Abbildungen (5), 260
- Aufgabe 6/3/110: Spektralzerlegung (5), 261
- Aufgabe 6/3/190: Normale Endomorphismen (3), 264
- Aufgabe 6/4/040: Exponential eines Endomorphismus, Eigenschaften, 278

## exakte Folge

- Aufgabe 3/3/210: Dimensionen der Vektorräume in exakten Folgen, 129
- Aufgabe 6/1/310: Eine exakte Folge von Gruppen, 233

## exakte Folge von Vektorräumen

- Aufgabe 3/2/070: Exakte Folgen zerfallen, 117
- Aufgabe 4/5/005: Eigenschaften des äußeres Produkts, 165

## Exponential einer Matrix

- Aufgabe 6/4/050: (S) Beispiele 2-dimensionaler linearer dynamischer Systeme, Beschreibung der Orbits, 279
- Aufgabe 6/4/060: (S) Lineare Differenzialgleichungen 3. Ordnung, 280

## Exponential eines Endomorphismus

- Aufgabe 6/4/040: Exponential eines Endomorphismus, Eigenschaften, 278

**F**

## Fahne in einem Vektorraum

- Aufgabe 5/2/170: (S) Trigonalisierung, 181
- Aufgabe 5/2/210: Fahnen, 184

## Faktorraum

- Aufgabe 3/2/080: Faktorräume und Isomorphie (1), 117
  - Aufgabe 3/3/190: (S) Basen in Faktorräumen, 127
- fehlerkorrigierender Code
- Aufgabe 3/3/030: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (1), 119
  - Aufgabe 3/3/031: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2), 119
  - Aufgabe 3/3/032: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3), 120

## Fixpunkt

- Aufgabe 6/1/180: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen in der Charakteristik 3, 228
- Aufgabe 6/1/190: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 4), 229
- Aufgabe 6/1/200: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (1), 229
- Aufgabe 6/1/210: (S) Fixpunkte affiner Abbildungen (Charakteristik 0, Dimension 3) (2), 230
- Aufgabe 6/1/270: Existenz von Fixpunkten (1), 232
- Aufgabe 6/1/280: Existenz von Fixpunkten (2), 232

## Fläche eines Parallelogramms

- Aufgabe 6/2/260: Vektorprodukt, 249
- Aufgabe 6/2/270: (S) Fläche und Volumen, 249
- Aufgabe 6/2/280: (S) Fläche eines Parallelogramms (1), 249
- Aufgabe 6/2/290: (S) Fläche eines Parallelogramms (2), 250

## Fundamentalsystem einer homogenen linearen

## Differenzialgleichung n-ter Ordnung

- Aufgabe 6/4/060: (S) Lineare Differenzialgleichungen 3. Ordnung, 280

## Fundierungssaxiom

- Aufgabe 0/5/020: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (1), 38

**G**

## ganze Zahl

- Aufgabe 1/2/010: Rechnen mit Restklassen, 50

## Gauß-Bruhat-Zerlegung

- Aufgabe 2/3/240: (S) Gauß-Bruhat-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$ , 97

## gaußscher Algorithmus

- Aufgabe 2/2/060: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_7$ , 78
- Aufgabe 2/2/080: (S) Lineare Gleichungssysteme in der Charakteristik 0,3,5, 79
- Aufgabe 2/2/090: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten (2), 79
- Aufgabe 2/2/100: (S) Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (1), 80
- Aufgabe 2/3/131: (S) Bestimmung inverser Matrizen über  $\mathbb{F}_{29}$ , 90
- Aufgabe 2/3/132: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (1), 91
- Aufgabe 2/3/133: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (2), 92

## gemischter Tensor

- Aufgabe 4/5/030: Beispiel für den Strukturtenor einer Algebra, 166

## Gerade

- Aufgabe 6/1/120: Lage von Geraden im Raum, 226
- Aufgabe 6/1/140: Gleichungssystem für eine Gerade, 227
- Aufgabe 6/1/230: Komplexe Konjugation als Kollineation, 231
- Geradenspiegelung
  - Aufgabe 6/3/050: Spiegelungen der Ebene, 258
  - Aufgabe 6/3/060: Spiegelungen und Drehungen, 259
  - Aufgabe 6/3/070: Orthogonale Abbildungen (1), 259
  - Aufgabe 6/3/080: Orthogonale Abbildungen (2), 259
- Gewicht eines Codewortes
  - Aufgabe 3/3/031: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2), 119
  - Aufgabe 3/3/032: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3), 120
- gleichmächtige Mengen
  - Aufgabe 0/3/100: Eigenschaften von Abbildungen (3), 36
  - Aufgabe 0/5/050: Abzählbare Mengen (1), 39
  - Aufgabe 0/5/060: Abzählbare Mengen (2), 39
- Gleichungssystem für einen Unterraum
  - Aufgabe 3/5/040: (S) Gleichungen für Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , 137
  - Aufgabe 3/5/041: (S) Gleichungen für Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{R}^4$ , 137
  - Aufgabe 3/5/042: (S) Gleichungen für Unterräume der Standardräume  $\mathbb{R}^4$  und  $\mathbb{C}^3$ , 138
  - Aufgabe 3/5/050: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (1), 138
  - Aufgabe 3/5/051: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (2), 139
- Grad eines Polynoms
  - Aufgabe 1/2/195: Nichteindeutigkeit des Polynomgrades?\*, 55
- gramsche Determinante
  - Aufgabe 6/2/270: (S) Fläche und Volumen, 249
- gramsche Matrix
  - Aufgabe 6/2/230: Gramsche Matrix (1), 247
  - Aufgabe 6/2/240: (S) Gramsche Matrix (2), 247
  - Aufgabe 6/2/250: (S) Gramsche Matrix (3), 248
- größter gemeinsamer Teiler
  - Aufgabe 1/2/240: Ideale und Teilbarkeit, 56
  - Aufgabe 1/2/270: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 56
  - Aufgabe 1/2/275: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (1), 57
  - Aufgabe 1/2/280: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2), 58
- größter gemeinsamer Teiler für Polynome
  - Aufgabe 2/4/007: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (1), 99
  - Aufgabe 2/4/020: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (2), 101
  - Aufgabe 2/4/030: (S) Der größte gemeinsame Teiler in Abhängigkeit von Parametern, 101
  - Aufgabe 2/4/040: (S) Nullstellenbestimmung mit Hilfe des euklidischen Algorithmus, 102
  - Aufgabe 2/4/050: (S) Nullstellen rationaler Polynome, 102
  - Aufgabe 2/4/070: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 103
- Gruppe
  - Aufgabe 1/1/020: Monoide und Gruppen, Beispiele, 40
  - Aufgabe 1/1/030: Beispiele für Gruppen (1), 40
  - Aufgabe 1/1/070: Ein Untergruppenkriterium, 41
  - Aufgabe 1/1/090: Gruppen von Primzahlordnung, 41
  - Aufgabe 1/1/110: Beispiele für Gruppen (2), 41
  - Aufgabe 1/1/180: Gruppenhomomorphismen (1), 43
  - Aufgabe 1/1/190: Gruppenhomomorphismen (2), 43
  - Aufgabe 1/1/200: Gruppenhomomorphismen (3), 43
  - Aufgabe 1/1/210: Gruppenhomomorphismen (4), 44
  - Aufgabe 1/1/220: Rechnen mit Gruppenelementen (1), 44
  - Aufgabe 1/1/230: Rechnen mit Gruppenelementen (2), 44
  - Aufgabe 1/1/360: Normalteilerkriterien, 48
  - Aufgabe 1/1/370: Untergruppen vom Index 2, 48
  - Aufgabe 1/1/380: Normalteiler, Gegenbeispiel, 48
  - Aufgabe 1/1/400: Normalteiler und Isomorphie (1), 49
  - Aufgabe 1/1/410: Normalteiler und Isomorphie (2), 49
  - Aufgabe 1/1/420: Isomorphie: Beispiele und Gegenbeispiele (1), 49
  - Aufgabe 1/1/430: Isomorphie: Beispiele und Gegenbeispiele (2), 49
  - Aufgabe 1/3/190: (S) Gruppen von Matrizen (1), 68
  - Aufgabe 1/3/200: (S) Gruppen von Matrizen (2), 69
  - Aufgabe 1/3/230: Matrizen und Permutationen, 70
  - Aufgabe 1/3/240: Matrizen und die Diedergruppe, 71
  - Aufgabe 1/3/250: Matrizen und Quaternionen, 71
- Gruppenhomomorphismus
  - Aufgabe 1/1/180: Gruppenhomomorphismen (1), 43
  - Aufgabe 1/1/190: Gruppenhomomorphismen (2), 43
  - Aufgabe 1/1/200: Gruppenhomomorphismen (3), 43
  - Aufgabe 1/1/210: Gruppenhomomorphismen (4), 44
  - Aufgabe 1/1/300: Gruppen als Untergruppen der symmetrischen Gruppe, 47
  - Aufgabe 1/1/380: Normalteiler, Gegenbeispiel, 48
- Gruppenoperation
  - Aufgabe 1/1/040: Rechnen mit Gruppenelementen (1), 41
- Gruppentafel
  - Aufgabe 1/1/110: Beispiele für Gruppen (2), 41
- H**
- halbeinfache Matrix
  - Aufgabe 5/2/160: Eigenwerte und Diagonalisierbarkeit (2), 181
  - Aufgabe 5/2/180: (S) Halbeinfachheit (1) (Grundkörper  $\mathbb{Q}$ ), 182
  - Aufgabe 5/2/190: (S) Halbeinfachheit (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_2$ ), 183
  - Aufgabe 5/2/200: (S) Halbeinfachheit (3) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 184
  - Aufgabe 5/4/126: (S) Minimalpolynom (2), 193
  - Aufgabe 5/4/127: Minimalpolynom (3), 194
  - Aufgabe 5/5/003: (S) Jordanzerlegung (2) (Charakteristik 7), 202
  - Aufgabe 5/5/005: Jordanzerlegung (3), 204
  - Aufgabe 5/5/006: (S) Jordanzerlegung (4), 204
  - Aufgabe 5/5/007: (S) Jordanzerlegung (5), 205
  - Aufgabe 5/5/008: (S) Jordanzerlegung (6), 207
- Hauptachsenpolynome reeller Quadriken
  - Aufgabe 6/1/260: (S) Affine Formen von Quadriken, 232
- Hauptraum
  - Aufgabe 5/4/020: Jordansche Normalform (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 188
- Hauptraum einer Matrix

- Aufgabe 5/4/010: Jordansche Normalform (1) (Grundkörper  $\mathbb{R}$ ), 187
- Aufgabe 5/4/030: Jordansche Normalform (3) (Grundkörper  $\mathbb{C}$ ), 188
- Aufgabe 5/4/035: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 188
- Aufgabe 5/4/040: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 190
- Aufgabe 5/4/050: Jordansche Normalform (4), mit Parametern, 191
- Hauptraum eines Endomorphismus
  - Aufgabe 5/4/100: Jordansche Normalform eines Endomorphismus, 192
  - Aufgabe 5/4/110: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (1), 193
  - Aufgabe 5/4/120: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (2), 193
- Hauptsatz der Arithmetik
  - Aufgabe 2/4/105: (S) Irrationalität von Quadratwurzeln, 104
- hermitesche Form
  - Aufgabe 6/2/005: Ein Skalarprodukt, 236
- Hill-Ciphern
  - Aufgabe 2/3/190: (S) Hill-Ciphern (1), 95
  - Aufgabe 2/3/200: (S) Hill-Ciphern (2), 96
  - Aufgabe 3/3/240: (S) Hill-Ciphern (3), 130
- höherer Eigenraum einer Matrix
  - Aufgabe 5/4/090: Jordansche Normalform (4), 192
- homogene lineare Differenzialgleichung n-ter Ordnung
  - Aufgabe 6/4/060: (S) Lineare Differenzialgleichungen 3. Ordnung, 280
- Homomorphiesatz für Vektorräume
  - Aufgabe 3/2/050: Schnitt eines Homomorphismus, 117
- Homomorphismus von Vektorräumen
  - Aufgabe 3/1/060: Beispiele für Homomorphismen (1), 113
  - Aufgabe 3/1/070: Beispiele für Homomorphismen (2), 113
  - Aufgabe 3/2/050: Schnitt eines Homomorphismus, 117
  - Aufgabe 3/2/060:  $\text{Hom}(V, W)$  als Vektorraum, 117
- Hyperbegleitmatrix
  - Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
  - Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216
- Hyperebene
  - Aufgabe 6/1/350: Charakterisierung von Hyperebenen, 236
- Hyperebenenchnitt
  - Aufgabe 6/1/350: Charakterisierung von Hyperebenen, 236
- I**
- Ideal
  - Aufgabe 2/5/080: (S) Gröbnerbasen (5), 110
  - Aufgabe 1/2/140: Faktoring nach einem Maximalideal, 54
  - Aufgabe 1/2/150: Rechnen mit Idealen, 54
  - Aufgabe 1/2/240: Ideale und Teilbarkeit, 56
  - Aufgabe 2/1/020: Eigenschaften von Nullstellenmengen (1), 72
  - Aufgabe 2/5/040: (S) Gröbnerbasen (1), 107
  - Aufgabe 2/5/050: (S) Gröbnerbasen (2), 108
  - Aufgabe 2/5/060: (S) Gröbnerbasen (3), 108
  - Aufgabe 2/5/070: (S) Gröbnerbasen (4), 109
  - Aufgabe 2/5/090: (S) Gröbnerbasen (6), 110
- Implikation
  - Aufgabe 0/2/040: Aussagenverbindungen (1), 31
  - Aufgabe 0/2/050: Aussagenverbindungen (2), 31
  - Aufgabe 0/2/060: Aussagenverbindungen (3), 31
- Index einer Untergruppe
  - Aufgabe 1/1/370: Untergruppen vom Index 2, 48
- indirekter Beweis
  - Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30
  - Aufgabe 0/2/080: Aussagenverbindungen (5), 31
- Induktionsaxiom
  - Aufgabe 0/2/100: Binomialkoeffizienten, 32
  - Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33
  - Aufgabe 0/2/120: Vollständige Induktion (1), 33
  - Aufgabe 0/2/130: Vollständige Induktion (2), 33
- Induktionsbehauptung
  - Aufgabe 0/2/100: Binomialkoeffizienten, 32
  - Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33
  - Aufgabe 0/2/120: Vollständige Induktion (1), 33
  - Aufgabe 0/2/130: Vollständige Induktion (2), 33
- Induktionsschritt
  - Aufgabe 0/2/100: Binomialkoeffizienten, 32
  - Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33
  - Aufgabe 0/2/120: Vollständige Induktion (1), 33
  - Aufgabe 0/2/130: Vollständige Induktion (2), 33
- Induktionsvoraussetzung
  - Aufgabe 0/2/100: Binomialkoeffizienten, 32
  - Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33
  - Aufgabe 0/2/120: Vollständige Induktion (1), 33
  - Aufgabe 0/2/130: Vollständige Induktion (2), 33
- induktiv geordnete Menge
  - Aufgabe 0/4/030: Eine induktiv geordnete Menge, 37
- Informationsrate eines Codes
  - Aufgabe 3/3/031: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2), 119
  - Aufgabe 3/3/032: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3), 120
- injektive Abbildung
  - Aufgabe 0/3/080: Eigenschaften von Abbildungen (1), 35
  - Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36
- innere direkte Summe
  - Aufgabe 3/2/010: Innere direkte Summen (1), 114
  - Aufgabe 3/2/020: Innere direkte Summen (2), 114
- invarianter Unterraum
  - Aufgabe 6/3/008: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (8), invariante Unterräume, 252
  - Aufgabe 6/3/009: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (9), invariante Unterräume, 252
  - Aufgabe 6/3/045: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (12), invariante Unterräume, 258
  - Aufgabe 6/3/090: Orthogonale Abbildungen (3), 260
  - Aufgabe 6/3/100: Orthogonale Abbildungen (4), 260
- Invarianz des Teilverhältnisses
  - Aufgabe 6/1/300: Strahlensatz und Teilverhältnis, 233
- inverse Matrix
  - Aufgabe 2/3/110: (S) Beispiele für inverse Matrizen (1), 88

- Aufgabe 2/3/120: (S) Beispiele für inverse Matrizen (2), 89
- Aufgabe 2/3/130: (S) Beispiele für inverse Matrizen über  $\mathbb{F}_3$ ,  $\mathbb{C}$ , 89
- Aufgabe 2/3/131: (S) Bestimmung inverser Matrizen über  $\mathbb{F}_{29}$ , 90
- Aufgabe 2/3/132: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (1), 91
- Aufgabe 2/3/133: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (2), 92
- Aufgabe 2/3/140: (S) Inverse Matrizen, Beispiele mit 3 Parametern, 93
- Aufgabe 2/3/150: (S) Inverse Matrizen, Beispiele mit einem Parameter, 93
- Aufgabe 2/3/160: (S) Eigenschaften und Beispiele invertierbarer Matrizen, 94
- Aufgabe 2/3/170: Bestimmung der Inversen spezieller invertierbarer Matrizen, 94
- Aufgabe 2/3/180: Inverse Matrizen, Beispiele mit 3 Parametern, 95
- Aufgabe 2/3/200: (S) Hill-Ciphern (2), 96
- inverse Matrix (Determinantenformel)
- Aufgabe 4/2/120: (S) Die adjungierte Matrix (1), 148
- Aufgabe 4/2/130: Rechenregeln für Determinanten (3), 149
- Aufgabe 4/2/140: (S) Die adjungierte Matrix (2), 149
- invertierbare Matrix
- Aufgabe 2/3/110: (S) Beispiele für inverse Matrizen (1), 88
- Aufgabe 2/3/120: (S) Beispiele für inverse Matrizen (2), 89
- Aufgabe 2/3/130: (S) Beispiele für inverse Matrizen über  $\mathbb{F}_3$ ,  $\mathbb{C}$ , 89
- Aufgabe 2/3/131: (S) Bestimmung inverser Matrizen über  $\mathbb{F}_{29}$ , 90
- Aufgabe 2/3/132: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (1), 91
- Aufgabe 2/3/133: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (2), 92
- Aufgabe 2/3/140: (S) Inverse Matrizen, Beispiele mit 3 Parametern, 93
- Aufgabe 2/3/150: (S) Inverse Matrizen, Beispiele mit einem Parameter, 93
- Aufgabe 2/3/160: (S) Eigenschaften und Beispiele invertierbarer Matrizen, 94
- Aufgabe 2/3/170: Bestimmung der Inversen spezieller invertierbarer Matrizen, 94
- Aufgabe 2/3/180: Inverse Matrizen, Beispiele mit 3 Parametern, 95
- Irreduzibilität
- Aufgabe 1/2/260: Irreduzible Elemente in  $\mathbb{Z}[i]$ , 56
- irreduzibles Polynom
- Aufgabe 2/4/080: (S) Faktorzerlegung von Polynomen, 103
- Aufgabe 2/4/090: Irreduzible Polynome über dem Primkörper  $\mathbb{F}_2$ , 104
- Aufgabe 2/4/100: (S) Faktorzerlegung von Polynomen über  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{F}_p$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{R}$ , 104
- Aufgabe 2/4/110: Eisenstein-Kriterium, 104
- Aufgabe 2/4/120: Irreduzibilität von Polynomen in  $\mathbb{Q}[X]$ , 105
- Aufgabe 2/4/140: Konstruktion eines 9-elementigen Körpers, 105
- Aufgabe 2/4/150: Konstruktion endlicher Körper, 105
- irreduzibles Ringelement
- Aufgabe 1/2/260: Irreduzible Elemente in  $\mathbb{Z}[i]$ , 56
- Isomorphismen von Gruppen
- Aufgabe 1/3/220: Matrizen und Drehungen, 70
- Aufgabe 1/3/230: Matrizen und Permutationen, 70
- Isomorphismus affiner Räume
- Aufgabe 6/1/300: Strahlensatz und Teilverhältnis, 233
- Isomorphismus von Gruppen
- Aufgabe 1/1/120: Zyklische Gruppen (1), 42
- Aufgabe 1/1/150: Symmetriegruppen einfacher Figuren, 42
- Aufgabe 1/1/160: Diedergruppe, 42
- Aufgabe 1/1/210: Gruppenhomomorphismen (4), 44
- Aufgabe 1/1/400: Normalteiler und Isomorphie (1), 49
- Aufgabe 1/1/410: Normalteiler und Isomorphie (2), 49
- Aufgabe 1/1/420: Isomorphie: Beispiele und Gegenbeispiele (1), 49
- Aufgabe 1/1/430: Isomorphie: Beispiele und Gegenbeispiele (2), 49
- Isomorphismus von Ringen
- Aufgabe 1/2/290: Chinesischer Restsatz, 59
- Isomorphismus von Vektorräumen
- Aufgabe 3/2/070: Exakte Folgen zerfallen, 117
- Aufgabe 3/2/080: Faktorräume und Isomorphie (1), 117
- Aufgabe 3/2/090: Faktorräume und Isomorphie (2), 118
- Aufgabe 3/5/060: Ein Vektorraum, der nicht zu seinem dualen isomorph ist, 139
- J**
- jordansche Normalform einer Matrix
- Aufgabe 5/4/010: Jordansche Normalform (1) (Grundkörper  $\mathbb{R}$ ), 187
- Aufgabe 5/4/020: Jordansche Normalform (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 188
- Aufgabe 5/4/030: Jordansche Normalform (3) (Grundkörper  $\mathbb{C}$ ), 188
- Aufgabe 5/4/035: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 188
- Aufgabe 5/4/040: (S) Jordansche Normalform und Übergangsmatrix, 190
- Aufgabe 5/4/050: Jordansche Normalform (4), mit Parametern, 191
- Aufgabe 5/4/060: Typen jordanscher Normalformen (1), 191
- Aufgabe 5/4/070: Typen jordanscher Normalformen (2), 192
- Aufgabe 5/4/080: Typen jordanscher Normalformen (3), 192
- Aufgabe 5/4/090: Jordansche Normalform (4), 192
- Aufgabe 5/4/150: Jordansche Normalform der transponierten Matrix, 201
- Aufgabe 5/4/170: Einige Eigenschaften des Minimalpolynoms und des charakteristischen Polynoms einer Matrix, 201
- jordansche Normalform einer nilpotenten Matrix
- Aufgabe 5/3/010: (S) Normalformen nilpotenter Matrizen, 184
- Aufgabe 5/3/020: Nilpotente Endomorphismen (1), 185

- Aufgabe 5/3/030: Nilpotente Endomorphismen (2), 186
  - Aufgabe 5/3/040: Nilpotente Endomorphismen (3), 186
  - Aufgabe 5/3/050: Nilpotente Endomorphismen (4), 186
  - Aufgabe 5/3/060: Ähnlichkeit, Beispiel, 186
  - Aufgabe 5/3/070: Nilpotente Endomorphismen (5), 187
  - Aufgabe 5/3/080: Ein falsches Verfahren, 187
  - Aufgabe 5/4/130: Jordanform der Ableitung, 195
  - jordansche Normalform eines Endomorphismus
  - Aufgabe 5/4/100: Jordansche Normalform eines Endomorphismus, 192
  - Aufgabe 5/4/110: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (1), 193
  - Aufgabe 5/4/120: Jordansche Normalform spezieller Endomorphismen (2), 193
  - Jordanzerlegung einer Matrix
  - Aufgabe 5/5/003: (S) Jordanzerlegung (2) (Charakteristik 7), 202
  - Aufgabe 5/5/005: Jordanzerlegung (3), 204
  - Aufgabe 5/5/006: (S) Jordanzerlegung (4), 204
  - Aufgabe 5/5/007: (S) Jordanzerlegung (5), 205
  - Aufgabe 5/5/008: (S) Jordanzerlegung (6), 207
- K**
- kanonisch orientierter euklidischer Standardraum
  - Aufgabe 6/2/080: Orientierter Winkel, 242
  - Aufgabe 6/2/090: Vektorprodukt (1), 242
  - Aufgabe 6/2/100: Vektorprodukt (2), 242
  - Aufgabe 6/2/110: Quaternionen, 243
  - Aufgabe 6/2/260: Vektorprodukt, 249
  - Aufgabe 6/2/270: (S) Fläche und Volumen, 249
  - Aufgabe 6/2/280: (S) Fläche eines Parallelogramms (1), 249
  - Aufgabe 6/2/290: (S) Fläche eines Parallelogramms (2), 250
  - Kardinalzahl
  - Aufgabe 3/3/230: Ein Gruppenisomorphismus\*, 130
  - kartesisches Produkt
  - Aufgabe 0/1/050: Mengenoperationen, kartesisches Produkt, 26
  - Aufgabe 0/4/010: Abbildungen, kartesisches Produkt, 37
  - Kettendivision
  - Aufgabe 1/2/270: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 56
  - Aufgabe 1/2/275: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (1), 57
  - Aufgabe 1/2/280: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2), 58
  - Aufgabe 2/4/007: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (1), 99
  - Aufgabe 2/4/020: (S) Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers von Polynomen (2), 101
  - Aufgabe 2/4/030: (S) Der größte gemeinsame Teiler in Abhängigkeit von Parametern, 101
  - Aufgabe 2/4/040: (S) Nullstellenbestimmung mit Hilfe des euklidischen Algorithmus, 102
  - Aufgabe 2/4/050: (S) Nullstellen rationaler Polynome, 102
  - Aufgabe 2/4/070: (S) Der größte gemeinsame Teiler als Vielfachensumme, 103
  - Kettenschluss
  - Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30
  - klassische Aussagenverbindungen
  - Aufgabe 0/2/010: (S) Wahrheitswerte (1), 27
  - Aufgabe 0/2/011: (S) Wahrheitswerte (2), 27
  - Aufgabe 0/2/012: (S) Wahrheitswerte (3), 27
  - Aufgabe 0/2/013: (S) Wahrheitswerte (4), 28
  - Aufgabe 0/2/014: (S) Wahrheitswerte (5), 28
  - Aufgabe 0/2/015: (S) Wahrheitswerte (6), 29
  - Aufgabe 0/2/020: Äquivalenz von Aussagen (1), 30
  - Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30
  - Aufgabe 0/2/040: Aussagenverbindungen (1), 31
  - Aufgabe 0/2/050: Aussagenverbindungen (2), 31
  - Aufgabe 0/2/060: Aussagenverbindungen (3), 31
  - Aufgabe 0/2/070: Aussagenverbindungen (4), 31
  - Aufgabe 0/2/080: Aussagenverbindungen (5), 31
  - Aufgabe 0/2/090: Aussagenverbindungen (6), 32
  - klassische Normalform
  - Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
  - Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216
  - Körper
  - Aufgabe 1/2/040: (S) Rechnen mit komplexen Zahlen (1), 50
  - Aufgabe 1/2/050: (S) Rechnen mit komplexen Zahlen (2), 51
  - Aufgabe 1/2/140: Faktoring nach einem Maximalideal, 54
  - Aufgabe 1/2/150: Rechnen mit Idealen, 54
  - Aufgabe 1/2/320: Körper mit 4 Elementen, 59
  - Aufgabe 1/2/330: Endliche Körper, Gegenbeispiel, 59
  - Aufgabe 1/2/340: Der Frobenius-Homomorphismus, 59
  - Aufgabe 1/2/350: Der kleine fermatsche Satz, 60
  - Aufgabe 1/3/210: Ein Körper mit 9 Elementen, 70
  - Körper der reellen Zahlen als  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum
  - Aufgabe 3/3/040: Lineare Unabhängigkeit Eigenschaften (1), 121
  - Kofaktoren einer quadratischen Matrix
  - Aufgabe 4/2/110: (S) Kofaktoren von Determinanten, 147
  - Aufgabe 4/2/120: (S) Die adjungierte Matrix (1), 148
  - Aufgabe 4/2/130: Rechenregeln für Determinanten (3), 149
  - Aufgabe 4/2/140: (S) Die adjungierte Matrix (2), 149
  - Kommutator
  - Aufgabe 1/1/250: Rechnen mit Permutationen, Kommutator, 45
  - Komplement von Mengen
  - Aufgabe 0/1/020: Mengenoperationen (2), Komplementärmengen, 25
  - Aufgabe 0/1/030: Mengenoperationen (3), 25
  - Aufgabe 0/1/040: Durchschnitt eines Mengensystems, 26
  - Komplementärraum
  - Aufgabe 3/2/070: Exakte Folgen zerfallen, 117
  - Aufgabe 3/3/160: (S) Basen von Komplementärräumen, 125
  - komplexe Zahlen
  - Aufgabe 1/2/040: (S) Rechnen mit komplexen Zahlen (1), 50
  - Aufgabe 1/2/050: (S) Rechnen mit komplexen Zahlen (2), 51
  - Aufgabe 1/3/220: Matrizen und Drehungen, 70

- Aufgabe 3/3/020: (S) Linear unabhängige Vektoren in  $\mathbb{C}^2$ , 119
- Komposition von Abbildungen
  - Aufgabe 0/3/080: Eigenschaften von Abbildungen (1), 35
  - Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36
- Kontraposition
  - Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30
- Koordinaten
  - Aufgabe 3/3/090: (S) Basen und Koordinaten (1), 122
  - Aufgabe 3/3/100: (S) Basen und Koordinaten (2), 122
  - Aufgabe 3/3/120: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (1), 123
  - Aufgabe 3/3/130: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (2), 123
  - Aufgabe 3/4/010: (S) Koordinaten und Übergangsmatrizen, 133
  - Aufgabe 4/5/010: (S) Basen äußerer Potenzen, 165
- Koordinatentransformation
  - Aufgabe 6/1/250: Affine Basen und Koordinaten, 231
  - Aufgabe 6/1/260: (S) Affine Formen von Quadriken, 232
- Kroneckerprodukt
  - Aufgabe 4/4/060: (S) Das Kroneckerprodukt (1), 164
  - Aufgabe 4/4/070: (S) Das Kroneckerprodukt (2), 164
- L**
- laplacescher Entwicklungssatz
  - Aufgabe 4/2/200: (S) Komplexität der Bestimmung von Determinanten, 153
- leere Menge
  - Aufgabe 0/1/040: Durchschnitt eines Mengensystems, 26
- leibnizische Formel
  - Aufgabe 4/2/200: (S) Komplexität der Bestimmung von Determinanten, 153
- lexikographische Ordnung
  - Aufgabe 2/5/080: (S) Gröbnerbasen (5), 110
  - Aufgabe 0/3/060: Lexikographische Ordnung, 35
  - Aufgabe 2/5/040: (S) Gröbnerbasen (1), 107
  - Aufgabe 2/5/050: (S) Gröbnerbasen (2), 108
  - Aufgabe 2/5/060: (S) Gröbnerbasen (3), 108
  - Aufgabe 2/5/070: (S) Gröbnerbasen (4), 109
  - Aufgabe 2/5/090: (S) Gröbnerbasen (6), 110
- Limeszahl
  - Aufgabe 0/5/040: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (3), 38
- linear abhängige Vektoren
  - Aufgabe 3/3/060: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (3), 121
  - Aufgabe 3/3/070: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (4), 121
- linear unabhängige Vektoren
  - Aufgabe 3/3/010: (S) Lineare Unabhängigkeit von Vektoren und Erzeugendensysteme, 118
  - Aufgabe 3/3/020: (S) Linear unabhängige Vektoren in  $\mathbb{C}^2$ , 119
  - Aufgabe 3/3/040: Lineare Unabhängigkeit Eigenschaften (1), 121
  - Aufgabe 3/3/050: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (2), 121
  - Aufgabe 3/3/080: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (5), 122
  - Aufgabe 3/3/140: (S) Basisergänzung im  $\mathbb{R}^5$ , 124
  - Aufgabe 3/3/150: (S) Austauschverfahren, 124
  - Aufgabe 3/3/160: (S) Basen von Komplementärräumen, 125
  - Aufgabe 3/3/170: Eine Eigenschaft von Basen, 126
- lineare Abbildung
  - Aufgabe 3/3/180: (S) Existenz der linearen Fortsetzung von Abbildungen, 126
  - Aufgabe 3/3/200: (S) Dimension von Bild und Kern einer linearen Abbildung, 127
  - Aufgabe 3/3/202: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 2, 128
  - Aufgabe 3/3/203: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 3, 128
  - Aufgabe 3/3/205: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 5, 129
  - Aufgabe 3/3/240: (S) Hill-Ciphern (3), 130
- lineare Fortsetzung
  - Aufgabe 3/3/180: (S) Existenz der linearen Fortsetzung von Abbildungen, 126
  - Aufgabe 3/3/240: (S) Hill-Ciphern (3), 130
- lineare Hülle
  - Aufgabe 3/3/110: (S) Rechenbeispiele zur Basisauswahl, 123
- lineare Ordnung
  - Aufgabe 0/4/020: Zornsches Lemma, Beispiel\*, 37
- lineare Unabhängigkeit
  - Aufgabe 3/3/030: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (1), 119
  - Aufgabe 3/3/031: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2), 119
  - Aufgabe 3/3/032: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3), 120
- linearer Anteil einer affinen Abbildung
  - Aufgabe 6/1/170: Existenz affiner Abbildungen (1), 228
  - Aufgabe 6/1/240: Existenz affiner Abbildungen (2), 231
- lineares dynamisches System
  - Aufgabe 6/4/050: (S) Beispiele 2-dimensionaler linearer dynamischer Systeme, Beschreibung der Orbits, 279
- lineares Gleichungssystem
  - Aufgabe 2/1/070: (S) Lineare Gleichungen, erste Schritte (1), 74
  - Aufgabe 2/1/080: (S) Lineare Gleichungen, erste Schritte (2), 74
  - Aufgabe 2/2/010: (S) Lineare Gleichungssysteme in Stufenform, 76
  - Aufgabe 2/2/020: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_3$ , 76
  - Aufgabe 2/2/030: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten, 77
  - Aufgabe 2/2/040: (S) Einfache Fälle linearer Gleichungssysteme, 77
  - Aufgabe 2/2/060: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_7$ , 78
  - Aufgabe 2/2/070: Anzahl der Lösungen einiger linearer Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_2$ , 78
  - Aufgabe 2/2/080: (S) Lineare Gleichungssysteme in der Charakteristik 0,3,5, 79
  - Aufgabe 2/2/090: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten (2), 79

- Aufgabe 2/2/100: (S) Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (1), 80
- Aufgabe 2/2/110: (S) Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (2), 80
- Aufgabe 2/2/130: Rechnen mit Näherungen, 81
- Aufgabe 2/2/140: (S) Matrizengleichungen, 81
- Aufgabe 2/2/150: (S) Stufenformtransformation für Matrizen, 82
- lineares Gleichungssystem in Stufenform
  - Aufgabe 2/2/010: (S) Lineare Gleichungssysteme in Stufenform, 76
  - Aufgabe 2/2/020: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_3$ , 76
  - Aufgabe 2/2/040: (S) Einfache Fälle linearer Gleichungssysteme, 77
- lineares Gleichungssystem in Stufenform, Zeilenstufenform
  - Aufgabe 2/2/030: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten, 77
- Linearkombination
  - Aufgabe 3/3/060: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (3), 121
  - Aufgabe 3/3/070: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (4), 121
- Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems
  - Aufgabe 2/3/090: (S) Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme, 87
  - Aufgabe 2/3/100: (S) Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems über  $\mathbb{F}_5$ , 87
- Lösungsmenge
  - Aufgabe 2/2/070: Anzahl der Lösungen einiger linearer Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_2$ , 78
  - Aufgabe 2/2/080: (S) Lineare Gleichungssysteme in der Charakteristik 0,3,5, 79
  - Aufgabe 2/2/090: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten (2), 79
  - Aufgabe 2/2/100: (S) Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (1), 80
  - Aufgabe 2/2/110: (S) Lineare Gleichungssysteme mit Parametern (2), 80
  - Aufgabe 2/2/130: Rechnen mit Näherungen, 81
  - Aufgabe 2/2/140: (S) Matrizengleichungen, 81
- Lösungsmenge eines Gleichungssystems
  - Aufgabe 2/1/070: (S) Lineare Gleichungen, erste Schritte (1), 74
  - Aufgabe 2/1/080: (S) Lineare Gleichungen, erste Schritte (2), 74
- LR-Zerlegung
  - Aufgabe 2/3/250: (S) LR-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$ , 97
- M**
- Matrix
  - Aufgabe 1/3/005: (S) Matrizenmultiplikation, erste Schritte, 60
  - Aufgabe 1/3/010: Eigenschaften der Matrizenmultiplikation, 60
  - Aufgabe 1/3/020: Der Ring der quadratischen Matrizen eines festen Typs, 61
  - Aufgabe 1/3/030: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (1), 61
  - Aufgabe 1/3/040: Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (2), 62
  - Aufgabe 1/3/050: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (3), 62
- Aufgabe 1/3/060: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (4), 64
- Aufgabe 1/3/070: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (4), 64
- Aufgabe 1/3/070: (S) Substitution von Matrizen in Polynome, 64
- Aufgabe 1/3/070: (S) Substitution von Matrizen in Polynome, 64
- Aufgabe 1/3/070: (S) Substitution von Matrizen in Polynome, 64
- Aufgabe 1/3/080: (S) Operationen mit polynomialen Matrizen, 65
- Aufgabe 1/3/090: Potenzen von Matrizen (1), 65
- Aufgabe 1/3/100: Potenzen von Matrizen (2), 66
- Aufgabe 1/3/120: Potenzen von Matrizen (3), 66
- Aufgabe 1/3/130: (S) Potenzen von Matrizen (4), 66
- Aufgabe 1/3/140: (S) Potenzen von Matrizen (5), 67
- Aufgabe 1/3/160: (S) Nilpotente Matrizen (1), 67
- Aufgabe 1/3/165: Nilpotente Matrizen (2), 67
- Aufgabe 1/3/170: Matrizen mit Parametern (1), 68
- Aufgabe 1/3/180: Matrizen mit Parametern (2), 68
- Aufgabe 1/3/190: (S) Gruppen von Matrizen (1), 68
- Aufgabe 1/3/200: (S) Gruppen von Matrizen (2), 69
- Aufgabe 1/3/210: Ein Körper mit 9 Elementen, 70
- Aufgabe 1/3/220: Matrizen und Drehungen, 70
- Aufgabe 1/3/230: Matrizen und Permutationen, 70
- Aufgabe 1/3/240: Matrizen und die Diedergruppe, 71
- Aufgabe 1/3/250: Matrizen und Quaternionen, 71
- Aufgabe 2/3/010: (S) Rangbestimmung, erste Schritte, 82
- Aufgabe 2/3/011: (S) Rangbestimmung, einfache Beispiele, 84
- Aufgabe 2/3/020: (S) Rangbestimmung, Beispiele aus  $M(4; \mathbb{R})$ , 84
- Aufgabe 2/3/030: (S) Rangbestimmung, Beispiele über  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{F}_2$ ,  $\mathbb{F}_3$ , 84
- Aufgabe 2/3/040: (S) Rangbestimmung, Beispiele mit einem Parameter, 85
- Aufgabe 2/3/050: (S) Rangbestimmung, Beispiele mit zwei Parametern, 85
- Aufgabe 2/3/060: Rangbestimmung, Beispiele mit 3 Parametern, 86
- Aufgabe 2/3/070: Rangbestimmung für einige spezielle Matrizen, 86
- Aufgabe 2/3/080: Rangbestimmung, ein Beispiel mit irrationalen Koeffizienten, 86
- Matrix einer linearen Abbildung
  - Aufgabe 3/4/020: Matrix der Transposition, 134
  - Aufgabe 3/4/030: (S) Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel, 134
  - Aufgabe 3/4/040: (S) Matrix eines Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , Basiswechsel, 135
  - Aufgabe 3/4/050: (S) Matrix eines Endomorphismus eines Unterraumes von  $\mathbb{R}[X]$ , Basiswechsel, 135
- Matrixordnung
  - Aufgabe 2/5/010: (S) Matrixordnungen (1), 106
  - Aufgabe 2/5/020: (S) Matrixordnungen (2), 106
  - Aufgabe 2/5/030: (S) Matrixordnungen (3), 107
- Matrizenaddition
  - Aufgabe 1/3/020: Der Ring der quadratischen Matrizen eines festen Typs, 61
  - Aufgabe 1/3/030: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (1), 61
  - Aufgabe 1/3/040: Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (2), 62
  - Aufgabe 1/3/050: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (3), 62
  - Aufgabe 1/3/060: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (4), 64
  - Aufgabe 1/3/070: (S) Substitution von Matrizen in Polynome, 64

- Aufgabe 1/3/080: (S) Operationen mit polynomialen Matrizen, 65
- Matrizenmultiplikation
  - Aufgabe 1/3/005: (S) Matrizenmultiplikation, erste Schritte, 60
  - Aufgabe 1/3/010: Eigenschaften der Matrizenmultiplikation, 60
  - Aufgabe 1/3/020: Der Ring der quadratischen Matrizen eines festen Typs, 61
  - Aufgabe 1/3/030: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (1), 61
  - Aufgabe 1/3/040: Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (2), 62
  - Aufgabe 1/3/050: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (3), 62
  - Aufgabe 1/3/060: (S) Matrizenoperationen, Rechenbeispiele (4), 64
  - Aufgabe 1/3/070: (S) Substitution von Matrizen in Polynome, 64
  - Aufgabe 1/3/080: (S) Operationen mit polynomialen Matrizen, 65
  - Aufgabe 1/3/090: Potenzen von Matrizen (1), 65
  - Aufgabe 1/3/100: Potenzen von Matrizen (2), 66
  - Aufgabe 1/3/120: Potenzen von Matrizen (3), 66
  - Aufgabe 1/3/130: (S) Potenzen von Matrizen (4), 66
  - Aufgabe 1/3/140: (S) Potenzen von Matrizen (5), 67
  - Aufgabe 1/3/160: (S) Nilpotente Matrizen (1), 67
  - Aufgabe 1/3/165: Nilpotente Matrizen (2), 67
  - Aufgabe 1/3/170: Matrizen mit Parametern (1), 68
  - Aufgabe 1/3/180: Matrizen mit Parametern (2), 68
  - Aufgabe 1/3/190: (S) Gruppen von Matrizen (1), 68
  - Aufgabe 1/3/200: (S) Gruppen von Matrizen (2), 69
  - Aufgabe 1/3/210: Ein Körper mit 9 Elementen, 70
  - Aufgabe 1/3/220: Matrizen und Drehungen, 70
  - Aufgabe 1/3/230: Matrizen und Permutationen, 70
  - Aufgabe 1/3/240: Matrizen und die Diedergruppe, 71
  - Aufgabe 1/3/250: Matrizen und Quaternionen, 71
  - Aufgabe 2/3/190: (S) Hill-Ciphern (1), 95
  - Aufgabe 2/3/200: (S) Hill-Ciphern (2), 96
- Maximum-Likelihood Decodierung
  - Aufgabe 3/2/040: (S) Lineare Codes, Decodierung (1), 115
  - Aufgabe 3/2/041: (S) Lineare Codes, Decodierung (2), 116
- Mengen von Vektorraumhomomorphismen
  - Aufgabe 3/2/060:  $\text{Hom}(V, W)$  als Vektorraum, 117
- metrische Hauptachsengleichungen für Quadriken
  - Aufgabe 6/3/120: Ebene Quadriken (1), 261
  - Aufgabe 6/3/130: Ebene Quadriken (2), 261
  - Aufgabe 6/3/140: (S) Ebene Quadriken (3), 261
  - Aufgabe 6/3/150: Quadriken (4), Beispiel in der Dimension 4, 263
  - Aufgabe 6/3/250: (S) Quadriken (5), Ellipsoid, 265
  - Aufgabe 6/3/260: (S) Quadriken (6), Kegel, 267
  - Aufgabe 6/3/270: (S) Quadriken (7), einschaliges Hyperboloid, 269
  - Aufgabe 6/3/280: (S) Quadriken (8), elliptisches Paraboloid, 270
  - Aufgabe 6/3/290: (S) Quadriken (9), hyperbolisches Paraboloid, 272
  - Aufgabe 6/3/300: (S) Quadriken (10), zweischaliges Hyperboloid, 273
  - Aufgabe 6/3/320: (S) Quadriken (12), Beispiele in der Dimension 4, 275
- Minimalpolynom einer Matrix
  - Aufgabe 5/5/008: (S) Jordanzerlegung (6), 207
- Minimalpolynom einer quadratischen Matrix
  - Aufgabe 5/4/020: Jordansche Normalform (2) (Grundkörper  $\mathbb{F}_5$ ), 188
  - Aufgabe 5/4/080: Typen jordanscher Normalformen (3), 192
  - Aufgabe 5/4/125: (S) Minimalpolynom (1), 193
  - Aufgabe 5/4/126: (S) Minimalpolynom (2), 193
  - Aufgabe 5/4/127: Minimalpolynom (3), 194
  - Aufgabe 5/4/128: Minimalpolynom (4), 194
  - Aufgabe 5/4/160: Minimalpolynom, Eigenschaften, 201
  - Aufgabe 5/4/170: Einige Eigenschaften des Minimalpolynoms und des charakteristischen Polynoms einer Matrix, 201
  - Aufgabe 5/5/002: Jordanzerlegung (1), 202
  - Aufgabe 5/5/003: (S) Jordanzerlegung (2) (Charakteristik 7), 202
  - Aufgabe 5/5/005: Jordanzerlegung (3), 204
  - Aufgabe 5/5/006: (S) Jordanzerlegung (4), 204
  - Aufgabe 5/5/007: (S) Jordanzerlegung (5), 205
- Monoid
  - Aufgabe 1/1/010: Operationen, Beispiele, 40
  - Aufgabe 1/1/020: Monoide und Gruppen, Beispiele, 40
- Monomordnung
  - Aufgabe 2/5/010: (S) Matrixordnungen (1), 106
  - Aufgabe 2/5/020: (S) Matrixordnungen (2), 106
  - Aufgabe 2/5/030: (S) Matrixordnungen (3), 107
- multilineare Abbildung
  - Aufgabe 4/2/009: (S) Erste Schritte mit Determinanten, 140
  - Aufgabe 4/2/010: Rechenregeln für Determinanten (1), 141
  - Aufgabe 4/2/025: Rechenregeln für Determinanten (2), 141
  - Aufgabe 4/2/030: (S) Bestimmung von Determinanten (1), 141
  - Aufgabe 4/2/032: (S) Bestimmung von Determinanten (2), 142
  - Aufgabe 4/2/034: (S) Bestimmung von Determinanten (3), 144
  - Aufgabe 4/2/040: (S) Determinanten mit Parametern (1), 144
  - Aufgabe 4/2/050: (S) Determinanten mit Parametern (2), 145
  - Aufgabe 4/2/090: Determinanten und Kettenbrüche, 146
  - Aufgabe 4/2/100: (S) Determinanten mit Parametern (3), 146
  - Aufgabe 4/2/110: (S) Kofaktoren von Determinanten, 147
  - Aufgabe 4/2/120: (S) Die adjungierte Matrix (1), 148
  - Aufgabe 4/2/130: Rechenregeln für Determinanten (3), 149
  - Aufgabe 4/2/140: (S) Die adjungierte Matrix (2), 149
  - Aufgabe 4/2/150: (S) Cramersche Regel, 150
  - Aufgabe 4/2/180: (S) Endomorphismen und Determinanten (1), 151
  - Aufgabe 4/2/190: (S) Endomorphismen und Determinanten (2), 152
  - Aufgabe 4/2/200: (S) Komplexität der Bestimmung von Determinanten, 153

- Aufgabe 4/3/010: (S) Beispiele für Bilinearformen (1), 155
- Aufgabe 4/3/020: Beispiele für Bilinearformen (2), 156
- Aufgabe 4/3/030: (S) Bilinearformen und Basiswechsel, 156
- multiplikatives Inverses
  - Aufgabe 1/2/275: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (1), 57
  - Aufgabe 1/2/280: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2), 58
- N**
- natürliche Form einer Matrix
  - Aufgabe 5/5/012: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (2), 209
  - Aufgabe 5/5/015: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (3), 210
  - Aufgabe 5/5/020: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (1), 210
  - Aufgabe 5/5/022: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (2), 211
  - Aufgabe 5/5/025: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (3), 212
  - Aufgabe 5/5/030: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (1), 212
  - Aufgabe 5/5/032: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (2), 213
  - Aufgabe 5/5/035: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (3), 214
  - Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
  - Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216
- natürliche Ordnung
  - Aufgabe 0/3/110: Natürliche Zahlen, 36
- Negation
  - Aufgabe 0/2/070: Aussagenverbindungen (4), 31
  - Aufgabe 0/2/090: Aussagenverbindungen (6), 32
- negativ definite quadratische Form
  - Aufgabe 4/3/120: Quadratische Form eines Graphen\*, 161
- nichttriviale Elementarteiler
  - Aufgabe 5/5/012: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (2), 209
  - Aufgabe 5/5/015: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_5$  (3), 210
  - Aufgabe 5/5/020: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (1), 210
  - Aufgabe 5/5/022: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (2), 211
  - Aufgabe 5/5/025: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{Q}$  (3), 212
  - Aufgabe 5/5/030: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (1), 212
  - Aufgabe 5/5/032: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (2), 213
  - Aufgabe 5/5/035: (S) Natürliche Form über  $\mathbb{F}_2$  (3), 214
  - Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
  - Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216
- nilpotente Matrix
  - Aufgabe 1/3/160: (S) Nilpotente Matrizen (1), 67
  - Aufgabe 1/3/165: Nilpotente Matrizen (2), 67
  - Aufgabe 5/3/010: (S) Normalformen nilpotenter Matrizen, 184
  - Aufgabe 5/3/020: Nilpotente Endomorphismen (1), 185
  - Aufgabe 5/3/030: Nilpotente Endomorphismen (2), 186
  - Aufgabe 5/3/040: Nilpotente Endomorphismen (3), 186
  - Aufgabe 5/3/050: Nilpotente Endomorphismen (4), 186
  - Aufgabe 5/3/060: Ähnlichkeit, Beispiel, 186
  - Aufgabe 5/3/070: Nilpotente Endomorphismen (5), 187
  - Aufgabe 5/3/080: Ein falsches Verfahren, 187
  - Aufgabe 5/4/130: Jordanform der Ableitung, 195
  - Aufgabe 5/5/003: (S) Jordanzerlegung (2) (Charakteristik 7), 202
  - Aufgabe 5/5/005: Jordanzerlegung (3), 204
  - Aufgabe 5/5/006: (S) Jordanzerlegung (4), 204
  - Aufgabe 5/5/007: (S) Jordanzerlegung (5), 205
  - Aufgabe 5/5/008: (S) Jordanzerlegung (6), 207
- nilpotenter Endomorphismus
  - Aufgabe 5/3/020: Nilpotente Endomorphismen (1), 185
  - Aufgabe 5/3/030: Nilpotente Endomorphismen (2), 186
  - Aufgabe 5/3/040: Nilpotente Endomorphismen (3), 186
  - Aufgabe 5/3/050: Nilpotente Endomorphismen (4), 186
  - Aufgabe 5/3/070: Nilpotente Endomorphismen (5), 187
  - Aufgabe 5/3/080: Ein falsches Verfahren, 187
- nilpotentes Ringelement
  - Aufgabe 1/2/130: Nilpotente Ringelemente und Einheiten, 54
  - Aufgabe 1/2/200: Nilpotente Polynome, 55
- Norm
  - Aufgabe 6/2/030: Eigenschaften der Orthogonalität, 237
- Norm eines Endomorphismus
  - Aufgabe 6/4/010: Norm eines Endomorphismus (1), 278
  - Aufgabe 6/4/020: Norm eines Endomorphismus (2), 278
  - Aufgabe 6/4/030: Norm eines Endomorphismus (3), 278
- Norm eines Vektors
  - Aufgabe 6/2/010: Satz des Thales, 236
  - Aufgabe 6/2/020: Winkel und Drehungen, 237
  - Aufgabe 6/2/040: (S) Winkel zwischen Vektoren, 237
  - Aufgabe 6/2/050: (S) Winkel zwischen Geraden, 238
  - Aufgabe 6/2/110: Quaternionen, 243
  - Aufgabe 6/3/105: Orthogonale Abbildungen (5), 260
- normaler Operator
  - Aufgabe 6/3/160: Normale Endomorphismen (1), 263
  - Aufgabe 6/3/180: Normale Endomorphismen (2), 263
  - Aufgabe 6/3/190: Normale Endomorphismen (3), 264
  - Aufgabe 6/3/200: Normale Endomorphismen (4), 264
  - Aufgabe 6/3/210: Normale Endomorphismen (5), 264

- Aufgabe 6/3/220: Normale Endomorphismen (6), 264
- Aufgabe 6/3/230: Normale Endomorphismen (7), 265
- Aufgabe 6/3/240: Normale Endomorphismen (8), 265
- Normalteiler
  - Aufgabe 1/1/160: Diedergruppe, 42
  - Aufgabe 1/1/210: Gruppenhomomorphismen (4), 44
  - Aufgabe 1/1/330: Typ einer Permutation, 47
  - Aufgabe 1/1/360: Normalteilerkriterien, 48
  - Aufgabe 1/1/370: Untergruppen vom Index 2, 48
  - Aufgabe 1/1/380: Normalteiler, Gegenbeispiel, 48
  - Aufgabe 1/1/400: Normalteiler und Isomorphie (1), 49
  - Aufgabe 1/1/410: Normalteiler und Isomorphie (2), 49
- Nullstelle
  - Aufgabe 1/2/210: Nullstellenbestimmung (1), 56
  - Aufgabe 1/2/220: (S) Nullstellenbestimmung (2), 56
- Nullstelle eines Polynoms
  - Aufgabe 2/4/140: Konstruktion eines 9-elementigen Körpers, 105
- Nullstellenmenge
  - Aufgabe 2/1/010: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (1), 72
  - Aufgabe 2/1/015: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (2), 72
  - Aufgabe 2/1/020: Eigenschaften von Nullstellenmengen (1), 72
  - Aufgabe 2/1/030: Eigenschaften von Nullstellenmengen (2), 72
  - Aufgabe 2/1/040: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (3), 73
  - Aufgabe 2/1/050: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (4), 73
  - Aufgabe 2/1/060: Veranschaulichung von Nullstellenmengen, 73
  - Aufgabe 2/4/040: (S) Nullstellenbestimmung mit Hilfe des euklidischen Algorithmus, 102
  - Aufgabe 2/4/050: (S) Nullstellen rationaler Polynome, 102
- Nullstellenmenge eines Ideals
  - Aufgabe 2/1/020: Eigenschaften von Nullstellenmengen (1), 72
- O**
- obere Dreiecksmatrix
  - Aufgabe 1/3/090: Potenzen von Matrizen (1), 65
  - Aufgabe 1/3/165: Nilpotente Matrizen (2), 67
  - Aufgabe 1/3/180: Matrizen mit Parametern (2), 68
- Operation
  - Aufgabe 1/1/010: Operationen, Beispiele, 40
  - Aufgabe 1/1/020: Monoide und Gruppen, Beispiele, 40
  - Aufgabe 1/1/110: Beispiele für Gruppen (2), 41
- Operation eines Monoids
  - Aufgabe 1/1/010: Operationen, Beispiele, 40
- Orbit eines Punktes im Phasenraum
  - Aufgabe 6/4/050: (S) Beispiele 2-dimensionaler linearer dynamischer Systeme, Beschreibung der Orbits, 279
- Ordinalzahl
  - Aufgabe 0/5/010:  $\mathbb{N}$  als Ordinalzahl\*, 38
  - Aufgabe 0/5/020: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (1), 38
  - Aufgabe 0/5/030: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (2), 38
  - Aufgabe 0/5/040: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (3), 38
- Ordnung
  - Aufgabe 0/3/060: Lexikographische Ordnung, 35
- Ordnung einer Gruppe
  - Aufgabe 1/1/090: Gruppen von Primzahlordnung, 41
  - Aufgabe 1/1/290: (S) Permutationsgruppe, Untergruppen (1), 47
- Ordnung eines Gruppenelements
  - Aufgabe 1/1/220: Rechnen mit Gruppenelementen (1), 44
  - Aufgabe 1/1/230: Rechnen mit Gruppenelementen (2), 44
- orientierter Winkel
  - Aufgabe 6/2/080: Orientierter Winkel, 242
- orientiertes Volumen
  - Aufgabe 6/2/230: Gramsche Matrix (1), 247
  - Aufgabe 6/2/240: (S) Gramsche Matrix (2), 247
  - Aufgabe 6/2/250: (S) Gramsche Matrix (3), 248
- Orthogonalbasis
  - Aufgabe 6/2/052: Winkel und Orthogonalbasen, 239
- orthogonale Matrix
  - Aufgabe 6/3/015: Eine orthogonale Matrix, 254
  - Aufgabe 6/3/330: (S) Polare Zerlegung, 277
- orthogonale Summe von Unterräumen
  - Aufgabe 6/3/110: Spektralzerlegung (5), 261
  - Aufgabe 6/3/170: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (14), 263
  - Aufgabe 6/3/200: Normale Endomorphismen (4), 264
- orthogonale Vektoren
  - Aufgabe 6/2/010: Satz des Thales, 236
  - Aufgabe 6/2/030: Eigenschaften der Orthogonalität, 237
  - Aufgabe 6/3/015: Eine orthogonale Matrix, 254
- orthogonaler Automorphismus
  - Aufgabe 6/3/050: Spiegelungen der Ebene, 258
  - Aufgabe 6/3/060: Spiegelungen und Drehungen, 259
  - Aufgabe 6/3/070: Orthogonale Abbildungen (1), 259
  - Aufgabe 6/3/080: Orthogonale Abbildungen (2), 259
  - Aufgabe 6/3/090: Orthogonale Abbildungen (3), 260
  - Aufgabe 6/3/100: Orthogonale Abbildungen (4), 260
  - Aufgabe 6/3/105: Orthogonale Abbildungen (5), 260
  - Aufgabe 6/4/040: Exponential eines Endomorphismus, Eigenschaften, 278
- orthogonaler Unterraum zu einer Teilmenge
  - Aufgabe 6/2/030: Eigenschaften der Orthogonalität, 237
- orthogonales Komplement
  - Aufgabe 6/2/055: Orthogonales Komplement (1), 239
  - Aufgabe 6/2/056: Orthogonales Komplement (2), 239
  - Aufgabe 6/2/060: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einer Geraden, 240
  - Aufgabe 6/2/065: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (1), 240
  - Aufgabe 6/2/070: Bestimmung verschiedener Abstände, 240
  - Aufgabe 6/2/075: Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (2), 241
  - Aufgabe 6/2/076: (S) Bestimmung des Abstands eines Punktes von einem Unterraum (3), 241
  - Aufgabe 6/3/090: Orthogonale Abbildungen (3), 260

- Aufgabe 6/3/100: Orthogonale Abbildungen (4), 260  
Orthonormalbasis
- Aufgabe 6/2/120: (S) Orthonormierung (1), 243
- Aufgabe 6/2/130: Orthonormierung (2), 244
- Aufgabe 6/2/140: Orthonormierung (3), 244
- Aufgabe 6/2/150: Orthonormierung (4), 244
- Aufgabe 6/2/210: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (3), eine Orthonormalbasis, 246
- Aufgabe 6/3/002: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (2), 251
- Aufgabe 6/3/003: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (3), 251
- Aufgabe 6/3/004: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (4), 251
- Aufgabe 6/3/010: (S) Spektralzerlegung (1), 253
- Aufgabe 6/3/020: Spektralzerlegung (2), 254
- Aufgabe 6/3/030: Spektralzerlegung (3), 255
- Aufgabe 6/3/040: Spektralzerlegung (4), 255
- Aufgabe 6/3/043: (S) Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (10), 255
- Aufgabe 6/3/044: (S) Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (11), 256
- Aufgabe 6/3/046: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (13), adjungierter eines Projektionsoperators, 258
- Aufgabe 6/3/050: Spiegelungen der Ebene, 258
- Aufgabe 6/3/070: Orthogonale Abbildungen (1), 259
- Aufgabe 6/3/080: Orthogonale Abbildungen (2), 259
- Aufgabe 6/3/230: Normale Endomorphismen (7), 265
- Aufgabe 6/3/240: Normale Endomorphismen (8), 265

## P

### Pappus-Pascal, Satz

- Aufgabe 6/1/100: Satz von Pappus-Pascal, 226

### parallele Unterräume

- Aufgabe 6/1/050: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 2), 222
  - Aufgabe 6/1/060: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 0), 223
  - Aufgabe 6/1/070: (S) Parallelität (Charakteristik 2), 224
  - Aufgabe 6/1/080: (S) Parallelität (Charakteristik 0), 225
  - Aufgabe 6/1/090: Parallelität, 225
  - Aufgabe 6/1/100: Satz von Pappus-Pascal, 226
  - Aufgabe 6/1/120: Lage von Geraden im Raum, 226
- ### Parameterdarstellung eines affinen Unterraumes
- Aufgabe 6/1/010: (S) Gleichungen für Unterräume, 219
  - Aufgabe 6/1/030: (S) Parameterdarstellung für Unterräume, 220
  - Aufgabe 6/1/050: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 2), 222
  - Aufgabe 6/1/060: (S) Parallelität, Unterräume in Parameterform (Charakteristik 0), 223
  - Aufgabe 6/1/150: Gleichungssysteme für Unterräume, 227

### Permutation

- Aufgabe 1/1/240: Rechnen mit Permutationen, Signum, 44
- Aufgabe 1/1/260: (S) Rechnen mit Permutationen, 45
- Aufgabe 1/1/270: (S) Rechnen mit Permutationen, 46

- Aufgabe 1/1/280: (S) Rechnen mit Permutationen, Zyklen, 46

### Permutationsgruppe

- Aufgabe 1/1/290: (S) Permutationsgruppe, Untergruppen (1), 47
  - Aufgabe 1/1/300: Gruppen als Untergruppen der symmetrischen Gruppe, 47
  - Aufgabe 1/1/310: Permutationsgruppe, Untergruppen (2), 47
  - Aufgabe 1/1/330: Typ einer Permutation, 47
  - Aufgabe 1/3/230: Matrizen und Permutationen, 70
- ### Permutationsmatrix
- Aufgabe 2/3/070: Rangbestimmung für einige spezielle Matrizen, 86
  - Aufgabe 2/3/170: Bestimmung der Inversen spezieller invertierbarer Matrizen, 94
  - Aufgabe 2/3/240: (S) Gauß-Bruhat-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$ , 97
  - Aufgabe 2/3/250: (S) LR-Zerlegung einer Matrix aus  $M(3; \mathbb{R})$ , 97

### Polarzerlegung einer regulären Matrix

- Aufgabe 6/3/330: (S) Polare Zerlegung, 277

### Polynom

- Aufgabe 1/2/190: Polynome und Abbildungen, 55
- Aufgabe 1/2/195: Nichteindeutigkeit des Polynomgrades?\*, 55
- Aufgabe 1/2/200: Nilpotente Polynome, 55
- Aufgabe 1/2/210: Nullstellenbestimmung (1), 56
- Aufgabe 1/2/220: (S) Nullstellenbestimmung (2), 56
- Aufgabe 1/3/070: (S) Substitution von Matrizen in Polynome, 64
- Aufgabe 2/1/010: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (1), 72
- Aufgabe 2/1/015: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (2), 72
- Aufgabe 2/1/020: Eigenschaften von Nullstellenmengen (1), 72
- Aufgabe 2/1/040: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (3), 73
- Aufgabe 2/1/050: (S) Nullstellenmengen von Polynomen (4), 73
- Aufgabe 2/1/060: Veranschaulichung von Nullstellenmengen, 73

### Polynome sind keine Funktionen

- Aufgabe 1/2/190: Polynome und Abbildungen, 55

### polynomiale Matrix

- Aufgabe 1/3/080: (S) Operationen mit polynomialen Matrizen, 65

### Polynomring

- Aufgabe 1/2/170: Der Ersetzungshomomorphismus für ganzzahlige Polynome, 54
- Aufgabe 1/2/195: Nichteindeutigkeit des Polynomgrades?\*, 55
- Aufgabe 1/2/200: Nilpotente Polynome, 55

### positiv definite hermitesche Form

- Aufgabe 6/2/200: Beispiele positiv definiter hermitescher Formen, 246

### positiv definite symmetrische Matrix

- Aufgabe 6/3/330: (S) Polare Zerlegung, 277

### positive definite quadratische Form

- Aufgabe 4/3/080: Notwendige Bedingung für positive Definitheit, 160

- Aufgabe 4/3/110: Ein Gegenbeispiel zur positiven Definitheit, 161

### positive Definitheit

- Aufgabe 4/3/070: (S) Rechenaufgaben zur positiven Definitheit, 159

## Potenzmenge

- Aufgabe 0/1/060: Potenzmengen, 26
- Aufgabe 0/1/070: Potenzmengen und Mengenoperationen, 26
- Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33

## Präsentationsmatrix einer Matrix

- Aufgabe 5/4/140: (S) Smithsche Normalform, 195
- Aufgabe 5/4/141: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4, 196
- Aufgabe 5/4/142: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4, 198
- Aufgabe 5/4/143: Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante, 200

## primäre Elementarteiler

- Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
- Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216

## Primkörper

- Aufgabe 1/2/275: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (1), 57
- Aufgabe 1/2/280: (S) Bestimmung von Inversen in Primkörpern (2), 58
- Aufgabe 3/3/220: Anzahl der Elemente eines endlichen Körpers, 130

## Primzahl

- Aufgabe 1/2/260: Irreduzible Elemente in  $\mathbb{Z}[i]$ , 56

## Produkt von Abbildungen

- Aufgabe 0/3/080: Eigenschaften von Abbildungen (1), 35
- Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36

## Projektion

- Aufgabe 6/1/220: Projektionen, 230

## Q

## quadratische Ergänzung

- Aufgabe 4/3/050: (S) Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form, 158

## quadratische Form

- Aufgabe 4/3/040: (S) Die symmetrische Matrix einer quadratischen Form, 157
- Aufgabe 4/3/050: (S) Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form, 158
- Aufgabe 4/3/060: (S) Diagonalisierung einer quadratischen Form, 159
- Aufgabe 4/3/070: (S) Rechenaufgaben zur positiven Definitheit, 159
- Aufgabe 4/3/080: Notwendige Bedingung für positive Definitheit, 160
- Aufgabe 4/3/110: Ein Gegenbeispiel zur positiven Definitheit, 161
- Aufgabe 4/3/120: Quadratische Form eines Graphen\*, 161

## quadratische Matrix

- Aufgabe 1/3/020: Der Ring der quadratischen Matrizen eines festen Typs, 61

## Quadrik

- Aufgabe 6/1/260: (S) Affine Formen von Quadriken, 232
- Aufgabe 6/3/120: Ebene Quadriken (1), 261
- Aufgabe 6/3/130: Ebene Quadriken (2), 261
- Aufgabe 6/3/140: (S) Ebene Quadriken (3), 261

- Aufgabe 6/3/150: Quadriken (4), Beispiel in der Dimension 4, 263

- Aufgabe 6/3/250: (S) Quadriken (5), Ellipsoid, 265

- Aufgabe 6/3/260: (S) Quadriken (6), Kegel, 267

- Aufgabe 6/3/270: (S) Quadriken (7), einschaliges Hyperboloid, 269

- Aufgabe 6/3/280: (S) Quadriken (8), elliptisches Paraboloid, 270

- Aufgabe 6/3/290: (S) Quadriken (9), hyperbolisches Paraboloid, 272

- Aufgabe 6/3/300: (S) Quadriken (10), zweischaliges Hyperboloid, 273

- Aufgabe 6/3/320: (S) Quadriken (12), Beispiele in der Dimension 4, 275

## Quotientengleichheit

- Aufgabe 0/3/050: Operationen rationaler Zahlen, 35

## R

## Rang einer Matrix

- Aufgabe 2/3/010: (S) Rangbestimmung, erste Schritte, 82
- Aufgabe 2/3/011: (S) Rangbestimmung, einfache Beispiele, 84
- Aufgabe 2/3/020: (S) Rangbestimmung, Beispiele aus  $M(4; \mathbb{R})$ , 84
- Aufgabe 2/3/030: (S) Rangbestimmung, Beispiele über  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{F}_2$ ,  $\mathbb{F}_3$ , 84
- Aufgabe 2/3/040: (S) Rangbestimmung, Beispiele mit einem Parameter, 85
- Aufgabe 2/3/050: (S) Rangbestimmung, Beispiele mit zwei Parametern, 85
- Aufgabe 2/3/060: Rangbestimmung, Beispiele mit 3 Parametern, 86
- Aufgabe 2/3/070: Rangbestimmung für einige spezielle Matrizen, 86
- Aufgabe 2/3/080: Rangbestimmung, ein Beispiel mit irrationalen Koeffizienten, 86
- Aufgabe 2/3/090: (S) Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme, 87
- Aufgabe 2/3/100: (S) Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems über  $\mathbb{F}_5$ , 87

## Rang einer quadratischen Form

- Aufgabe 4/3/050: (S) Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form, 158

## Rangbestimmung mit Unterdeterminanten

- Aufgabe 4/2/100: (S) Determinanten mit Parametern (3), 146

## rationale Normalform einer Matrix

- Aufgabe 5/5/040: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (1), 214
- Aufgabe 5/5/045: (S) Erste, zweite und dritte Normalform einer Matrix (2), 216

## rationale Zahl

- Aufgabe 2/4/105: (S) Irrationalität von Quadratwurzeln, 104

## Rechenregeln für Tensoren

- Aufgabe 4/4/010: (S) Rechnen mit Basen von Tensorprodukten, 162
- Aufgabe 4/4/020: Eigenschaften des Tensorprodukts (1), 163
- Aufgabe 4/4/030: Eigenschaften des Tensorprodukts (2), 163
- Aufgabe 4/4/040: Eigenschaften des Tensorprodukts (3), 163

## Rechnen mit Permutationen

- Aufgabe 1/1/250: Rechnen mit Permutationen, Kommutator, 45
- reduzierte Gröbnerbasis
  - Aufgabe 2/5/080: (S) Gröbnerbasen (5), 110
  - Aufgabe 2/5/040: (S) Gröbnerbasen (1), 107
  - Aufgabe 2/5/050: (S) Gröbnerbasen (2), 108
  - Aufgabe 2/5/060: (S) Gröbnerbasen (3), 108
  - Aufgabe 2/5/070: (S) Gröbnerbasen (4), 109
  - Aufgabe 2/5/090: (S) Gröbnerbasen (6), 110
- reguläre Matrix
  - Aufgabe 2/3/131: (S) Bestimmung inverser Matrizen über  $\mathbf{F}_{29}$ , 90
  - Aufgabe 2/3/132: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (1), 91
  - Aufgabe 2/3/133: (S) Inverse Matrizen über Primkörpern (2), 92
  - Aufgabe 2/3/190: (S) Hill-Ciphern (1), 95
  - Aufgabe 2/3/200: (S) Hill-Ciphern (2), 96
- Relation
  - Aufgabe 0/3/020: Relationen, Beispiele (1), 34
  - Aufgabe 0/3/030: Relationen, Beispiele (2), 34
  - Aufgabe 0/3/040: Differenzgleichheit, 34
  - Aufgabe 0/3/050: Operationen rationaler Zahlen, 35
- Repräsentantenunabhängigkeit
  - Aufgabe 0/3/050: Operationen rationaler Zahlen, 35
- Restklasse
  - Aufgabe 1/2/010: Rechnen mit Restklassen, 50
- Restklassenring modulo  $m$ 
  - Aufgabe 1/2/120: Einheiten einiger Ringe (4), 53
- Ring
  - Aufgabe 1/2/090: Einheiten einiger Ringe (1), 53
  - Aufgabe 1/2/100: Einheiten einiger Ringe (2), 53
  - Aufgabe 1/2/110: Einheiten einiger Ringe (3), 53
  - Aufgabe 1/2/130: Nilpotente Ringelemente und Einheiten, 54
  - Aufgabe 1/2/140: Faktoring nach einem Maximalideal, 54
  - Aufgabe 1/2/150: Rechnen mit Idealen, 54
  - Aufgabe 1/2/240: Ideale und Teilbarkeit, 56
  - Aufgabe 1/2/290: Chinesischer Restsatz, 59
  - Aufgabe 1/3/020: Der Ring der quadratischen Matrizen eines festen Typs, 61
- S**
- Satz von Kronecker-Capelli
  - Aufgabe 2/3/090: (S) Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme, 87
  - Aufgabe 2/3/100: (S) Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems über  $\mathbf{F}_5$ , 87
- Satz von Pappus-Pascal
  - Aufgabe 6/1/100: Satz von Pappus-Pascal, 226
- schmidtsches Orthogonalisierungsverfahren
  - Aufgabe 6/2/120: (S) Orthonormierung (1), 243
  - Aufgabe 6/2/130: Orthonormierung (2), 244
  - Aufgabe 6/2/140: Orthonormierung (3), 244
  - Aufgabe 6/2/210: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (3), eine Orthonormalbasis, 246
  - Aufgabe 6/3/004: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (4), 251
- selbstadjungierter Operator
  - Aufgabe 6/3/010: (S) Spektralzerlegung (1), 253
  - Aufgabe 6/3/020: Spektralzerlegung (2), 254
  - Aufgabe 6/3/030: Spektralzerlegung (3), 255
  - Aufgabe 6/3/040: Spektralzerlegung (4), 255
- Signatur einer symmetrischen Bilinearform
  - Aufgabe 4/3/050: (S) Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form, 158
- Signum einer Permutation
  - Aufgabe 1/1/240: Rechnen mit Permutationen, Signum, 44
  - Aufgabe 1/1/270: (S) Rechnen mit Permutationen, 46
  - Aufgabe 1/1/280: (S) Rechnen mit Permutationen, Zyklen, 46
- singuläre Punkte eines dynamischen Systems
  - Aufgabe 6/4/050: (S) Beispiele 2-dimensionaler linearer dynamischer Systeme, Beschreibung der Orbits, 279
- Skalarprodukt
  - Aufgabe 6/2/005: Ein Skalarprodukt, 236
  - Aufgabe 6/2/010: Satz des Thales, 236
  - Aufgabe 6/2/020: Winkel und Drehungen, 237
  - Aufgabe 6/2/040: (S) Winkel zwischen Vektoren, 237
  - Aufgabe 6/2/050: (S) Winkel zwischen Geraden, 238
  - Aufgabe 6/2/055: Orthogonales Komplement (1), 239
  - Aufgabe 6/2/056: Orthogonales Komplement (2), 239
  - Aufgabe 6/2/120: (S) Orthonormierung (1), 243
  - Aufgabe 6/2/130: Orthonormierung (2), 244
  - Aufgabe 6/2/140: Orthonormierung (3), 244
  - Aufgabe 6/2/150: Orthonormierung (4), 244
  - Aufgabe 6/2/160: Skalarprodukt auf einem Vektorraum reeller Polynome (1), 245
  - Aufgabe 6/2/170: Skalarprodukt auf einem Vektorraum reeller Polynome (2), 245
  - Aufgabe 6/2/180: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (1), 245
  - Aufgabe 6/2/190: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (2), eine Orthonormalbasis, 246
  - Aufgabe 6/2/210: Skalarprodukt auf Vektorräumen stetiger Funktionen (3), eine Orthonormalbasis, 246
  - Aufgabe 6/2/220: Skalarprodukt auf der Komplexifizierung eines euklidischen Raumes, 247
  - Aufgabe 6/2/230: Gramsche Matrix (1), 247
  - Aufgabe 6/2/240: (S) Gramsche Matrix (2), 247
  - Aufgabe 6/2/250: (S) Gramsche Matrix (3), 248
  - Aufgabe 6/3/004: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (4), 251
  - Aufgabe 6/3/043: (S) Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (10), 255
  - Aufgabe 6/3/044: (S) Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (11), 256
  - Aufgabe 6/3/046: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (13), adjungierter eines Projektionsoperators, 258
- smithsche Normalform
  - Aufgabe 5/4/140: (S) Smithsche Normalform, 195
  - Aufgabe 5/4/141: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 0, Dimension 4, 196
  - Aufgabe 5/4/142: (S) Smithsche Normalform, Charakteristik 5, Dimension 4, 198
  - Aufgabe 5/4/143: Smithsche Normalform im Fall einer quadratfreien Determinante, 200
- Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Automorphismus
  - Aufgabe 6/3/110: Spektralzerlegung (5), 261
- Spektralzerlegung eines selbstadjungierten Endomorphismus
  - Aufgabe 6/3/010: (S) Spektralzerlegung (1), 253
  - Aufgabe 6/3/020: Spektralzerlegung (2), 254

- Aufgabe 6/3/030: Spektralzerlegung (3), 255
- Aufgabe 6/3/040: Spektralzerlegung (4), 255
- Strukturtensor einer Algebra
  - Aufgabe 4/5/030: Beispiel für den Strukturtensor einer Algebra, 166
- Stufenindizes
  - Aufgabe 2/2/010: (S) Lineare Gleichungssysteme in Stufenform, 76
  - Aufgabe 2/2/020: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_3$ , 76
  - Aufgabe 2/2/030: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten, 77
  - Aufgabe 2/2/040: (S) Einfache Fälle linearer Gleichungssysteme, 77
- Stufenmatrix
  - Aufgabe 2/3/010: (S) Rangbestimmung, erste Schritte, 82
  - Aufgabe 2/3/020: (S) Rangbestimmung, Beispiele aus  $M(4; \mathbb{R})$ , 84
  - Aufgabe 2/3/030: (S) Rangbestimmung, Beispiele über  $\mathbb{R}$ ,  $\mathbb{F}_2$ ,  $\mathbb{F}_3$ , 84
  - Aufgabe 2/3/040: (S) Rangbestimmung, Beispiele mit einem Parameter, 85
  - Aufgabe 2/3/050: (S) Rangbestimmung, Beispiele mit zwei Parametern, 85
  - Aufgabe 2/3/060: Rangbestimmung, Beispiele mit 3 Parametern, 86
  - Aufgabe 2/3/080: Rangbestimmung, ein Beispiel mit irrationalen Koeffizienten, 86
- Summe zweier Unterräume
  - Aufgabe 3/1/040: Summe zweier Unterräume, 113
  - Aufgabe 3/1/050: Ist die Vereinigung zweier Unterräume ein Unterraum?, 113
- surjektive Abbildung
  - Aufgabe 0/3/080: Eigenschaften von Abbildungen (1), 35
  - Aufgabe 0/3/100: Eigenschaften von Abbildungen (3), 36
- Symmetriegruppe
  - Aufgabe 1/1/150: Symmetriegruppen einfacher Figuren, 42
  - Aufgabe 1/1/160: Diedergruppe, 42
- symmetrische Bilinearform
  - Aufgabe 4/3/050: (S) Diagonalisierung, Rang und Signatur einer quadratischen Form, 158
- symmetrische Diagonalform
  - Aufgabe 4/3/060: (S) Diagonalisierung einer quadratischen Form, 159
- symmetrische Gruppe
  - Aufgabe 1/1/300: Gruppen als Untergruppen der symmetrischen Gruppe, 47
- symmetrische Matrix
  - Aufgabe 6/3/010: (S) Spektralzerlegung (1), 253
  - Aufgabe 6/3/020: Spektralzerlegung (2), 254
  - Aufgabe 6/3/030: Spektralzerlegung (3), 255
  - Aufgabe 6/3/040: Spektralzerlegung (4), 255
  - Aufgabe 6/3/110: Spektralzerlegung (5), 261
- symmetrische Matrix einer quadratischen Form
  - Aufgabe 4/3/040: (S) Die symmetrische Matrix einer quadratischen Form, 157
  - Aufgabe 4/3/060: (S) Diagonalisierung einer quadratischen Form, 159
  - Aufgabe 4/3/070: (S) Rechenaufgaben zur positiven Definitheit, 159
- symplektische Basis
  - Aufgabe 4/3/130: (S) Bestimmung symplektischer Basen, 162
- T**
  - Teilbarkeit
    - Aufgabe 2/4/105: (S) Irrationalität von Quadratwurzeln, 104
  - Teiler
    - Aufgabe 1/2/240: Ideale und Teilbarkeit, 56
  - teilerfremde Elemente
    - Aufgabe 1/2/290: Chinesischer Restsatz, 59
  - Teilmengenbeziehung
    - Aufgabe 0/1/070: Potenzmengen und Mengenoperationen, 26
  - Teilverhältnis
    - Aufgabe 6/1/300: Strahlensatz und Teilverhältnis, 233
  - Tensorprodukt
    - Aufgabe 4/4/010: (S) Rechnen mit Basen von Tensorprodukten, 162
    - Aufgabe 4/4/020: Eigenschaften des Tensorprodukts (1), 163
    - Aufgabe 4/4/030: Eigenschaften des Tensorprodukts (2), 163
    - Aufgabe 4/4/040: Eigenschaften des Tensorprodukts (3), 163
    - Aufgabe 4/5/005: Eigenschaften des äußeres Produkts, 165
  - Tensorprodukt von Matrizen
    - Aufgabe 4/4/060: (S) Das Kroneckerprodukt (1), 164
    - Aufgabe 4/4/070: (S) Das Kroneckerprodukt (2), 164
  - Transformationsformel für Koordinaten
    - Aufgabe 3/4/010: (S) Koordinaten und Übergangsmatrizen, 133
    - Aufgabe 3/4/030: (S) Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel, 134
    - Aufgabe 3/4/040: (S) Matrix eines Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , Basiswechsel, 135
    - Aufgabe 3/4/050: (S) Matrix eines Endomorphismus eines Unterraumes von  $\mathbb{R}[X]$ , Basiswechsel, 135
  - transitive Menge
    - Aufgabe 0/5/010:  $\mathbb{N}$  als Ordinalzahl\*, 38
    - Aufgabe 0/5/030: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (2), 38
  - Translation
    - Aufgabe 6/1/020: Translationen, 219
    - Aufgabe 6/1/310: Eine exakte Folge von Gruppen, 233
  - Translationsvektorraum eines affinen Raumes
    - Aufgabe 6/1/020: Translationen, 219
  - trigonalisierbare Matrix
    - Aufgabe 5/2/170: (S) Trigonalisierung, 181
- U**
  - Übergangsmatrix
    - Aufgabe 3/4/010: (S) Koordinaten und Übergangsmatrizen, 133
    - Aufgabe 3/4/030: (S) Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel, 134
    - Aufgabe 3/4/040: (S) Matrix eines Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , Basiswechsel, 135
    - Aufgabe 3/4/050: (S) Matrix eines Endomorphismus eines Unterraumes von  $\mathbb{R}[X]$ , Basiswechsel, 135
  - Umkehrabbildung
    - Aufgabe 0/3/090: Eigenschaften von Abbildungen (2), 36
  - unitärer Automorphismus

- Aufgabe 6/4/010: Norm eines Endomorphismus (1), 278
- unitärer Vektorraum
- Aufgabe 6/2/055: Orthogonales Komplement (1), 239
- Aufgabe 6/2/200: Beispiele positiv definiten hermitescher Formen, 246
- Aufgabe 6/2/220: Skalarprodukt auf der Komplexifizierung eines euklidischen Raumes, 247
- Aufgabe 6/3/001: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (1), 251
- Aufgabe 6/3/002: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (2), 251
- Aufgabe 6/3/160: Normale Endomorphismen (1), 263
- Aufgabe 6/3/170: Eigenschaften des adjungierten Endomorphismus (14), 263
- Aufgabe 6/3/180: Normale Endomorphismen (2), 263
- Aufgabe 6/3/200: Normale Endomorphismen (4), 264
- Aufgabe 6/3/210: Normale Endomorphismen (5), 264
- Aufgabe 6/3/220: Normale Endomorphismen (6), 264
- Aufgabe 6/3/230: Normale Endomorphismen (7), 265
- Aufgabe 6/3/240: Normale Endomorphismen (8), 265
- Aufgabe 6/4/010: Norm eines Endomorphismus (1), 278
- Aufgabe 6/4/020: Norm eines Endomorphismus (2), 278
- Aufgabe 6/4/030: Norm eines Endomorphismus (3), 278
- Untergruppe
  - Aufgabe 1/1/070: Ein Untergruppenkriterium, 41
  - Aufgabe 1/1/090: Gruppen von Primzahlordnung, 41
  - Aufgabe 1/1/120: Zyklische Gruppen (1), 42
  - Aufgabe 1/1/130: Zyklische Gruppen (2), 42
  - Aufgabe 1/1/150: Symmetriegruppen einfacher Figuren, 42
  - Aufgabe 1/1/290: (S) Permutationsgruppe, Untergruppen (1), 47
  - Aufgabe 1/1/310: Permutationsgruppe, Untergruppen (2), 47
  - Aufgabe 1/1/360: Normalteilerkriterien, 48
  - Aufgabe 1/1/370: Untergruppen vom Index 2, 48
  - Aufgabe 1/1/380: Normalteiler, Gegenbeispiel, 48
  - Aufgabe 1/1/400: Normalteiler und Isomorphie (1), 49
  - Aufgabe 1/1/410: Normalteiler und Isomorphie (2), 49
- Untergruppenkriterium
  - Aufgabe 1/1/070: Ein Untergruppenkriterium, 41
- Unterkörper
  - Aufgabe 1/2/070: Adjunktion von Quadratwurzeln, 52
  - Aufgabe 1/2/080: Ganze gaußsche Zahlen, Division mit Rest, 53
- Unterraum
  - Aufgabe 3/1/010: Beispiele für Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/020: Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme als Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/030: Zahlenfolgen als Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/040: Summe zweier Unterräume, 113
- Aufgabe 3/1/060: Beispiele für Homomorphismen (1), 113
- Aufgabe 3/1/070: Beispiele für Homomorphismen (2), 113
- Aufgabe 3/1/080: Rechnen mit Unterräumen, 114
- Aufgabe 3/2/010: Innere direkte Summen (1), 114
- Aufgabe 3/2/020: Innere direkte Summen (2), 114
- Aufgabe 3/2/080: Faktorräume und Isomorphie (1), 117
- Aufgabe 3/2/090: Faktorräume und Isomorphie (2), 118
- Aufgabe 3/3/050: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (2), 121
- Aufgabe 3/3/110: (S) Rechenbeispiele zur Basisauswahl, 123
- Aufgabe 3/3/120: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (1), 123
- Aufgabe 3/3/130: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (2), 123
- Aufgabe 3/3/160: (S) Basen von Komplementäräumen, 125
- Aufgabe 3/3/190: (S) Basen in Faktorräumen, 127
- Aufgabe 3/5/040: (S) Gleichungen für Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , 137
- Aufgabe 3/5/041: (S) Gleichungen für Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{R}^4$ , 137
- Aufgabe 3/5/042: (S) Gleichungen für Unterräume der Standardräume  $\mathbb{R}^4$  und  $\mathbb{C}^3$ , 138
- Aufgabe 3/5/050: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (1), 138
- Aufgabe 3/5/051: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (2), 139
- Unterraumkriterium
  - Aufgabe 3/1/010: Beispiele für Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/020: Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme als Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/030: Zahlenfolgen als Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/050: Ist die Vereinigung zweier Unterräume ein Unterraum?, 113
- Unterring
  - Aufgabe 1/2/080: Ganze gaußsche Zahlen, Division mit Rest, 53
- V**
- Vektorprodukt
  - Aufgabe 6/2/090: Vektorprodukt (1), 242
  - Aufgabe 6/2/100: Vektorprodukt (2), 242
  - Aufgabe 6/2/110: Quaternionen, 243
  - Aufgabe 6/2/150: Orthonormierung (4), 244
  - Aufgabe 6/2/260: Vektorprodukt, 249
  - Aufgabe 6/2/270: (S) Fläche und Volumen, 249
  - Aufgabe 6/2/280: (S) Fläche eines Parallelogramms (1), 249
  - Aufgabe 6/2/290: (S) Fläche eines Parallelogramms (2), 250
- Vektorraum
  - Aufgabe 3/1/010: Beispiele für Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/020: Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme als Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/030: Zahlenfolgen als Unterräume, 112
  - Aufgabe 3/1/040: Summe zweier Unterräume, 113
  - Aufgabe 3/1/050: Ist die Vereinigung zweier Unterräume ein Unterraum?, 113
  - Aufgabe 3/1/060: Beispiele für Homomorphismen (1), 113

- Aufgabe 3/1/070: Beispiele für Homomorphismen (2), 113
- Aufgabe 3/1/080: Rechnen mit Unterräumen, 114
- Aufgabe 3/2/010: Innere direkte Summen (1), 114
- Aufgabe 3/2/020: Innere direkte Summen (2), 114
- Aufgabe 3/2/040: (S) Lineare Codes, Decodierung (1), 115
- Aufgabe 3/2/041: (S) Lineare Codes, Decodierung (2), 116
- Aufgabe 3/2/050: Schnitt eines Homomorphismus, 117
- Aufgabe 3/2/060:  $\text{Hom}(V, W)$  als Vektorraum, 117
- Aufgabe 3/2/070: Exakte Folgen zerfallen, 117
- Aufgabe 3/2/080: Faktorräume und Isomorphie (1), 117
- Aufgabe 3/2/090: Faktorräume und Isomorphie (2), 118
- Aufgabe 3/3/010: (S) Lineare Unabhängigkeit von Vektoren und Erzeugendensysteme, 118
- Aufgabe 3/3/020: (S) Linear unabhängige Vektoren in  $\mathbb{C}^2$ , 119
- Aufgabe 3/3/030: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (1), 119
- Aufgabe 3/3/031: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (2), 119
- Aufgabe 3/3/032: (S) Lineare Codes, Fehlerkorrektur (3), 120
- Aufgabe 3/3/040: Lineare Unabhängigkeit Eigenschaften (1), 121
- Aufgabe 3/3/050: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (2), 121
- Aufgabe 3/3/060: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (3), 121
- Aufgabe 3/3/070: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (4), 121
- Aufgabe 3/3/080: Lineare Unabhängigkeit, Eigenschaften (5), 122
- Aufgabe 3/3/090: (S) Basen und Koordinaten (1), 122
- Aufgabe 3/3/100: (S) Basen und Koordinaten (2), 122
- Aufgabe 3/3/110: (S) Rechenbeispiele zur Basisauswahl, 123
- Aufgabe 3/3/120: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (1), 123
- Aufgabe 3/3/130: (S) Basen in Unterräumen von  $\mathbb{R}[X]$  (2), 123
- Aufgabe 3/3/140: (S) Basisergänzung im  $\mathbb{R}^5$ , 124
- Aufgabe 3/3/150: (S) Austauschverfahren, 124
- Aufgabe 3/3/160: (S) Basen von Komplementäräumen, 125
- Aufgabe 3/3/170: Eine Eigenschaft von Basen, 126
- Aufgabe 3/3/180: (S) Existenz der linearen Fortsetzung von Abbildungen, 126
- Aufgabe 3/3/190: (S) Basen in Faktorräumen, 127
- Aufgabe 3/3/200: (S) Dimension von Bild und Kern einer linearen Abbildung, 127
- Aufgabe 3/3/202: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 2, 128
- Aufgabe 3/3/203: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 3, 128
- Aufgabe 3/3/205: (S) Dimension von Bild und Kern, Charakteristik 5, 129
- Aufgabe 3/3/210: Dimensionen der Vektorräume in exakten Folgen, 129
- Aufgabe 3/3/220: Anzahl der Elemente eines endlichen Körpers, 130
- Aufgabe 3/3/230: Ein Gruppenisomorphismus\*, 130
- Aufgabe 3/3/240: (S) Hill-Ciphern (3), 130
- Aufgabe 3/3/250: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (1), 132
- Aufgabe 3/3/260: (S) Bild und Kern einer linearen Abbildung (2), 132
- Aufgabe 3/3/270: (S) Bild und Kern eines Endomorphismus, 133
- Aufgabe 3/4/010: (S) Koordinaten und Übergangsmatrizen, 133
- Aufgabe 3/4/020: Matrix der Transposition, 134
- Aufgabe 3/4/030: (S) Matrix einer linearen Abbildung, Basiswechsel, 134
- Aufgabe 3/4/040: (S) Matrix eines Endomorphismus des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , Basiswechsel, 135
- Aufgabe 3/4/050: (S) Matrix eines Endomorphismus eines Unterraumes von  $\mathbb{R}[X]$ , Basiswechsel, 135
- Aufgabe 3/5/010: (S) Duale Basen (1), 135
- Aufgabe 3/5/020: (S) Duale Basen (2), 136
- Aufgabe 3/5/030: Linearformen und Unterräume, 136
- Aufgabe 3/5/040: (S) Gleichungen für Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{R}^3$ , 137
- Aufgabe 3/5/041: (S) Gleichungen für Unterräume des Standardraumes  $\mathbb{R}^4$ , 137
- Aufgabe 3/5/042: (S) Gleichungen für Unterräume der Standardräume  $\mathbb{R}^4$  und  $\mathbb{C}^3$ , 138
- Aufgabe 3/5/050: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (1), 138
- Aufgabe 3/5/051: (S) Basis des Durchschnitts zweier Unterräume im  $\mathbb{R}^4$  (2), 139
- Aufgabe 3/5/060: Ein Vektorraum, der nicht zu seinem dualen isomorph ist, 139
- Verbindungsraum
  - Aufgabe 6/1/040: (S) Affine Basen für Unterräume (1), 220
  - Aufgabe 6/1/045: (S) Affine Basen für Unterräume (2), 221
  - Aufgabe 6/1/070: (S) Parallelität (Charakteristik 2), 224
  - Aufgabe 6/1/080: (S) Parallelität (Charakteristik 0), 225
  - Aufgabe 6/1/090: Parallelität, 225
  - Aufgabe 6/1/100: Satz von Pappus-Pascal, 226
  - Aufgabe 6/1/110: Eigenschaften affiner Unterräume, 226
  - Aufgabe 6/1/140: Gleichungssystem für eine Gerade, 227
  - Aufgabe 6/1/150: Gleichungssysteme für Unterräume, 227
  - Aufgabe 6/1/160: (S) Hyperebenen und Determinanten, 227
  - Aufgabe 6/1/220: Projektionen, 230
- Vereinigung eines Mengensystems
  - Aufgabe 0/1/030: Mengenoperationen (3), 25
  - Aufgabe 0/1/040: Durchschnitt eines Mengensystems, 26
- Vereinigung zweier Mengen
  - Aufgabe 0/1/010: Mengenoperationen (1), 25
  - Aufgabe 0/1/020: Mengenoperationen (2), Komplementärmengen, 25
  - Aufgabe 0/1/050: Mengenoperationen, kartesisches Produkt, 26

- Aufgabe 0/1/070: Potenzmengen und Mengenoperationen, 26
- Vereinigungsmenge
- Aufgabe 0/5/040: Eigenschaften von Ordinalzahlen\* (3), 38
- vollständige bzw. maximale Fahne
- Aufgabe 5/2/170: (S) Trigonalisierung, 181
- Aufgabe 5/2/210: Fahnen, 184
- vollständige Induktion
- Aufgabe 0/2/100: Binomialkoeffizienten, 32
- Aufgabe 0/2/110: Potenzmenge, Anzahl der Elemente, 33
- Aufgabe 0/2/120: Vollständige Induktion (1), 33
- Aufgabe 0/2/130: Vollständige Induktion (2), 33
- Volumen eines Parallelepipeds
- Aufgabe 6/2/270: (S) Fläche und Volumen, 249
- Vorzeichen einer Permutation
- Aufgabe 1/1/240: Rechnen mit Permutationen, Signum, 44
- Aufgabe 1/1/270: (S) Rechnen mit Permutationen, 46
- Aufgabe 1/1/280: (S) Rechnen mit Permutationen, Zyklen, 46

**W**

## Wahrheitswert

- Aufgabe 0/2/010: (S) Wahrheitswerte (1), 27
- Aufgabe 0/2/011: (S) Wahrheitswerte (2), 27
- Aufgabe 0/2/012: (S) Wahrheitswerte (3), 27
- Aufgabe 0/2/013: (S) Wahrheitswerte (4), 28
- Aufgabe 0/2/014: (S) Wahrheitswerte (5), 28
- Aufgabe 0/2/015: (S) Wahrheitswerte (6), 29

## Wahrheitstabelle

- Aufgabe 0/2/015: (S) Wahrheitswerte (6), 29
- Aufgabe 0/2/020: Äquivalenz von Aussagen (1), 30
- Aufgabe 0/2/030: Äquivalenz von Aussagen (2), 30
- Aufgabe 0/2/040: Aussagenverbindungen (1), 31
- Aufgabe 0/2/080: Aussagenverbindungen (5), 31

## Wertetafel einer Abbildung

- Aufgabe 0/3/070: Abbildungen, Wertetafeln, 35

## Winkel zwischen zwei Vektoren

- Aufgabe 6/2/020: Winkel und Drehungen, 237
- Aufgabe 6/2/040: (S) Winkel zwischen Vektoren, 237
- Aufgabe 6/2/050: (S) Winkel zwischen Geraden, 238
- Aufgabe 6/2/052: Winkel und Orthogonalbasen, 239
- Aufgabe 6/3/050: Spiegelungen der Ebene, 258
- Aufgabe 6/3/105: Orthogonale Abbildungen (5), 260

**Y**

## Young-Diagramm

- Aufgabe 5/3/040: Nilpotente Endomorphismen (3), 186
- Aufgabe 5/3/050: Nilpotente Endomorphismen (4), 186

**Z**

## Zeilenstufenform

- Aufgabe 2/1/070: (S) Lineare Gleichungen, erste Schritte (1), 74
- Aufgabe 2/1/080: (S) Lineare Gleichungen, erste Schritte (2), 74
- Aufgabe 2/2/010: (S) Lineare Gleichungssysteme in Stufenform, 76
- Aufgabe 2/2/020: (S) Lineare Gleichungssysteme über  $\mathbb{F}_3$ , 76
- Aufgabe 2/2/030: (S) Lineare Gleichungssysteme mit komplexen Koeffizienten, 77
- Aufgabe 2/2/040: (S) Einfache Fälle linearer Gleichungssysteme, 77

## Zeilenstufenmatrix

- Aufgabe 2/2/150: (S) Stufentransformation für Matrizen, 82

## Zerfällungskörper

- Aufgabe 2/4/130: Zerfällungskörper von  $X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ , 105
- Aufgabe 2/4/150: Konstruktion endlicher Körper, 105

## Zerlegung in irreduzible Faktoren

- Aufgabe 2/4/080: (S) Faktorzerlegung von Polynomen, 103
- Aufgabe 2/4/100: (S) Faktorzerlegung von Polynomen über  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{F}_p$ ,  $\mathbb{C}$ ,  $\mathbb{R}$ , 104

## zornsches Lemma

- Aufgabe 0/4/020: Zornsches Lemma, Beispiel\*, 37

## zyklische Gruppe

- Aufgabe 1/1/120: Zyklische Gruppen (1), 42
- Aufgabe 1/1/130: Zyklische Gruppen (2), 42

## zyklischer Unterraum

- Aufgabe 5/3/010: (S) Normalformen nilpotenter Matrizen, 184
- Aufgabe 5/3/020: Nilpotente Endomorphismen (1), 185
- Aufgabe 5/3/030: Nilpotente Endomorphismen (2), 186
- Aufgabe 5/3/040: Nilpotente Endomorphismen (3), 186
- Aufgabe 5/3/050: Nilpotente Endomorphismen (4), 186
- Aufgabe 5/3/060: Ähnlichkeit, Beispiel, 186
- Aufgabe 5/3/070: Nilpotente Endomorphismen (5), 187
- Aufgabe 5/3/080: Ein falsches Verfahren, 187
- Aufgabe 5/4/130: Jordanform der Ableitung, 195

## Zyklus

- Aufgabe 1/1/270: (S) Rechnen mit Permutationen, 46
- Aufgabe 1/1/280: (S) Rechnen mit Permutationen, Zyklen, 46
- Aufgabe 1/1/330: Typ einer Permutation, 47