

Statistik stochastischer Prozesse

4. Übung, 13. 06. 2005

1. Es seien P und Q zwei Wahrscheinlichkeitsmaße auf (Ω, \mathfrak{A}) und $R := \frac{P+Q}{2}$. Man zeige, dass folgende Eigenschaften gelten:

- a) P und Q sind absolutstetig bzgl. R ,
- b) bezeichnet U die Radon-Nikodym-Ableitung $\frac{dQ}{dR}$, so gilt $0 \leq U \leq 2$, R -fast sicher
- c) $P(U = 2) = Q(U = 0) = 0$

d) Für alle $A \in \mathfrak{A}$ gilt:

$$\int_A U dP = \int_A (2 - U) dQ$$

(Hinweis: Nach Definition gilt für alle $A, B \in \mathfrak{A}$

$$\int_A \mathbb{I}_B dP = P(A \cap B) = \int_A (2 - U) \mathbb{I}_B dR, \text{ d. h.}$$

$$\int_A Z dP = \int_A (2 - U) Z dR \tag{*}$$

für alle A und alle Indikatorfunktionen Z . Somit auch für alle nichtnegativen meßbaren Z , insbesondere für $Z = U$.)

e) Es gilt $Q \ll P$ genau dann, wenn $Q(U = 2) = 0$ erfüllt ist. In diesem Fall haben wir mit

$$L := \frac{dQ}{dP}$$

die Gleichung $L(\omega) = \frac{U(\omega)}{2-U(\omega)}$ für R -fast alle ω .

Außerdem gilt $E_P L = 1$.

(Man setze $Z = \frac{U}{2-U}$ in (*) ein und überzeuge sich davon, dass im Fall $Q \ll P$) das Ereignis $\{U = 2\}$ eine R -Nullmenge ist.)

2. Es sei X eine Zufallsgröße mit Werten in $[0, 1)$, die gemäß der Dichtefunktion $f_X(x) = 2x\mathbb{I}_{[0,1]}(x)$ verteilt ist. Ferner sei $I_{k,j} := [k2^{-j}, (k+1)2^{-j})$ sowie $\mathcal{F}_j := \sigma(\{X \in I_{k,j}\}, k = 0, \dots, 2^j - 1)$. Zeigen Sie, dass die bedingte Erwartung $\mathbb{E}[X|\mathcal{F}_j]$ \mathbb{P} -fast sicher eine deterministische Funktion g_j von X ist, die konstante Werte auf $I_{k,j}$ annimmt für alle $k = 0, \dots, 2^j - 1$. Bestimmen Sie die jeweilige Konstante und zeichnen Sie g_j für $j = 1, 2, 3, 4$ in ein Koordinatensystem. Existiert der Grenzwert $\lim_{j \rightarrow \infty} g_j$, und wenn ja, in welchem Sinn?

3. Es sei $(\Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ ein statistisches Modell mit $\mathcal{P} = (P_\vartheta, \vartheta \in \Theta)$ und mit einem dominierenden Wahrscheinlichkeitsmaß P_0 . Weiterhin bezeichne $L(\vartheta)$ die Likelihoodfunktion (Radon-Nikodym-Ableitung) $L(\vartheta) = \frac{dP_\vartheta}{dP_0}$ sowie \mathcal{H} eine Teil- σ -Algebra von \mathcal{F} .

Zeigen Sie, dass für jede positive Zufallsgröße Y P_0 -fast sicher gilt

$$E_\vartheta[Y|\mathcal{H}] = \begin{cases} \frac{E_0[L(\vartheta)Y|\mathcal{H}]}{E_0[L(\vartheta)|\mathcal{H}]} & \text{auf } \{E_0[L(\vartheta)|\mathcal{H}] > 0\}, \\ 0 & \text{auf } \{E_0[L(\vartheta)|\mathcal{H}] = 0\}. \end{cases}$$

Hinweis: Man benutze die Formel (4.7) des Vorlesungsskriptes:

$$\frac{dP_\vartheta|_{\mathcal{H}}}{dP_0|_{\mathcal{H}}} = E_0(L|\mathcal{H}).$$